

第十九章 活血化瘀药

习题

一、A型题

- 下列药物中，性善“上行头目”，为治头痛的要药是（ ）
A.羌活 B.川芎 C.细辛
D.白芷 E.吴茱萸
- “行血中气滞，气中血滞，专治一身上下诸痛”的药物是（ ）
A.川芎 B.郁金 C.延胡索
D.姜黄 E.乳香
- 既能活血，又能凉血，并能养血的药物是（ ）
A.丹参 B.大黄 C.鸡血藤
D.郁金 E.生地黄
- 桃仁既能活血祛瘀，又能润肠通便，并能（ ）
A.行气止痛 B.止咳平喘 C.利水消肿
D.凉血消痈 E.化瘀止血
- 郁金既能活血止痛，又能行气止痛，治疗气滞血瘀痛证，常配伍（ ）
A.木香 B.香附 C.檀香
D.沉香 E.青木香
- 既能活血调经，又能补血调经的药物是（ ）
A.红花 B.益母草 C.丹参
D.鸡血藤 E.桃仁
- 长于促进骨折愈合的药物是（ ）
A.骨碎补 B.血竭 C.刘寄奴
D.主螫虫 E.自然铜
- 刘寄奴既能散瘀止血，又能疗伤止痛，并能（ ）
A.破血通经 B.敛疮生肌 C.补肾强骨
D.利尿通淋 E.通络散结
- 具有活血行气、通经止痛作用，长于行肢臂而除痹痛的药物是（ ）
A.丹参 B.姜黄 C.乳香
D.红花 E.川芎
- 番红花既能活血通经，又能祛瘀止痛，还能（ ）
A.利尿通淋 B.散积消癥 C.凉血解毒
D.消肿生肌 E.续筋接骨
- 既能活血止痛，又能止血，并能解毒生肌的药物是（ ）
A.川芎 B.乳香 C.没药
D.五灵脂 E.枫香脂
- 可活血调经，疏肝解郁，消肿解毒的药物是（ ）

- A.川芎 B.郁金 C.丹参
D.月季花 E.王不留行
- 13.具破瘀通经，凉血祛风功效的药物是（ ）
A.三棱 B.莪术 C.凌霄花
D.土鳖虫 E.虎杖
- 14.骨碎补的功效是（ ）
A.散瘀止痛，接骨疗伤 B.活血疗伤，祛瘀通经
C.活血续伤，补肾强骨 D.祛风湿，强筋骨，止血
E.活血定痛，化瘀止血
- 15.味咸性微寒，可活血消癥，消肿排脓的药物是（ ）
A.乳香 B.五灵脂 C.丹参
D.穿山甲 E.斑蝥
- 16.郁金的归经是（ ）
A.归心、脾经 B.归心、肝、脾经 C.归肝、胆、脾经
D.归肝、脾经 E.归肝、胆、心经
- 17.姜黄的性味是（ ）
A.辛、苦，温 B.辛、苦，寒 C.辛、甘，温
D.辛、咸，温 E.辛、酸，温
- 18.莪术的性味是（ ）
A.辛、苦，温 B.甘、咸，温 C.苦、辛，平
D.咸，微寒 E.苦，微寒
- 19.入汤剂宜包煎的药物是（ ）
A.红花 B.月季花 C.马钱子
D.五灵脂 E.骨碎补
- 20.儿茶入汤剂宜（ ）
A.先煎 B.后下 C.包煎
D.冲服 E.烊化兑服
- 21.斑蝥的用量为（ ）
A.0.01~0.05g B.0.03~0.06g C.0.1~0.5g
D.0.5~1g E.1.5~3g
- 22.在“十八反”中，与丹参不宜同用的药物是（ ）
A.五灵脂 B.莱菔子 C.藜芦
D.甘草 E.甘遂
- 23.根据“十九畏”的理论，五灵脂不宜配伍（ ）
A.党参 B.甘草 C.人参
D.莱菔子 E.蒲黄
- 24.怀牛膝的产地是（ ）
A.四川 B.云南 C.广东

D.河南

E.湖南

二、B型题

- A.既能活血通经，又能利水消肿
B.既能活血调经，又能通络止痛
C.既能活血通经，又能消散痈肿
D.既能活血调经，又能祛瘀止痛
E.既能活血调经，又能补益肝肾
- 1.益母草、泽兰皆具有的功效是（ ）
2.丹参、红花皆具有的功效是（ ）
A.既能活血行气，又能祛风止痒
B.既能活血行气，又能消肿生肌
C.既能活血行气，又能通经止痛
D.既能活血行气，又能清心凉血
E.既能活血行气，又能消肿解毒
- 3.乳香、没药的功效是（ ）
4.姜黄的功效是（ ）
A.气火上逆之倒经、吐血、衄血
B.风湿顽痹
C.寒凝瘀滞出血
D.肺痈、肠痈
E.水肿、小便不利
- 5.郁金善治（ ）
6.桃仁善治（ ）
A.解毒生肌
B.托毒生肌
C.消肿生肌
D.敛疮生肌
E.养血生肌
- 7.血竭能（ ）
8.乳香能（ ）
A.既治癥瘕积聚，又治食积腹痛
B.既治癥瘕积聚，又治风湿痹痛
C.既治癥瘕积聚，又治痈疽疮毒
D.既治癥瘕积聚，又治骨折筋伤
E.既治癥瘕积聚，又治风疹皮癣
- 9.三棱、莪术的适应证为（ ）
10.土鳖虫的适应证为（ ）
A.0.03~0.06g
B.0.3~0.5g
C.0.3~0.6g
D.1~2g
E.2~5g
- 11.水蛭研末内服的剂量是（ ）
12.血竭研末内服的剂量是（ ）

三、C型题

- A.破血逐瘀
B.续筋接骨
C.两者均是
D.两者均非
- 1.土鳖虫具有的功效是（ ）
2.骨碎补具有的功效是（ ）
A.乳汁不下
B.瘰疬
C.两者均是
D.两者均非
- 3.马钱子常用治（ ）
4.穿山甲常用治（ ）
A.外伤出血，跌打伤痛
B.疮疡久溃不敛
C.两者均是
D.两者均非

- 5.血竭常用治 ()
- 6.儿茶常用治 ()
- A.活血止痛 B.消肿生肌 C.两者均是 D.两者均非
- 7.没药具有的功效是 ()
- 8.三棱具有的功效是 ()
- A.活血调经 B.利水消肿 C.两者均是 D.两者均非
- 9.泽兰具有的功效是 ()
- 10.益母草具有的功效是 ()
- A.活血调经 B.疏肝解郁 C.两者均是 D.两者均非
- 11.丹参具有的功能是 ()
- 12.桃仁具有的功能是 ()

四、X 型题

- 1.丹参可应用于 ()
- A.月经不调、产后瘀滞腹痛 B.瘀滞心胸腹痛
C.癥瘕积聚 D.跌打伤痛、风湿痹痛
E.心悸失眠
- 2.郁金的功效是 ()
- A.利尿通淋 B.清心凉血 C.活血止痛
D.行气解郁 E.利胆退黄
- 3.夏天无常用治 ()
- A.肝阳头痛 B.跌打伤痛 C.风湿痹痛
D.中风不遂 E.瘀滞出血
- 4.具有活血行气止痛作用的药物是 ()
- A.丹参 B.乳香 C.川芎
D.牛膝 E.姜黄
- 5.能治疗食积脘腹胀痛的药物是 ()
- A.没药 B.延胡索 C.三棱
D.莪术 E.刘寄奴
- 6.水蛭、虻虫的共同功效是 ()
- A.利尿通淋 B.活血调经 C.破血逐瘀
D.散结消癥 E.通经下乳
- 7.穿山甲可用于治疗 ()
- A.风湿痹痛 B.产后乳汁不下 C.癥瘕
D.肾虚腰痛 E.血淋、尿血
- 8.既能活血调经，又能利水的药物是 ()
- A.丹参 B.益母草 C.红花
D.牛膝 E.泽兰
- 9.桃仁可用于 ()

- A. 肺癆、腸癆 B. 血瘀腹痛 C. 熱結便秘
 D. 咳嗽氣喘 E. 癥瘕積聚
10. 郁金、姜黃的功效共用點是 ()
 A. 活血散瘀 B. 清心涼血 C. 利膽退黃
 D. 行氣解郁 E. 行氣止痛
11. 延胡索可用於 ()
 A. 瘀阻胸痹心痛 B. 風濕痺痛 C. 氣滯胃痛
 D. 瘀阻胃痛 E. 瘀滯腹痛
12. 益母草與澤蘭的共同功效是 ()
 A. 清熱解毒 B. 疏肝解鬱 C. 活血調經
 D. 利尿消腫 E. 祛瘀消癰

參考答案

一、A 型題

- 1.B. 以上五味藥物均能止痛，治療頭痛。但羌活、白芷、細辛均能散寒解表止痛，其中羌活善於治療風寒太陽經頭痛，白芷善於治療陽明經頭痛，細辛則善於治療少陰經頭痛；吳茱萸暖肝散寒止痛，並能降逆止嘔，善於治療厥陰經巔頂頭痛；川芎既能活血行氣，又能祛風止痛，既升且降，其升浮而善“上行頭目”，可治療多種類型、任何部位的頭痛，但以感受外邪和血瘀頭痛為主，是治療頭痛的要藥，所謂“頭痛不離川芎”。故本題答案應選 B。
- 2.C. 延胡索為治療痛證的要藥，既能活血止痛，又能行氣止痛，善於治療各部位氣滯血瘀的痛證。故本題正確答案為 C。
- 3.A. 丹參既能活血調經，治療瘀血阻滯之月經不調和其他病證，又能涼血消癰以治瘡瘍癰腫，並能養血安神以治熱入營血，煩躁不寐，及血不養心之心悸失眠等。故本題答案選 A。
- 4.B. 桃仁專入血分，長於活血祛瘀，又藥用種子，富含油脂，入大腸經，能潤滑腸道而通便，且味苦，性沉降，能降肺氣而止咳平喘。故答案選 B。
- 5.A. 郁金既入血分以活血化瘀而止痛，又入氣分以行氣解鬱而止痛，是治療瘀滯痛證的要藥，然以入血分治瘀痛為主；木香專入氣分，長於行氣止痛，是治療氣滯痛證的要藥；郁金配伍木香，活血行氣止痛的作用更強，如顛倒木金散（《醫宗金鑑》）。
- 6.D. 雞血藤苦而不燥，溫而不烈，藥性平和，入血分以活血補血而調經，婦人血瘀、血虛之月經不調均可用。故本題答案選 D。
- 7.E. 自然銅具有散瘀消腫、接骨療傷的功能，尤其長於促進骨折的愈合。故本題答案選 E。
- 8.A. 劉寄奴具有散瘀止痛，療傷止血，破血通經和消化積積的功效。故本題答案選擇 A。
- 9.B. 以上五味藥均能活血行氣止痛，而用於瘀滯痛證。但姜黃辛散苦燥溫通，外散風寒濕邪，內行氣血、通經止痛，而長於行肢臂經脈而除痺痛。故答案為 B。
- 10.C. 番紅花藥性微寒，有較強的活血通經，祛瘀止痛作用，又能涼血解毒，故本題答案選 C。
- 11.E. 川芎有活血止痛作用，但無止血和解毒生肌作用；五靈脂既活血又止血，但無解毒生肌功能；乳香、沒藥能活血止痛和生肌，但不能止血，而且其生肌是消腫生肌，而不是解毒

- 生肌；只有枫香脂既能活血止痛，又能止血，并能解毒生肌。故本题答案选 E。
- 12.D.川芎、郁金皆可活血调经，疏肝气，但无解毒之功；丹参可活血调经，消痈肿，但无疏肝解郁之功；而王不留行亦无疏肝解郁及解毒之效；只有月季花具有活血调经，疏肝解郁，消肿解毒之功。故本题答案选 D。
- 13.C.本题的三棱、莪术、凌霄花、土鳖虫皆能破瘀通经，但兼可活血祛风的只有凌霄花，而三棱、莪术又消积行气，土鳖虫又续筋接骨；虎杖则既不破血、又无祛风之功。故本题答案应选 C。
- 14.C.散瘀止痛，接骨疗伤是自然铜的功效；活血疗伤，祛瘀通经是苏木的功效；活血续伤，补肾强骨是骨碎补的功效；祛风湿、强筋骨、止血是鹿衔草的功效；活血定痛、化瘀止血是血竭的功效。故本题答案应选 C。
- 15.D.本题五个备选项中，乳香及五灵脂性温，斑蝥辛热排出答案。而丹参、穿山甲皆微寒，能活血消癥、消痈；但丹参味苦、无排脓之功；穿山甲味咸，可消肿排脓。故本题答案选 D。
- 16.E.本题主要测试学生是否理解、掌握了中药的归经是如何确定的。活血祛瘀药多归肝经与心经。因心主血，故归心经；肝藏血，而前人认为“恶血必归于肝”，故归肝经。而郁金为常用的活血化瘀药，又可清心行气解郁，利胆退黄，主归肝、胆、心经。故答案应选择 E。
- 17.A.姜黄辛散温通苦泄，既入血分又入气分，能活血行气止痛，故选答案 A。
- 18.A.莪术辛散苦泄温通，既入血分，又入气分，其性峻猛，能破血散瘀，消癥化积，行气止痛。故本题答案选 A。
- 19.D.本题主要测试学生对药物特殊煎法的掌握。以上五味药物中马钱子一般不入汤剂，多人丸散剂；而红花、骨碎补入汤剂的煎法无特殊要求；月季花入汤剂不宜久煎；五灵脂遇水易散开呈粉状，引起药液混浊，故人汤剂需包煎。所以本题答案选 D。
- 20.C.儿茶的药用部位为煎膏，内服多入丸散剂，亦可入煎剂，但因易引起药液混浊黏稠，故入煎剂宜布包。因此本题答案选 C。
- 21.B.本题主要测试学生对一些有毒和特殊药物用量的掌握。斑蝥为大毒之品，必须严格掌握其使用剂量，其内服多入丸散，剂量控制在 0.03~0.06g。故本题答案选 B。
- 22.C.在“十八反”中，“诸参辛芍叛藜芦”，其中的参也包括了丹参，不能与藜芦同用。故本题答案选 C。
- 23.C.在“十九畏”中，人参畏五灵脂，两药一般不宜同用。故本题答案为 C。
- 24.D.牛膝人药用苋科植物牛膝和川牛膝的根。牛膝即为怀牛膝，河南产者量大质佳，为河南所产四大怀药之一。其“怀”意为古时的“怀庆”地区。故本题答案应选 D。

二、B 型题

- 1.A2.D.益母草具有活血调经、利尿消肿和清热解毒的功能，泽兰具有活血调经、祛瘀消痈和利尿消肿的作用，两药均能活血调经、利尿消肿，故第 1 题选 A.丹参能活血调经、祛瘀止痛、凉血消痈、除烦安神，红花能活血通经、祛瘀止痛，故第 2 题选 D。
- 3.B4.C.乳香、没药和姜黄均能活血行气止痛，但乳香、没药又能消肿生肌，故第 3 题选 B；而姜黄又能通经止痛，故第 4 题选 C。

5.A6.D.郁金药性辛苦寒，善于清热降泄，既能活血止痛，又能清心凉血止血，善治气火上逆之出血证，故第 5 题选 A；无论是肺痛，还是肠痛，都与瘀血阻滞有关，桃仁味苦善泄，既能活血祛瘀，尤以祛瘀力强，治疗有形瘀血阻滞之证较好，又能润肠通便，促使瘀血等病理产物的排泄，故第 6 题选 D.

7.D8.C.血竭具有活血定痛、化瘀止血和敛疮生肌的功能，故第 7 题选答案 D；乳香具有活血止痛，消肿生肌的作用，故第 8 题选答案 C.

9.A10.D.三棱、莪术既能破血行气，用于癥瘕积聚，又能消积止痛而用于食积腹痛，故第 9 题选答案 A；土鳖虫既能破血逐瘀而用于癥瘕积聚，又能续筋接骨而用于骨折筋伤，故第 10 题选答案 D.

11.B12.D.水蛭可煎汤内服，亦可研末冲服，而研末冲服或入丸散为宜，其研末服的用量为 0.3~0.5g，故第 11 题答案选 B；血竭内服很少人煎剂，多入丸散，其研末服的用量为每次 1~2g，故第 12 题答案选 D.

三、C 型题

1.C2.B.土鳖虫既能破血逐瘀，又能续筋接骨，故第 1 题答案选 C；骨碎补既能活血续伤、续筋接骨，又能温补肾阳、强筋健骨，故第 2 题答案选 B.

3.D4.C.马钱子具有散结消肿、通络止痛的功能，主要用于跌打损伤、骨折肿痛以及风湿痹痛、麻木瘫痪等病证，而不用于乳汁不下、瘰疬，故第 3 题答案选 D；穿山甲具有活血癥瘕、通经下乳和消肿排脓的作用，常用于治疗产后乳汁不下、瘰疬等病证，故第 4 题答案选 C.

5.C6.C.血竭和儿茶均能活血疗伤、止血、敛疮生肌，都可用于外伤出血、跌打伤痛和疮疡久溃不敛，故第 5.6 题答案均选 C.

7.C8.D.没药具有活血止痛、消肿生肌的作用，故第 7 题答案选 C；而三棱具有破血行气、消积止痛的作用，故第 8 题答案选 D.

9.C10.C.益母草、泽兰均能活血调经、利水消肿，故第 9.10 题答案均选 C.

11.A12.A.丹参和桃仁都具有活血调经的作用，是治疗瘀滞月经不调的常用药。然丹参又能凉血消痈、安神，桃仁又能润肠通便、止咳平喘，两者均无疏肝解郁的功能，故答案均选 A.

四、X 型题

1.ABCDE.丹参具有活血调经、祛瘀止痛的作用，能用于多种瘀血阻滞的病证；丹参又能凉血除烦、养血安神，而用于心悸失眠，故答案选 ABCDE.

2.BCDE.郁金辛、苦、微寒，既入血分，又入气分，能活血止痛、行气解郁、清心凉血、利胆退黄，故答案选 BCDE.

3.ABCD.夏天无既能活血止痛，舒筋活络，用于跌打伤痛；又能祛风除湿，用于风湿痹痛；并有一定的平抑肝阳作用而用于肝阳头痛。故选答案 ABCD.

4.BCE.丹参、牛膝只入血分，长于活血调经；乳香、川芎和姜黄既入血分又入气分，能活血行气止痛，故选答案 BCE.

5.CDE.没药活血止痛、消肿生肌；延胡索活血行气止痛；三棱、莪术破血行气，消积止痛；刘寄奴散瘀止痛、疗伤止血、破血通经、消食化积。三棱、莪术和刘寄奴均能用于食积脘腹胀痛，故选答案 CDE.

6.BCD.水蛭和虻虫均是破血消癥药，具有破血逐瘀、散结消癥和活血调经的功能，故答案选 BCD.

7.ABC.穿山甲具有活血消癥、通经下乳、消肿排脓的作用，常用于癥瘕、产后乳汁不下和风湿痹痛，故答案选 ABC.

8.BDE.丹参具有活血调经、凉血消痈、除烦安神的作用；红花能活血通经、祛瘀止痛；益母草能活血调经、利水通淋、清热解毒；牛膝能活血调经、补益肝肾、利水通淋、引火下行；泽兰能活血调经、祛瘀消痈、利水消肿。故答案选 BDE.

9.ABDE.桃仁既能活血祛瘀，润肠通便，用于瘀血阻滞的多种病证以及肺痈、肠痈和肠燥便秘；又能止咳平喘而用于咳嗽气喘。故答案选 ABDE.

10.AE.郁金、姜黄为同一植物的不同药用部位，均能活血散瘀、行气止痛；而郁金尚能清心凉血、利胆退黄、行气解郁；故答案选 AE.

11.ABCDE.延胡索具有显著的活血行气止痛的作用，善治多种血瘀气滞痛证，故选答案 ABCDE.

12.CD.益母草具有活血调经、利水消肿和清热解毒的作用，而泽兰具有活血调经、利水消肿和祛瘀消痈的作用，两药的共同功能是活血调经和利水消肿，故答案选 C 和 D.