

历年真题试卷（五）

一、单项选择题（每一道题下面有 A、B、C、D、E 五个备选答案，请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑，共 150 题，每题 2 分）。

1.近代护理学的形成是从

- A.16 世纪中叶开始 B.17 世纪中叶开始 C.18 世纪中叶开始
D.19 世纪中叶开始 E.20 世纪中叶开始

2.对前来门诊的患者，首先应进行

- A.卫生指导 B.健康教育 C.预检分诊
D.心理安慰 E.查阅病案资料

3.病室的适宜温度为

- A.10~15℃ B.15~18℃ C.16~20℃
D.18~24℃ E.26~28℃

4.以下哪项是属于患者的客观资料

- A.我的头很疼 B.我咽喉部充血 C.我入睡困难
D.我不想吃饭 E.我感到恶心

5.在临床护理操作中，不符合省力原理的是

- A.在协助患者移动体位时，两脚应前后或左右分开，尽量扩大支撑面
B.在进行低平面的护理操作时，双下肢应随身体动作的方向前后或左右分开
C.提取物品时，尽量将物品靠近身体
D.能使用整只手时，避免只用手指进行操作
E.操作时两腿前后分开稍屈膝

6.关于更换卧位，不正确的是

- A.先将各种导管安置妥当 B.颈椎牵引者，翻身时先放松牵引
C.翻身时，避免拖、拉、推等动作 D.颅脑手术者，应取健侧卧位或平卧位
E.翻身后注意伤口不可受压

7.关于半坐卧位，正确的是

- A.摇起床头 $\geq 60^\circ$
B.适用于面部及颈部手术患者，减少局部出血
C.对于呼吸困难患者，下肢屈膝的目的是为了使回心血量增加
D.对于腹部手术后的患者，采取半卧位可增加腹部切口处的张力
E.盆腔炎患者，可使炎症扩散

8.两人搬运患者的正确方法是

- A.甲托背部，乙托臀部和膝部 B.甲托头部和肩部，乙托臀部
C.甲托颈部和腰部，乙托大腿和小腿 D.甲托头部和背部，乙托臀部和小腿
E.甲托头颈肩部和腰部，乙托臀部和膝部

9.促进患者舒适的护理措施不包括

- A.尊重患者生活方式 B.向患者介绍病室环境及有关规定

- C.营造良好的就医环境 D.了解患者的需求
E.放宽探视时间限制，延长陪护时间
- 10.使用约束带时应重点观察的是
A.衬垫是否移位 B.约束部位局部皮肤颜色
C.约束带是否牢靠 D.患者的体位是否合适、舒适
E.患者的神志
- 11.缓解患者不适的首要护理措施为
A.给患者以心理支持 B.使患者处于舒适体位
C.了解引起不适的原因 D.调整病室环境
E.使用药物缓解症状
- 12.某男性患者，国家重点科研攻关项目负责人，今晨在实验室工作时因“胸部不适”以急性心肌梗死收入CCU，并立即给予氧气吸入和心电监护。现神情呈痛苦面容，目前促进该患者舒适的首要护理措施是
A.调整体位 B.缓解疼痛 C.按摩疼痛部位
D.介绍环境 E.心理咨询
- 13.慢性肾小球肾炎患者，首选血管紧张素转换酶抑制剂进行降压治疗，主要是因为该药有助于
A.促进肾小球基底膜修复 B.减轻蛋白尿 C.促进肾小球滤过
D.增加肾脏供血 E.降低血管对肾素敏感性
- 14.各期褥疮局部处理均可采用
A.创面引流 B.抗生素纱布局部湿敷
C.3%过氧化氢溶液冲洗 D.红外线照射
E.拇指腹对局部环形按摩
- 15.关于深静脉血栓形成，不正确的是
A.静脉血栓形成是静脉冲的一种急性非化脓性炎症
B.病变主要累及四肢浅静脉或下肢深静脉
C.深部静脉血栓形成的原因是静脉血流加速
D.对大手术后患者，应鼓励患者在床上进行下肢的主动活动
E.已有小腿静脉血栓形成时，以防血栓向近心端延伸或脱落
- 16.妊娠时胎膜早破患者应采用的体位是
A.半卧位 B.平卧位 C.侧卧位
D.头低脚高位 E.截石位
- 17.某患者，女性，70岁，脑梗塞后右上肢可移动，但不能抬起，该患者的右上肢肌力评级为
A.0级 B.1级 C.2级
D.3级 E.4级
- 18.手术器械的最有效灭菌法是
A.燃烧法 B.高压蒸汽灭菌法 C.煮沸消毒法

- D.干热灭菌法 E.微波效度灭菌法
- 19.常用于黏膜及深部伤口冲洗的消毒溶液是
A.0.2%过氧乙酸溶液 B.70%乙醇溶液 C.0.1%氯胺溶液
D.0.5%碘酊 E.0.05%苯扎溴胺溶液
- 20.取用瓶装的无菌溶液时，正确的操作是
A.应在高出容器 25cm 处倒出溶液 B.用敷料堵住瓶口，使溶液缓慢流出
C.直接在瓶中蘸取 D.已经打开的瓶内溶液可保存 24h
E.倒出的溶液未使用及时倒回瓶中
- 21.关于发热的叙述，下列哪项是正确的
A.常见的发热类型有 6 种
B.发热必须有致热原的参与
C.外致热原直接作用于体温调节中枢
D.体温上升期有畏寒，退热期有出汗
E.发热时是散热中枢兴奋，退热时是寒颤中枢兴奋
- 22.健康成人间个体差异较大的生命体征是
A.体温 B.脉搏 C.呼吸
D.血压 E.意识状态
- 23.以下诊脉操作错误的是
A.诊脉前患者保持安静 B.患者手臂伸展放于舒适体位
C.操作者用食指、中指、无名指诊脉
D.测量 30s 所得脉搏次数乘以 2 即为患者的脉率
E.有绌脉者先听心率，再测脉率，计时 1min
- 24.测量呼吸的方法，错误的一项是
A.测量前向患者解释以取得合作
B.观察患者胸腹起伏，一起一伏为呼吸一次
C.注意呼吸的深度和节律
D.成人、儿童测量时间可为 30s，所得次数乘以 2 即为患者每分钟呼吸频率
E.呼吸异常者测量时间 1min
- 25.测量血压时听到搏动声音突然变弱或消失，此时袖带内压力
A.大于心脏收缩压 B.等于心脏收缩压 C.小于心脏收缩压
D.等于心脏舒张压 E.大于心脏舒张压
- 26.下列哪项不是热的应用目的
A.促进炎症消散 B.减轻深部组织充血 C.减轻疼痛
D.制止炎症扩散或化脓 E.保暖
- 27.冷疗时间过长可致
A.肌肉、肌腱和韧带等组织松弛 B.皮肤抵抗力下降
C.增强痛觉神经的兴奋性 D.增进局部免疫功能
E.血液循环和细胞代谢发生障碍致组织坏死

- 28.正确的乙醇拭浴操作是
- A.头部放热水袋，足部放冰袋
B.新生儿用乙醇拭浴
C.发生寒战应减慢拭浴速度
D.足底为乙醇拭浴禁忌部位
E.擦拭胸腹部时动作轻柔
- 29.某大学生，男，早晨锻炼时不慎扭伤踝关节，2h后到学校医务室就诊，正确的处理方法是
- A.热敷
B.冷敷
C.冷热敷交替使用
D.热水足浴
E.夹板固定
- 30.下列哪项不符合要素饮食的特点
- A.由各种天然营养素合成
B.无需消化液也能被吸收
C.有利于纠正负氮平衡
D.适用于胃肠道痿、急性胰腺炎等患者
E.符合正常生理营养需求
- 31.鼻饲流质每次注入量不能超过
- A.200ml
B.300ml
C.400ml
D.500ml
E.600ml
- 32.关于药物保管原则，下列不正确的是
- A.药柜宜放在光线充足处
B.专人保管，定期检查
C.内服药与外用药分类保管
D.麻醉药加锁保管
E.瓶签模糊的药物认真核对后可以
- 33.准备口服药时下列哪项欠妥
- A.水剂：勿摇匀以免沉淀物混入
B.片剂：用药勺取用
C.油剂：在杯内加少量水以避免油剂附着在杯上
D.不足 1ml 的药液需使用滴管吸取
E.配个人专用药物，不可彼此借用
- 34.少尿是指 24h 尿量少于
- A.50ml
B.100ml
C.200ml
D.300ml
E.400ml
- 35.关于带气囊导尿管，正确的是
- A.当注入一定量的液体后可将尿管固定在膀胱内
B.便于插管
C.插管见尿后再插入 5cm 即可
D.用于测定残余尿 E.用于鉴定尿闭或尿潴留
- 36.输液时发生静脉痉挛致滴注不畅时应
- A.减慢滴注速度
B.抬高输液瓶
C.加压输液
D.适当更换患者体位
E.局部热敷
- 37.静脉输液不慎发生空气栓塞，致死的栓塞部位在
- A.左房室口
B.右房室口
C.主动脉入口
D.肺动脉入口
E.上腔静脉口
- 38.关于溶血反应所致的急性肾衰竭症状，错误的是

- A.少尿或无尿 B.高钾血症 C.酸中毒
D.可出现管型尿和蛋白尿 E.尿素氮滞留
- 39.护士观察患者瞳孔时，不需记录的项目是
A.双侧瞳孔的大小 B.双侧瞳孔的对称性 C.双侧瞳孔的形状
D.双侧瞳孔的清晰度 E.对光反射情况
- 40.生物死亡期的特征是
A.心跳停止 B.呼吸停止 C.各种反应消失
D.意识不清 E.体温接近室温
- 41.根据咯血量，临床将咯血 $<100\text{ml/d}$ 称为
A.痰中带血 B.少量咯血 C.中等量咯血
D.大量咯血 E.大咯血
- 42.有关机械吸痰注意事项中，哪项不合适
A.每次吸引时间应少于 15s
B.两次抽吸间隔少于 3min
C.吸痰动作要轻柔
D.在吸痰前、后适当提高吸入氧的浓度
E.严格无菌操作
- 43.某呼吸衰竭患者在应用人工呼吸器和呼吸兴奋剂过程中出现恶心、呕吐、烦躁、颜面潮红、肌肉颤动等现象，应考虑是
A.继发感染 B.通气量不足 C.呼吸兴奋剂过量
D.呼吸性碱中毒 E.痰液堵塞
- 44.张先生，骑跨位受伤，会阴部肿胀、淤斑，尿道口滴血，尿意急迫，但不能排出，处理首选
A.下腹部热敷，按摩 B.试插导尿管 C.耻骨上膀胱造瘘
D.肌注氨甲酰胆碱 E.耻骨上膀胱穿刺
- 45.某慢性阻塞性肺气肿患者，剧烈咳嗽后突然出现右侧剧烈胸痛，呼吸困难加重，右胸叩诊鼓音，应考虑并发症为
A.慢性肺心病 B.肺炎 C.自发性气胸
D.肺不张 E.胸膜炎
- 46.某肺心病患者，血气分析：动脉血氧分压 6.0kPa (45mmHg)，动脉血二氧化碳分压 10.0kPa (75mmHg)，应给予哪种氧疗法
A.持续低流量、低浓度给氧 B.持续高流量、高浓度给氧
C.间歇低流量、低浓度给氧 D.间歇高流量、高浓度给氧
E.间歇高流量、酒精湿化给氧
- 47.高血压病患者睡眠时突感极度胸闷，气急，大汗淋漓，咳大量粉红色泡沫痰，端坐呼吸，血压 $26.6/14.7\text{kPa}$ ($200/110\text{mmHg}$)，心率 110 次/min。下列哪项护理是错误的
A.安慰患者，稳定情绪 B.置患者于两腿下垂坐位
C.酒精湿化吸氧 $6\sim 8\text{L/min}$ D.建立静脉通路

- E.静脉滴注给药宜快速
- 48.长期卧床的慢性心功能不全患者，其水肿的分布特点是
- A.以踝内侧明显 B.以胫前部明显 C.以颜面部明显
D.以腰背部、骶尾部明显 E.以四肢明显
- 49.接受降压药物治疗的高血压病患者，起床时晕倒，片刻后清醒，首先考虑
- A.直立性低血压 B.心源性休克 C.高血压危象
D.高血压脑病 E.急性左心衰竭
- 50.某原发性高血压患者，吸烟史 20 年，肥胖，目前血压 21.3/12.7kPa (160/95mmHg)，下列健康教育内容哪项错误
- A.保持情绪稳定 B.适量运动 C.高热量、高糖饮食
D.戒烟 E.控制高血压
- 51.成人脉压大于 5kPa 可见于
- A.甲状腺功能减退 B.心包积液 C.严重二尖瓣狭窄
D.主动脉瓣关闭不全 E.主动脉瓣狭窄
- 52.某风湿性心脏病患者，卧床 4 个月余，每天需作下肢被动活动和按摩，其目的是
- A.促进末梢循环减少回心血量 B.防止肢体肌肉萎缩 C.防止下肢静脉血栓形成
D.防止足部发生褥疮 E.使患者舒适促进睡眠
- 53.某急性心肌梗死患者发病 48h 后，要求到厕所大便，护士应该
- A.嘱家人陪往 B.肛塞开塞露后，再允许前往
C.先给予缓泻剂，再允许前往 D.如无便秘史，应允许前往
E.坚持制止，指导床上使用便盆
- 54.某肝性脑病患者需要灌肠，最适宜的灌肠液为
- A.肥皂水 B.生理盐水 C.高锰酸钾溶液
D.碳酸氢钠溶液 E.生理盐水加白醋
- 55.某消化性溃疡患者，因上腹疼痛、反酸入院，治疗期间由于饮食不当并发大出血，此时不会出现
- A.呕吐 B.黑粪 C.昏厥
D.休克 E.上腹痛加重
- 56.上消化道出血患者，血压 10/6kPa (75/45mmHg)，脉搏 130 次/min，面色苍白，神志恍惚，四肢厥冷，无尿，估计出血量约为
- A.250ml 以下 B.250~300ml C.300~400ml
D.500~1000ml E.1000ml 以上
- 57.某肝硬化患者经利尿治疗后，腹水消退，但经常处在深睡状态，可被唤醒，醒后回答问题正确，去除刺激后又迅速入睡，应判断为
- A.谵妄 B.浅昏迷 C.昏睡
D.嗜睡 E.意识模糊
- 58.某中学生因剧烈咳嗽，咳少量血丝痰，以肺部感染诊断入院，经实验室检查后，医嘱给予红霉素治疗。提示其肺部感染病原体是

- A.肺炎链球菌 B.葡萄球菌 C.肺炎克雷伯杆菌
D.流感嗜血杆菌 E.肺炎支原体
- 59.有幽门梗阻者行胃镜检查前 2~3d 应给予
A.流食 B.半流食 C.低脂半流食
D.少渣普食 E.免奶普食
- 60.急性肾炎临床首发症状多为
A.少尿、无尿 B.高血压 C.心力衰竭（全心衰）
D.水肿、血尿 E.高血压脑病症状
- 61.原发肾病综合征常可自发形成血栓的原因是
A.血小板增多 B.血管内皮易受损 C.组织因子易释放
D.血液多凝状态 E.红细胞增多
- 62.急性肾衰少尿或无尿期易引起高血钾症，其危害是
A.全身水肿 B.体重增加 C.高血压
D.急性左心衰 E.抑制心肌细胞易致严重心率失常
- 63.急性肾衰预防高血钾具体措施哪项是错误的
A.避免食用含钾多食品如蘑菇、榨菜 B.不用含钾多的药物如氯化钾
C.遵医嘱可口服甘露醇，促钾离子排出 D.禁用库存血
E.贫血严重可用库存血
- 64.慢性肾炎健康教育不正确的是
A 避免受凉、劳累 B 高蛋白饮食 C 禁用肾毒素药物
D 育龄妇女注意避孕 E 按时测血压，调整降压药量
- 65.针对慢性肾衰竭患者的潜在感染护理问题，不应采取的护理措施是
A.避免与呼吸道感染者接触 B.减少探陪
C.室内定时消毒 D.每日口服小剂量抗菌药
E.注意保暖
- 66.脑出血患者发生脑疝与下列哪项无关
A.用力排便 B.气道阻塞严重缺氧 C.腰穿放液过多
D.脱水剂快速静脉滴注 E.快速大量补液
- 67.某下肢瘫痪者，经查肢体不能自行抬起，此肌力应判断为
A.0 级 B.1 级 C.2 级
D.3 级 E.4 级
- 68.一般脑血栓患者，早期进行患肢功能锻炼宜在发病后几天进行
A.3 天 B.1 周 C.2 周
D.3 周 E.4 周
- 69.某脑血管病瘫痪患者，需进行功能锻炼，错误的是
A.制定功能锻炼计划 B.尽早进行自主运动锻炼
C.使用辅助器具 D.配合按摩理疗 E.注意做好保护措施
- 70.下列瘫痪患者的呼吸道护理，哪项是错误的

- A.保持室内空气流通、保暖
B.鼓励患者尽量咳嗽、排痰
C.喂食要慢，以免呛入气管
D.注意口腔护理
E.对分泌物较多而咳嗽无力者应先翻身后吸痰
- 71.瘫痪肢体宜保持功能位，下列哪项是错误的
A.膝关节伸直
B.腕关节稍背曲
C.肘关节屈曲
D.踝关节垂直
E.膝关节外置一枕以防外旋
- 72.深昏迷最重要的体征是
A.瞳孔反射消失
B.压眶反射迟钝
C.病理反射阴性
D.角膜反射减弱
E.吞咽反射亢进
- 73.某甲状腺功能亢进症患者，体温 39.5°C，脉搏 150 次/min，出现恶心、呕吐、大汗淋漓、嗜睡等症状。初步判断为
A.抗甲状腺药物中毒
B.甲状腺功能低下
C.甲状腺危象
D.恶性突眼
E.¹³¹I 治疗反应
- 74.1 型糖尿病临床表现特点下列哪项不妥
A.多发生于青少年
B.起病较急
C.症状重
D.起病缓慢
E.常以酮症酸中毒为首发症状
- 75.目前糖尿病患者的主要死亡原因为
A.下肢动脉血栓形成
B.酮症酸中毒
C.高渗性非酮症昏迷
D.冠心病、脑血管疾病
E.糖尿病性肾病变
- 76.某急性再生障碍性贫血患者，突然出现头痛、头晕、视力模糊、呕吐，疑为颅内出血，护理措施不正确的是
A.通知医生
B.吸氧
C.头低脚高位
D.建立静脉通道
E.头部置冰袋
- 77.系统性红斑狼疮的诱因不包括
A.运动
B.药物
C.阳光照射
D.感染
E.食物
- 78.某急性白血病患者，乏力、消瘦 1 个月，伴发热 1 周，食欲减退。化疗后有恶心的反应，但无呕吐。测血白细胞计数为 $2.0 \times 10^9/L$ ，血小板计数为 $150 \times 10^9/L$ 。该患者的护理问题可排除下列哪一项
A.潜在的感染
B.营养失调：低于机体需要量
C.活动无耐力
D.舒适的改变：发热、恶心
E.潜在的颅内出血
- 79.基础代谢率常用的计算公式是
A.基础代谢率=（脉率-脉压）-111
B.基础代谢率=（脉率+脉压）-111
C.基础代谢率=（脉压-脉率）+111
D.基础代谢率=（脉率-脉压）+111
E.基础代谢率=（脉率+脉压）+111
- 80.乳癌的淋巴转移途径中，最多见的是
A.经肋间淋巴管侵入胸骨旁淋巴结
B.经胸大肌外侧淋巴管侵入腋窝淋巴结

- C.经皮下淋巴管侵入另侧乳房
D.经深部淋巴网侵入腹直肌鞘
E.经深部淋巴管网侵入肝镰状韧带
- 81.恶性肿瘤最多见、最早出现的局部表现是
A.肿块
B.疼痛
C.溃疡
D.破坏所在器官结构
E.淋巴转移
- 82.腹外疝好发于腹股沟区的主要原因是
A.腹股沟韧带松弛
B.腹外斜肌腱膜发育不良
C.腹股沟区有精索及圆韧带通过
D.腹内斜肌和腹横肌发育不良
E.腹内压增高
- 83.腹膜炎的主要标志是
A.明显腹胀
B.腹式呼吸减弱或消失
C.肠鸣音消失
D.压痛和反跳痛
E.腹肌紧张
- 84.对腹部闭合性损伤伴休克，且腹腔穿刺抽出不凝固血液的患者，首先应
A.在治疗休克的同时紧急手术
B.行胃肠减压
C.禁食
D.抗休克
E.先抗休克，然后进行手术
- 85.诊断为肠梗阻后，极为重要的是必须明确
A.肠梗阻的部位
B.肠梗阻的程度
C.肠梗阻是否绞窄
D.肠梗阻的原因
E.是否为完全性肠梗阻
- 86.急性阑尾炎早期腹痛多位于上腹部和脐周，是因为
A.内脏功能紊乱
B.腹膜炎刺激
C.内脏神经反射
D.胃肠道反射痉挛
E.合并急性胃肠炎
- 87.直肠癌根治术是否保留肛门，主要决定于
A.肿瘤的病理类型
B.肿瘤的大小
C.肿瘤距肛门的距离
D.肿瘤是否侵犯周围组织
E.乙状结肠的长度
- 88.急腹症患者阵发性腹痛常见于
A.阑尾炎
B.溃疡病穿孔
C.肝破裂内出血
D.机械性肠梗阻
E.肠绞窄
- 89.休克经处理后，微循环改善的最重要指标是
A.神志恢复清楚
B.皮肤颜色转红
C.肢端温度上升
D.血压回升
E.尿量增多
- 90.下肢深静脉功能试验的目的是了解
A.下肢静脉有无曲张
B.大隐静脉瓣膜功能是否正常
C.交通支瓣膜是否正常
D.下肢深静脉有无阻塞
E.小隐静脉瓣膜功能是否正常
- 91.胸部外伤后，胸壁软化（浮动肋）的发病原因是
A.2根以上肋骨骨折
B.多根多处肋骨骨折
C.胸骨骨折
D.反常呼吸
E.气胸
- 92.硬膜外麻醉后需平卧4~6h，其原因是

- A.减轻药物吸收后的毒性反应
 B.有利于维持血压稳定
 C.防止呕吐误吸
 D.防止术后头痛
 E.有利于保持呼吸道通畅
- 93.手术人员穿好无菌手术衣，戴好无菌手套后，双手应放在
 A.交叉腋下
 B.腰部
 C.胸前
 D.身体两侧
 E.高举双手
- 94.浅II度烧伤的临床特点是
 A.局部红肿，有疼痛和烧灼感，皮温稍增高
 B.水疱较饱满，有剧痛和感觉过敏，皮温增高
 C.水疱较小，感觉稍迟钝，皮温稍低
 D.水疱扁平，感觉稍迟钝，皮温稍低
 E.创面无水疱，感觉消失，皮温低
- 95.某患者从高处跌下致骨盆骨折、左肱骨开放性骨折，伤口正在大量出血，首先应采取的措施是
 A.骨折复位并固定
 B.清创缝合
 C.输血输液
 D.包扎伤口止血
 E.骨折复位
- 96.截瘫患者留置导尿管定时开放引流，其目的是
 A.预防结石
 B.预防泌尿道感染
 C.训练膀胱功能
 D.计尿量
 E.便于护理
- 97.抢救颅内压增高时首选
 A.腰椎穿刺
 B.激素
 C.脱水剂
 D.镇痛
 E.止吐
- 98.单纯颅底骨折的临床表现哪项除外
 A.脑脊液漏
 B.偏瘫
 C.“熊猫眼”征
 D.上眼睑下垂
 E.乳突区瘀斑
- 99.对颅脑损伤患者测量生命体征的顺序应该是
 A.呼吸、脉搏、血压、意识
 B.脉搏、呼吸、血压、意识
 C.意识、呼吸、脉搏、血压
 D.意识、脉搏、呼吸、血压
 E.呼吸、意识、脉搏、血压
- 100.腰椎间盘突出症最重要的体征是
 A.椎间隙压痛
 B.椎旁压痛
 C.直腿抬高试验(+)
 D.直腿抬高试验(+)，加强试验(+)
 E.腰椎侧突畸形
- 101.有关肠外营养支持的描述正确的是
 A.价格低廉，使用方便
 B.减少消化液分泌，利于肠道休息
 C.有利于保持肠黏膜的屏障功能
 D.符合人体摄取营养的生理过程
 E.脂肪是给予肠外营养支持时主要的非蛋白质能源
- 102.以下与低钾血症表现不符的是
 A.肌肉无力
 B.腹胀
 C.心率缓慢

- D.心室纤颤 E.心电图出现 U 波
- 103.下列对全身化脓性感染的治疗中，错误的是
- A.及时处理原发病灶，去除坏死组织，及时切开脓肿进行引流
B.提高全身的抵抗力
C.使用足量抗生素
D.因有接触性感染，因此接触后要洗手
E.对症处理，降温，抗休克治疗
- 104.治疗急性梗阻性化脓性胆管炎的关键是
- A.使用抗生素 B.使用升压药 C.扩充血容量
D.解除胆管梗阻 E.解热、镇痛
- 105.胃十二指肠溃疡穿孔最重要的诊断依据是
- A.上腹部剧烈疼痛 B.X 线检查见膈下游离气体
C.腹肌紧张 D.恶心、呕吐 E.肠鸣音减弱
- 106.前列腺切除术后护理重点是
- A.观察和防止出血 B.防止感染 C.防止尿道狭窄
D.防止血栓形成 E.防止尿失禁
- 107.关于肾损伤患者进行非手术治疗的护理措施叙述不正确的是
- A.应绝对卧床休息 2~4 周
B.血尿消失，可以允许患者适当下床活动
C.对于高热者可以物理或药物降温
D.若腰腹部肿块逐渐增大，说明有进行性出血或尿外渗
E.腰腹部疼痛明显者，可给予止痛、镇静剂
- 108.患者，男性，65 岁，因肺心病导致呼吸困难，采用半坐卧位的原因是
- A.使患者逐渐适应体位变化，利于向站立过渡 B.减轻心脏负担
C.减少局部出血 D.减轻腹部切口疼痛 E.防止感染向上蔓延
- 109.下列关于肾癌患者叙述正确的是
- A.血尿为间歇性、无痛性镜下全血尿 B.可有高血压、红血球增高等表现
C.比膀胱癌少见且发展较慢 D.X 线检查重要，B 超检查无意义
E.腰部疼痛剧烈
- 110.预防术后肺不张的措施，下列哪项无效
- A.术前锻炼深呼吸 B.吸烟者术前戒烟 C.抗生素控制上呼吸道感染
D.镇咳剂止咳 E.防止术后误吸呕吐物
- 111.胆管炎患者的饮食宜给
- A.低脂、高糖饮食 B.高脂、低糖饮食 C.低脂、低糖饮食
D.低糖饮食，补充维生素 B、维生素 C、维生素 K
E.低脂饮食
- 112.前列腺增生排尿障碍是由于
- A.后尿道形态改变尿道梗阻 B.膀胱收缩无力

- C.尿道黏膜水肿 D.尿道括约肌痉挛 E.膀胱颈梗阻
- 113.后尿道断裂术后的导尿管应保留
- A.1周 B.2周 C.3~4周
- D.5周 E.6周
- 114.代谢性酸中毒的主要原因是
- A.碳酸氢盐过多 B.碳酸氢盐缺乏 C.二氧化碳过多
- D.二氧化碳缺乏 E.以上都不正确
- 115.关节受外力作用，发生异常扭转所致的损伤为
- A.挫伤 B.挤压伤 C.扭伤
- D.裂伤 E.擦伤
- 116.建筑工人，42岁，右上臂被砖块击伤1h。体检：右上臂肿胀，异常活动，腕及掌指关节不能背伸，拇指不能背伸。可能是损伤了
- A.肱动脉 B.桡神经 C.正中神经
- D.尺神经 E.桡动脉
- 117.骨折移位的发生因素有
- A.暴力的大小、作用方向及性质 B.肌牵拉力
- C.肢体远侧段的重量 D.搬运及治疗不当 E.各种因素都可存在
- 118.下列哪类患者术后应早期起床活动
- A.疝修补术 B.晚期胃癌姑息手术 C.脾破裂切除术
- D.大隐静脉结扎术 E.门静高压断流术
- 119.输卵管由内向外依次为
- A.峡部、间质部、壶腹部、伞部 B.峡部、壶腹部、间质部、伞部
- C.间质部、峡部、壶腹部、伞部 D.间质部、峡部、伞部、壶腹部
- E.伞部、壶腹部、峡部、间质部
- 120.初孕妇初感胎动时间一般在
- A.14~16周 B.16~18周 C.18~20周
- D.20~22周 E.22~24周
- 121.Apgar评分所评定的内容为
- A.呼吸、心率、脉搏、哭声、肌张力
- B.呼吸、心率、皮肤颜色、喉反射、肌张力
- C.呼吸、心率、皮肤颜色、哭声、肌张力
- D.呼吸、心率、脉搏、喉反射、肌张力
- E.呼吸、体温、心率、哭声、肌张力
- 122.下列关于初乳的特点，错误的是
- A.初乳中脂肪和乳糖含量较成熟乳多 B.初乳含 β -胡萝卜素是淡黄色质稠
- C.含分泌型IgA，较成熟乳多 D.初乳是指产后7d内分泌的乳汁
- E.初乳中含蛋白质较成熟乳多
- 123.行胎心监护时，为判断基线胎心率，监护时间至少应为

- A.6min B.8min C.10min
 D.12min E.14min
- 124.妊娠高血压综合征，用大剂量硫酸镁治疗，最早出现的中毒反应是
 A.呼吸加快 B.呼吸减慢 C.尿量增多
 D.膝腱反射亢进 E.膝腱反射减弱
- 125.判断妊娠期糖尿病的依据是
 A.尿糖 B.尿酮体 C.血糖
 D.50g 葡萄糖耐量试验 E.75g 葡萄糖耐量试验
- 126.急产是指总产程少于
 A.1h B.2h C.3h
 D.4h E.5h
- 127.产后抑郁常见于
 A.产后 24h 内 B.产后 72h 内 C.产后 7d 内
 D.产后 2 周 E.产后 4 周
- 128.末次月经缩写为
 A.PMP B.LMP C.GMP
 D.PML E.GPT
- 129.宫颈癌根治术后，可以拔除尿管的时间是术后
 A.1~2d B.3~4d C.5~6d
 D.7~14d E.2 周以后
- 130.子宫脱垂是指子宫颈外口达
 A.坐骨结节水平以上 B.坐骨结节水平以下 C.坐骨棘水平以上
 D.坐骨棘水平以下 E.骶尾骨以下
- 131.导致子宫脱垂的最主要原因是
 A.圆韧带松弛 B.阔韧带变厚 C.骨盆漏斗韧带松弛
 D.宫颈横韧带松弛 E.盆底肌肉松弛
- 132.产后出血，最常见的原因是
 A.宫缩乏力 B.胎盘胎膜产留 C.胎盘植入
 D.软产道损伤 E.凝血功能障碍
- 133.原发性不孕症的定义是
 A.夫妇同居，性生活正常，未避孕，2 年未孕者
 B.夫妇同居，性生活正常，未避孕，1 年未孕者
 C.夫妇同居，性生活正常，虽第一次婚姻曾生育，此后未避孕，2 年未孕者
 D.夫妇同居，性生活正常，虽第一次婚姻曾生育，此后未避孕，1 年未孕者
 E.夫妇同居后 1 年未孕，一方有无法纠正的解剖生理缺陷者
- 134.判断脱水性质最常用的检查指标是
 A.体重 B.尿量 C.皮肤弹性
 D.血清钠 E.二氧化碳结合力

135. 小儿腹泻轻度脱水，丢失水分占体重的
 A. 3%~5% B. 5%~6% C. 7%~8%
 D. 9%~10% E. 10%~12%
136. 重症肺炎患儿面罩给氧时，吸氧浓度最好为
 A. 10%~20% B. 20%~30% C. 30%~40%
 D. 40%~50% E. 50%~60%
137. 法洛四联症患儿蹲踞所起的作用是
 A. 心脑血管血量增加 B. 缓解漏斗部痉挛 C. 腔静脉回心血量增加
 D. 休息，缓解疲劳 E. 减少右向左分流血量
138. 生理性贫血最明显的年龄是
 A. 1个月以内 B. 2~3个月 C. 5~6个月
 D. 8~9个月 E. 11~12个月
139. 肾病综合征患儿最常见的并发症是
 A. 感染 B. 血栓形成 C. 电解质紊乱
 D. 急性肾衰竭 E. 低血容量性休克
140. 典型麻疹皮疹特点
 A. 鲜红色粟粒疹 B. 疹间无正常皮肤 C. 出血性斑丘疹
 D. 暗紫色斑丘疹 E. 红色斑丘疹
141. 婴儿每日水的需要量为
 A. 120ml/kg B. 130ml/kg C. 140ml/kg
 D. 150ml/kg E. 160ml/kg
142. 中度贫血的标准是 Hb
 A. >120g/L B. 90~120g/L C. 60~90g/L
 D. 30~60g/L E. <30g/L
143. 小儿患水痘后重返托幼机构的要求是
 A. 体温正常 B. 食欲好转 C. 皮疹消退
 D. 全部皮疹干燥结痂 E. 不再出现新的皮疹
144. 患儿生后 8h，有高胆红素血症需用蓝光照射，照射过程中，灯管与患儿皮肤的距离为
 A. 10~20cm B. 22~32cm C. 33~50cm
 D. 55~60cm E. 60~65cm
145. 维生素 D 缺乏的患儿发生手足抽搐的主要原因是
 A. 饮食中缺钙 B. 甲状旁腺反应迟钝 C. 尿磷增加
 D. 尿钙增加 E. 骨骼钙化增加
146. 鹅口疮患儿用碳酸氢钠溶液清洗口腔，常用的浓度为
 A. 2% B. 2.5% C. 3%
 D. 3.5% E. 5%
147. 某系统性红斑狼疮女患者，病史 2 年，近日体温升高，关节红肿有压痛，出现面部红斑、蛋白尿而入院治疗，下列处理措施哪项不妥

- A.维持激素治疗 B.安排在背阳的病室 C.加强肢体锻炼
D.慎用阿司匹林 E.经常用清水洗脸
- 148.胰岛素生理功能是
- A.促糖原分解和糖异生，使血糖降低
B.促葡萄糖利用和转化，使血糖降低，促蛋白质合成
C.促蛋白质合成，维持男性第二性征
D.调节胃肠平滑肌运动
E.刺激骨髓红细胞生成
- 149.糖尿病患者体内葡萄糖不能被充分利用，发生消瘦的原因是
- A.口渴多饮 B.脂肪合成增多 C.无氧糖酵解增加
D.蛋白质和脂肪分解增多及失水 E.促进肌肉组织摄取葡萄糖
- 150.羊水过多是指妊娠的任何时期羊水量超过
- A.800ml B.1000ml C.1200ml
D.1500ml E.2000ml