

## 历年真题试卷（三）

### 一、单项选择题（每题 1.5 分，共 180 分。每一考题下面有 A、B、C、D、E 五个备选答案，请从中选择一个最佳答案）。

1.患者陈某，女性，36 岁，患乳腺癌广泛转移，病情日趋恶化，患者常独自一人坐在床上哭泣，不愿与医护人员、家属等交谈，你认为该临终患者的心理反应处于哪一阶段

- A.否认期                      B.协议期                      C.忧郁期  
D.转变期                      E.接受期

2.低钾血症患者最早出现的临床表现是

- A.肠麻痹                      B.肌无力                      C.心动过缓  
D.恶心、呕吐                E.腱反射减退

3.全身麻醉中最常见的并发症是

- A.上呼吸道梗阻              B.肺不张                      C.低血压  
D.高血压                      E.心律失常

4.破伤风患者注射破伤风抗毒素的目的是

- A.杀灭破伤风杆菌          B.中和血液中游离毒素  
C.抑制破伤风杆菌生长      D.中和与神经结合的毒素  
E.清除毒素来源

5.肠内营养患者最常见的胃肠道并发症是

- A.恶心呕吐                      B.腹胀                        C.腹痛  
D.便秘                        E.腹泻

6.某休克患者进行快速输液中，监测得中心静脉压 15cmH<sub>2</sub>O，血压 80/60mmHg。应采取的措施是

- A.加快输液速度                      B.减慢输液速度  
C.暂停输液                        D.减慢输液，加用强心剂  
E.用升压药

7.全身麻醉清醒前，最重要的护理是

- A.定时测生命体征          B.保持呼吸道通畅          C.持续静脉输液  
D.观察伤口渗血情况      E.防止意外损伤

8.患者，男，48 岁，胃大部分切除手术后第 4 天，患者发热、伤口疼痛，检查见切口红肿，经治疗后，红肿消退，术后第 8d 拆线，切口愈合良好。切口愈合记录为

- A.I/乙                        B.II/乙                        C.II/丙  
D.III/甲                        E.III/丙

9.强刺激抗癌药不慎漏入皮下，错误的护理是

- A.立即停止注药              B.利用原针头回抽          C.皮下注射解毒剂  
D.局部热敷                      E.局部封闭

10.患者，男，42 岁，经颈内静脉穿刺行中心静脉置管后，出现胸闷、胸痛、呼吸困难、同侧呼吸音减弱，首先考虑的并发症是

- A.气胸                      B.血管损伤                      C.胸导管损伤  
D.空气栓塞                      E.导管错位
- 11.患者，男，62岁，心绞痛两年，4h前出现胸骨中段剧烈疼痛，舌下含服硝酸甘油不能缓解，体检：心率增强，心尖部可闻及舒张期奔马律，心电图ST段抬高，该患者的检查结果可能出现
- A.血糖减低                      B.白细胞减少                      C.血清心肌酶升高  
D.C反应蛋白降低                      E.红细胞沉降率正常
- 12.嵌顿性疝与绞窄性疝的区别是
- A.疝囊有无压痛                      B.疝内容物能不能回纳  
C.疝内容物有无血运障碍                      D.是否有休克  
E.是否有机械性肠梗阻的表现
- 13.某急性肠梗阻患者，大量呕吐后出现皮肤黏膜干燥、皮肤弹性差、尿少、尿比重高，同时有恶心、呕吐，软弱无力。测得血清钠浓度为143mmol/L，为补充患者所丢失的体液，首选可静脉输注的液体是
- A.5%葡萄糖                      B.10%葡萄糖                      C.3%氯化钠  
D.平衡盐溶液                      E.2.5%碳酸氢钠
- 14.患者，男，48岁，胆总管结石合并胆管炎，在非手术治疗期间，可能发生重症胆管炎，护士应重点观察
- A.黄疸、腹痛                      B.呼吸、体温                      C.面色、肢体温度  
D.血压、意识                      E.腹膜刺激症
- 15.消化性溃疡患者在治疗过程服用哪种药物时，应告知可能出现黑便
- A.氢氧化铝凝胶                      B.枸橼酸铋钾                      C.奥美拉唑  
D.克拉霉素                      E.甲硝唑
- 16.呼吸困难的患者有唇舌发绀现象，表明其血氧饱和度至少低于
- A.95%                      B.90%                      C.85%  
D.80%                      E.75%
- 17.以下哪种情况发生的左心衰竭，不是源于左心室的负荷增加
- A.二尖瓣狭窄                      B.主动脉瓣狭窄                      C.二尖瓣关闭不全  
D.主动脉瓣不全                      E.高血压
- 18.急性出血坏死性胰腺炎最常见的并发症是
- A.化脓性感染                      B.休克                      C.急性肾衰竭  
D.胰腺假性囊肿                      E.胰腺脓肿
- 19.伴有痰液增多的支气管哮喘发作患者，为缓解症状应优先选用
- A.短效β受体激动剂                      B.缓释型β受体激动剂  
C.吸入型糖皮质激素                      D.吸入型抗胆碱能药  
E.口服茶碱类药
- 20.原发性下肢静脉曲张的典型表现为
- A.久立后有酸胀感                      B.足背部水肿、色素沉着

- C.皮肤脱屑、瘙痒      D.游走性浅静脉炎  
E.下肢浅静脉曲张、蜿蜒扩张、迂曲
- 21.小脑幕切迹疝的瞳孔变化特点是  
A.伤后一侧瞳孔立即散大      B.双侧瞳孔不等圆      C.双侧瞳孔大小多变  
D.一侧瞳孔进行性散大      E.双侧瞳孔缩小
- 22.以下哪项是反映慢性阻塞性肺疾病气流受限特点的临床表现  
A.呼吸三凹征      B.湿啰音      C.呼吸深长  
D.语颤减弱      E.缩唇呼吸
- 23.脑水肿进行脱水治疗，常用药物是  
A.速尿      B.地塞米松      C.氢化可的松  
D.20%甘露醇      E.50%葡萄糖液
- 24.女性患者，41岁，头部外伤后昏迷约20min，苏醒2h后又再次昏迷，首先考虑  
A.急性硬脑膜外血肿      B.急性硬脑膜下血肿      C.急性脑内血肿  
D.急性帽状腱膜下血肿      E.颅骨骨膜下血肿
- 25.张力性气胸的急救措施是  
A.局部加压包扎      B.气管插管辅助呼吸      C.排气减压  
D.吸氧      E.开胸探查
- 26.开放性气胸的主要病理生理变化是  
A.反常呼吸运动      B.皮下气肿      C.纵隔移位  
D.纵隔摆动      E.肺萎陷
- 27.气胸患者行胸膜腔闭式引流，插管位置常在  
A.第2肋间锁骨中线      B.第4肋间锁骨中线      C.第8肋间腋前线  
D.第6肋间腋中线      E.第7肋间腋后线
- 28.肾输尿管结石的主要症状是  
A.无痛性肉眼血尿      B.肾绞痛和血尿      C.尿频、尿痛  
D.排尿困难      E.尿失禁
- 29.前列腺摘除术后留置气囊尿管的主要目的是  
A.膀胱引流      B.膀胱冲洗      C.压迫前列腺窝，防止出血  
D.防止感染      E.观察引流量
- 30.肾结核的血尿多为  
A.运动后血尿      B.终末血尿      C.无痛性血尿  
D.全血尿      E.初血尿
- 31.患者，女，50岁，初诊为高血压，目前血压维持在145/85mmHg。护士在评估中发现患者喜好下列食物。护士应指出，其中最不利于控制高血压的食物是  
A.猪肝      B.鲫鱼      C.瘦肉  
D.河虾      E.竹笋
- 32.下肢骨牵引的护理，错误的是  
A.抬高床尾30cm      B.翻身时可放松牵引绳

- C.观察患肢的血液循环 D.牵引重量不能触地  
E.加强皮肤护理
- 33.急性胰腺炎患者出现下列哪项临床表现时，提示病情危重  
A.腹痛向腰背部放射 B.白细胞计数增多 C.伴有发热  
D.出现黄疸 E.发生抽搐
- 34.外伤性截瘫患者训练膀胱反射的护理措施是  
A.多饮水 B.每周更换导尿管 C.必要时膀胱冲洗  
D.定时变换体位，抬高床头 E.持续导尿两周后改为定时开放导尿管
- 35.上消化道出血患者发生呕血，表明其胃内的积血量至少达到  
A.150~190ml B.200~240ml C.250~300ml  
D.350~400ml E.450~500ml
- 36.在甲状腺功能亢进基础上发生周期性瘫痪的主要原因是并发  
A.周围神经炎 B.神经肌肉接头损伤 C.低血钾  
D.运动神经传导抑制 E.神经脱髓鞘样改变
- 37.疑为肝性脑病昏迷前期的患者，以下哪项临床表现与诊断不相符  
A.性格改变 B.行为异常 C.扑翼样震颤  
D.睡眠倒错 E.腱反射消失
- 38.在 Neuman 系统保健模式中，其对机体内在抵抗线的正确描述是  
A.机体的第一道防御机制 B.机体的第二道防御机制  
C.可以保护正常防御线免受应激源的破坏 D.能反映机体的稳定状态  
E.其任务是保护基本结构并支持正常防御线
- 39.患者，男，89岁，因腹部隐痛来院就诊。门诊以腹痛待查收入院。患者身高160cm，体重40kg，意识清楚，生活基本不能自理。护士在晨间为其进行口腔护理时发现患者口腔黏膜充血糜烂，舌苔增厚，有假膜。此时护士应  
A.要求患者每次饭后均要刷牙 B.要求家属加强照护，注意口腔清洁  
C.允许患者在不适时，自行消除假膜 D.提供0.9%生理盐水漱口  
E.提供3%碳酸氢钠溶液漱口
- 40.患者，女，38岁，大面积烧伤后5h入院，心率120次/min，血压70/50mmHg，尿少。发生上述状况最可能的原因是  
A.大量红细胞丧失造成肺换气障碍 B.大量水分蒸发造成脱水  
C.疼痛导致的生理反应 D.大量体液从血管内渗出引起低血容量休克  
E.创面细菌感染造成感染性休克
- 41.门静脉系与腔静脉系之间最主要的交通支是  
A.直肠下段肛管交通支 B.前腹壁交通支 C.腹膜后交通支  
D.胃底，食管下段交通支 E.肠系膜交通支
- 42.患者，男，33岁，干咳，胸痛，以自发性气胸入院。经积极治疗后已痊愈准备出院，护士告诉患者为预防复发最重要的措施是  
A.戒烟 B.清淡饮食 C.避免屏气用力

- D.积极锻炼身体                      E.保持情绪稳定
- 43.患者，男，28岁，在大排档聚餐后出现高热，腹泻，诊断为细菌性痢疾。对该患者采取的护理措施中，不正确的是
- A.给与胃肠道隔离                      B.给与高蛋白饮食                      C.酌情给与流质或半流质饮食
- D.记录排便的形状、次数E.留取大便标本送检
- 44.患者，女，35岁，车祸后并发血气胸，进行手术治疗后医嘱常规行沐舒坦（盐酸氨溴索）雾化吸入。用该药物的目的是
- A.解痉                                      B.平喘                                      C.止痛
- D.减少腺体分泌                      E.稀释痰液，促进排出
- 45.患者，女，17岁，行破伤风抗毒素过敏试验，20min后结果示局部皮丘红肿，硬结大于1.5cm，红晕大于4cm，自述有痒感。应采取的处理措施是
- A.将抗毒素分成4份，分次注射                      B.在对侧前臂作对照试验后再注射
- C.将抗毒素稀释，分两次注射                      D.待患者痒感消失后再全量注射
- E.将抗毒素分4次逐渐增加剂量注射
- 46.患者，男，55岁，因频发室性早搏入院。如厕时突然倒地不省人事，颈动脉扪不到搏动，未闻及呼吸音，双侧瞳孔散大。此时应立即采取的措施是
- A.平卧保暖                                      B.氧气吸入                                      C.心肺复苏
- D.建立静脉通路                      E.通知医生
- 47.患儿，女，3岁，因上呼吸道感染入院。目前出现高热，声音嘶哑，犬吠样咳嗽，吸气性喉鸣。为迅速缓解症状，首选的处理方法是
- A.地塞米松雾化吸入                      B.静点抗生素                                      C.静点强的松
- D.口服化痰药                                      E.以呼吸机行机械通气
- 48.护士遵医嘱为患者行10%葡萄糖酸钙10ml缓慢静脉推注，推注约5ml后护士发现推注稍有阻力，局部略肿胀，抽无回血，发生上述情况的原因可能是
- A.静脉痉挛                                      B.针刺入过深，穿破对侧血管壁
- C.针头斜面一半在血管外                      D.针头斜面紧贴血管内壁
- E.针头刺入皮下
- 49.患者，女，34岁。今早主诉昨晚夜间多醒，下午医生开出医嘱：地西洋5mg，po，sos，当晚患者睡眠良好，未使用该药物，该值班护士应在次日上午
- A.用红笔写“失效”                      B.用蓝笔写“失效”                      C.用红笔写“未用”
- D.用蓝笔写“未用”                      E.用红笔写上“作废”
- 50.万某，慢性菌痢患者，用保留灌肠治疗，操作过程正确的是
- A.患者右侧卧位                      B.灌入量500ml                                      C.肛管插入7cm
- D.保留1h以上                                      E.液面距肛门不超过60cm
- 51.患者，男，65岁，脑梗塞入院，意识模糊2d，身体虚弱，生命体征尚平稳，四肢发凉。护士用热水袋为其进行保暖，正确的方法是
- A.袋内水温为60℃                      B.热水袋外裹毛巾                                      C.热水袋置于腹部
- D.热水袋水温与室温相同后撤走热水袋                      E.叮嘱家属随时更换袋内热水

52.患者，男，50岁，平常嗜烟酒，有胆囊结石病史，昨晚饮酒和暴食后，出现左上腹疼痛，最可能的疾病是

- A.胆囊穿孔                      B.胆管阻塞                      C.肝硬化  
D.急性胰腺炎                      E.原发性肝癌

53.患者，男，50岁，以外伤入院治疗，在用氧过程中，家属私自将鼻导管氧流量调至10L/min，15min后患者继之出现烦躁不安、面色苍白、进行性呼吸困难等表现。该患者最可能出现了

- A.肺水肿                          B.肺不张                          C.肺气肿  
D.氧中毒                          E.心力衰竭

54.患者，女，37岁，出租车司机，每天工作10h，今日以尿频、尿急、尿痛1d，诊断肾盂肾炎收入院，护士向其进行健康宣教时，应说明最可能感染途径是

- A.上行感染                      B.下行感染                      C.血液感染  
D.直接感染                      E.淋巴系统感染

55.破伤风抗毒素皮试液的标准是每1ml皮试液含破伤风抗毒素是

- A.50IU                              B.100IU                              C.150IU  
D.1500IU                              E.15000IU

56.患者，男，27岁，既往体健，体检时肝功能正常，抗-HBs阳性，HBV其他血清病毒标记物均为阴性。其很担心自己患上乙型肝炎，护士应告知患者此时的状况是

- A.乙型肝炎且有传染病                      B.乙型肝炎但病情稳定  
C.乙型肝炎病毒携带状况                      D.处于乙型肝炎恢复期  
E.对乙型肝炎病毒具有免疫力

57.患者，男，50岁，因胆总管结石合并胆管炎收住入院拟行手术治疗，术后需放置

- A.胆囊造瘘管                      B.胸腔引流管                      C.T形引流管  
D.空肠造瘘管                      E.腹腔双套管

58.患者，男，31岁，胸部受伤，急诊入院。经吸氧，呼吸困难无好转，有发绀及休克体征。体检：左胸饱满，气管向右移位，左侧可触及骨擦音，叩之鼓音，听诊呼吸音消失，皮下气肿明显。诊断首先考虑是

- A.肋骨多发骨折                      B.胸骨骨折合并开放性气胸  
C.肋骨骨折合并张力性气胸                      D.心脏挫伤  
E.闭合性气胸

59.患者，男，临床诊断为肝性脑病昏迷前期。下列对于该患者不宜食用的食物是

- A.肉末蛋羹，拌菠菜                      B.豆腐脑，什锦菜                      C.果汁，蛋糕  
D.炒米饭，蘑菇汤                      E.稀粥，烧饼

60.新生儿，女，胎龄35周，生后第1天，基本情况尚可。其母尚无乳汁分泌。为预防新生儿低血糖，护理措施是

- A.可试喂米汤  
B.及时喂葡萄糖水  
C.应果断进行人工喂养  
D.配合进行静脉输注葡萄糖液

- E.等待母亲乳汁开始分泌再喂奶，坚持母乳喂养
- 61.呼吸衰竭的患者，在临床上出现最早的症状是  
 A.胸部疼痛                      B.呼吸困难                      C.咯血  
 D.发绀                              E.精神错乱
- 62.患儿，男，2岁。患猩红热入院治疗。现患儿处于脱屑期，躯干呈糠皮样脱屑，手足为大片状脱皮。针对患儿该阶段的皮肤护理指导，错误的是  
 A.观察脱皮进展情况                      B.勤换衣服，勤晒衣被  
 C.用温水清洗皮肤，以免感染                      D.脱皮大时可用手轻轻撕掉  
 E.剪短患儿指甲避免抓破皮肤
- 63.患者，男，20岁，铁钉扎伤1周后，出现张口受限、苦笑面容、角弓反张.抽搐频繁，护理措施不正确的是  
 A.注射破伤风抗毒素                      B.保持病室安静避光                      C.病情严重时少食多餐  
 D.密切观察病情                      E.做好消毒隔离
- 64.患者，女，35岁，双手深II度烧伤康复期。护士指导其双手平时正确的放置位置是  
 A.握拳位                              B.半握拳位                      C.伸直位  
 D.半伸直位                              E.双手互握
- 65.患者，男，60岁，肺癌晚期，表现为极度消瘦，卧床，生活无法自理，由鼻饲管喂食，静脉营养，患者可能出现的下列问题中，发生可能性最大的是  
 A.口腔感染                              B.肺部感染                              C.压疮  
 D.静脉炎                              E.双下肢血栓
- 66.某女妊娠合并糖尿病，孕期无其他并发症。于妊娠39周剖宫产一健康男婴，对于该新生儿重点监测的内容是  
 A.大小便                              B.体重                              C.黄疸  
 D.血糖                              E.体温
- 67.患者，男，25岁，肋骨骨折后合并血气胸，急诊行胸腔闭式引流术。对胸腔闭式引流护理，错误的是  
 A.嘱患者勿折叠、扭曲、压迫管道                              B.嘱患者翻身时勿牵拉引流管  
 C.保持水封瓶长管没入水中6~8cm                              D.指导患者多做深呼吸运动  
 E.更换引流瓶时应双重夹闭引流管
- 68.患者，男，48岁，诊断为颅内肿瘤入院。患者有颅内压增高症状。护士给予此病人床头抬高15~30°，其主要目的是  
 A.有利于改善心脏功能                      B.有利于改善呼吸功能  
 C.有利于颅内静脉回流                      D.有利于鼻饲  
 E.阻止呕吐物误入呼吸道
- 69.休克型肺炎的患者应用抗生素和补液治疗。提示患者病情好转、血容量已补足的体征不包括  
 A.口唇红润                              B.肢端温暖                              C.尿量>30ml/h  
 D.收缩压>90mmHg                              E.心率120次/分

- 70.患者，男，58岁，糖尿病病史30余年。目前使用胰岛素治疗，但血糖未规律检测。近3个月出现眼睑及下肢浮肿来诊。尿常规检查：尿糖(++)，WBC 0~4/HP，尿蛋白(+++)。应优先考虑的是
- A.胰岛素性水肿      B.肾动脉硬化      C.肾盂肾炎  
D.急性肾炎      E.糖尿病肾病
- 71.患儿，男，2岁，因上呼吸道感染出现咳嗽、发热入院。现体温39.3℃，半小时前突发抽搐，持续约1min后停止，呈嗜睡状，为避免再发抽搐，护理的重点是
- A.多晒太阳      B.按时预防接种      C.加强体格锻炼  
D.居室定期食醋熏蒸      E.体温过高时应及时降温
- 72.患儿，男，6个月，因间断发热、咳嗽半个月，拟诊“支气管炎”，给予口服“头孢拉定”治疗，近2d发现口腔有白色点片状乳凝乳块样物，不易拭去。护士在为患儿进行口腔护理时，宜选择的溶液是
- A.来苏水      B.生理盐水      C.0.1%利凡诺  
D.2%碳酸氢钠      E.3%过氧化氢
- 73.不属于COPD患者长期家庭氧疗有效指标的是
- A.呼吸困难减轻      B.呼吸频率增快      C.发绀减轻  
D.心率减慢      E.活动耐力增加
- 74.支气管扩张患者最基本的护理措施是
- A.促进排痰      B.预防感染      C.保持口腔卫生  
D.加强营养      E.增强体质
- 75.发作性呼气性呼吸困难常见于
- A.支气管异物      B.支气管癌      C.支气管哮喘  
D.肺不张      E.胸膜粘连
- 76.慢性支气管炎合并肺气肿时主要的临床表现是
- A.突然发作呼吸困难      B.进行性呼吸困难      C.心悸  
D.咳粉红色痰      E.咯血
- 77.咳铁锈色痰常见于
- A.革兰阴性杆菌肺炎      B.肺炎支原体肺炎      C.军团菌肺炎  
D.肺炎球菌肺炎      E.肺真菌病
- 78.提示有严重呼吸困难的重症哮喘患者病情严重的体征是
- A.颈静脉怒张      B.叩诊过清音      C.发绀  
D.听诊哮鸣音减弱或消失      E.奇脉
- 79.关于保护具的应用，错误的是
- A.严格掌握应用指征，做好解释  
B.长期使用制动性保护具，应每2小时松解一次  
C.注意患者肢体处于功能位置  
D.使用约束带时，局部需加衬垫，松紧适宜  
E.每15~30分钟观察局部皮肤情况并做好记录

- 80.患者，男，左上肢骨折被固定，应指导其患肢进行的早期运动是  
 A.关节运动范围练习      B.肌肉等张练习      C.肌肉动力练习  
 D.肌肉等长练习      E.绝对卧床休息
- 81.患者，女，55岁，因发作性胸闷、咳嗽就诊，诊为支气管哮喘。医嘱予糖皮质激素吸入治疗，下列用药指导中正确的是  
 A.“吸入激素的主要作用是快速缓解症状。”  
 B.“如果哮喘症状缓解，即可停止用药。”  
 C.“吸入激素不会有任何副作用。”  
 D.“吸入激素后要漱口。”  
 E.“如果您要进行运动，可在此前预防性吸入激素。”
- 82.患者，男性，73岁，COPD 15年，肺心病5年，体质虚弱。近日来因上感，大量脓痰不易咳出，神志恍惚，昏睡入院。护士为其清理呼吸道时，最适宜的措施是  
 A.指导有效咳嗽      B.胸部叩击震颤      C.湿化呼吸道  
 D.体位引流      E.机械吸痰
- 83.区别心源性、肺源性呼吸困难主要观察  
 A.是否有端坐位呼吸      B.是否为劳力性呼吸困难  
 C.是否有发绀和杵状指      D.是否有呼吸急促和“三凹征”  
 E.是否易在夜间发作
- 84.最易诱发心绞痛的瓣膜病是  
 A.主动脉瓣关闭不全      B.主动脉瓣狭窄      C.二尖瓣关闭不全  
 D.二尖瓣狭窄      E.肺动脉瓣狭窄
- 85.风湿性心瓣膜病二尖瓣狭窄最常见的心律失常是  
 A.期前收缩      B.房室传导阻滞      C.窦性心动过速  
 D.心房颤动      E.室上性心动过速
- 86.护理心律失常患者时最应注意的问题是  
 A.患者对疾病的认识      B.心输出量减少      C.药物反应  
 D.心理问题      E.对特殊检查有疑虑
- 87.不属于心力衰竭诱发因素的是  
 A.呼吸道感染      B.输液过多过快      C.情绪激动  
 D.摄入钠盐过多      E.重度二尖瓣狭窄
- 88.某心绞痛患者，在搬东西时突然感到心前区闷痛，立即含服硝酸甘油0.6mg，2min后出现头晕、心悸，应马上采取  
 A.吸氧      B.患者平卧      C.肌注哌替啶  
 D.站立不动      E.含硝酸甘油0.3mg
- 89.消化性溃疡患者饮食宜少量多餐的机制主要是  
 A.使胃酸分泌有规律      B.中和胃酸      C.减轻疼痛  
 D.减少并发症      E.以免胃窦部过度扩张而刺激胃酸分泌
- 90.肝硬化门静脉高压症患者最突出的临床表现为

- A.消化道症状                      B.出血倾向                      C.脾功能亢进  
D.腹水                                  E.电解质紊乱
- 91.大量排钾利尿诱发肝性脑病的主要机制是  
A.血容量减少                      B.肾功能减退                      C.低钾性碱中毒  
D.肝功能减退                      E.机体蛋白分解增加
- 92.具有抗幽门螺杆菌作用的药物是  
A.硫糖铝                              B.NSAID                              C.氢氧化铝  
D.西咪替丁                          E.枸橼酸铋钾
- 93.肝功能失代偿期的肝硬化患者，其血清检查结果为  
A.白蛋白增高、球蛋白增高                      B.白蛋白增高，球蛋白降低  
C.白蛋白降低、球蛋白增高                      D.白蛋白降低，球蛋白降低  
E.白蛋白正常、球蛋白增高
- 94.不属于消化性溃疡临床特点的是  
A.慢性过程                          B.周期性发作                      C.常因胃底静脉曲张合并上消化道出血  
D.具有一定节律性疼痛                      E.多发生于秋冬和冬春之交
- 95.膀胱高度膨胀又极度虚弱的患者导尿后第一次放尿不应超过  
A.300ml                                  B.500ml                                  C.600ml  
D.800ml                                  E.1000ml
- 96.患者，男，40岁，行血栓闭塞性脉管炎术后，为了解反映肢体远端血运情况，护士应观察的体征不包括  
A.双侧足背动脉搏动                      B.皮肤温度                          C.皮肤颜色  
D.皮肤出血                              E.皮肤感受
- 97.患者，女，50岁，肝硬化10余年伴大量腹水，近日出现意识障碍，血氨增高，肝肾功能减退，下列治疗措施不妥的是  
A.大量放腹水                          B.精氨酸静脉滴注                      C.口服乳果糖，降低肠道pH  
D.静脉注射支链氨基酸                      E.忌用对肝、肾功能有损害的药物
- 98.患者，42岁，因突发大咯血入院，否认有慢性咳嗽咳痰病史，检查显示为“右上肺支气管扩张”，在病史询问中需着重了解是否有  
A.吸烟史                                  B.肺结核病史                          C.支气管肺炎病史  
D.吃生鱼片嗜好                          E.肺脓肿病史
- 99.肾病综合征患者的尿液特点为  
A.糖尿                                      B.血尿                                      C.管形尿  
D.蛋白尿                                  E.脓尿
- 100.尿毒症患者最常见的心血管表现是  
A.心律失常                              B.心力衰竭                              C.尿毒症性心肌炎  
D.高血压                                  E.尿毒症性心包炎
- 101.尿毒症患者必有的临床表现是  
A.皮肤瘙痒                              B.代谢性酸中毒                          C.胃肠道症状

- D.精神、神经症状      E.贫血
- 102.服后应及时漱口的药物是
- A.磺胺药物      B.止咳糖浆      C.酸剂、铁剂  
D.利尿剂      E.抗生素
- 103.卢某,男,因冠心病入院,目前该患者存在以下健康问题,作为主管护士你应帮助其优先解决的问题
- A.舒适改变:心前区疼痛      B.营养失调:低于身体需要量  
C.活动无耐力      D.气体交换受损  
E.知识缺乏
- 104.患者,女,28岁,因严重贫血入院,医嘱为高蛋白饮食,该患者饮食中蛋白质的总量每天不超过
- A.40g      B.90g      C.120g  
D.150g      E.200g
- 105.口服铁剂护理欠妥的是
- A.开始量宜小      B.饭后服      C.服铁剂忌浓茶  
D.可与牛奶同服      E.同时服用维生素C
- 106.特发性血小板减少性紫癜患者饮食护理不正确的是
- A.流质、半流质食物      B.高维生素食物      C.高热量食物  
D.高蛋白食物      E.高纤维粗糙食物
- 107.患者,女,73岁,诊断为II型呼吸衰竭,如果给予高浓度吸氧有可能引起
- A.恶心、呕吐      B.烦躁不安      C.进行性呼吸困难  
D.二氧化碳麻痹      E.面色苍白
- 108.女性,43岁。肺叶切除术后第二天,为预防呼吸道感染,护士采取的护理方法哪一项最佳
- A.超声波雾化吸入疗法      B.压缩雾化吸入疗法      C.蒸气吸入疗法  
D.氧气雾化吸入疗法      E.手压式雾化器雾化吸入疗法
- 109.患者,女,35岁,白血病患者。活动后突然头痛、呕吐、视力模糊、意识不清。护理措施不妥的是
- A.绝对卧床      B.头部置冰帽      C.头略低保证脑供血  
D.吸氧      E.迅速建立静脉通道
- 110.Graves病患者甲状腺肿大的特征性表现是
- A.弥漫性      B.对称性      C.无压痛  
D.质地软      E.上极可触及震颤
- 111.肺结核患者在进行抗结核治疗期间,出现关节疼痛,应询问其是否使用了
- A.异烟肼      B.利福平      C.链霉素  
D.吡嗪酰胺      E.乙胺丁醇
- 112.李某,女,30岁,因疲乏无力、多汗怕热,爱发脾气,体重减轻,诊断为甲状腺功能亢进。护士为其进行饮食指导时,应告诉患者避免食用

- A.高热量、高蛋白饮食 B.含碘丰富的食物 C.低纤维素食物  
D.富含钾、钙的食物 E.豆腐、豆浆等豆制品
- 113.目前认为，慢性阻塞性肺疾病患者在进行家庭氧疗时，每日持续吸氧时间至少为  
A.18h B.15h C.12h  
D.10h E.8h
- 114.患者，男，45岁，因车祸致伤急诊入院。初步检查拟诊骨盆骨折合并腹腔内脏损伤，有休克征象。护士应首先给予  
A.建立静脉通道 B.准备骨盆兜，行悬吊牵引  
C.准备腹腔手术止血 D.准备髋部石膏固定 E.准备骨牵引器材
- 115.下列脑血管疾病的危险因素中，无法干预的是  
A.高血压 B.心脏病 C.糖尿病  
D.年龄 E.短暂性缺血发作
- 116.协助诊断急性脑血管病的首要检查项目是  
A.血、尿、便常规 B.头颅CT或MRI C.心电图检查  
D.脑脊液检查 E.病理反射
- 117.沈某，男，45岁，晨起发现自己左侧半身瘫痪，眼球震颤，共济失调，吞咽困难。该患者最可能的诊断是  
A.脑血栓形成 B.小脑出血 C.蛛网膜下腔出血  
D.脑桥出血 E.脑血管痉挛
- 118.急腹症病人阵发性腹痛常见于  
A.阑尾炎 B.溃疡病穿孔 C.肝破裂内出血  
D.机械性肠梗阻 E.肠绞窄
- 119.若某成人潮气量为500ml，呼吸频率以20次/min计算，则其每分钟肺泡通气量约为  
A.10000ml B.9000ml C.8000ml  
D.7000ml E.6000ml
- 120.有助于中毒性菌痢和流行性乙型脑炎鉴别的评估资料是  
A.高热 B.意识障碍 C.循环衰竭  
D.血液白细胞总数增高 E.反复惊厥

**二、多项选择题（每题2分，共60分。每一考题下面有A、B、C、D、E五个备选答案，请从中选择两个或两个以上的最佳答案，多选、漏选、错选不给分）。**

- 1.鼓励患者早期下床活动的术后患者是  
A.粘连性肠梗阻手术后 B.下肢植皮术后 C.门脉高压症分流术后  
D.传统的腹外疝修补术后 E.阑尾切除术后
- 2.绞窄性肠梗阻的表现是  
A.阵发性绞痛 B.腹胀不对称 C.腹膜刺激症  
D.呕吐粪性液 E.有休克表现
- 3.格拉斯哥昏迷计分法（GCS）的计分依据是

- A. 睁眼反应                      B. 语言反应                      C. 瞳孔变化  
D. 运动反应                      E. 生命体征
4. 休克代偿期的症状是  
A. 尿量减少                      B. 皮肤黏膜紫绀                      C. 收缩压正常或偏高  
D. 意识模糊                      E. 烦躁不安
5. 有纵隔左右扑动的胸部损伤是  
A. 开放性气胸                      B. 闭合性气胸                      C. 张力性气胸  
D. 损伤性血胸                      E. 多根多处肋骨骨折
6. 瘢痕性幽门梗阻患者术前的特殊准备是  
A. 备皮、备血                      B. 术前 3d 每晚洗胃                      C. 药物过敏试验  
D. 纠正代谢性碱中毒                      E. 禁食 12h, 禁饮水 4h
7. 检查前需行常规肠道准备的泌尿系检查是  
A. 膀胱镜检查                      B. X 线平片                      C. 静脉肾盂造影  
D. 逆行肾盂造影                      E. 肾 B 超
8. 泌尿系结石患者的非手术治疗护理措施, 正确的是  
A. 卧床休息                      B. 多饮水                      C. 注意饮食调节  
D. 适当运动                      E. 调节尿 pH
9. 肩关节脱位的表现是  
A. 爪形手                      B. 杜加氏征 (+)                      C. “方肩”畸形  
D. 肘关节半屈曲位                      E. 功能障碍
10. 对于长期卧床患者, 正确预防压疮的措施是  
A. 避免局部皮肤长期受压                      B. 保持皮肤清洁                      C. 促进皮肤血液循环  
D. 改善机体营养状况                      E. 每 4h 翻身一次
11. 以下情况中, 不宜行大量不保留灌肠的患者是  
A. 急腹症                      B. 肠道手术前准备                      C. 消化道出血  
D. 便秘                      E. 肝昏迷
12. 下列需执行保护性隔离的是  
A. 白血病                      B. 大面积烧伤                      C. 艾滋病  
D. 脏器移植                      E. 早产儿
13. 宜采用半坐卧位的患者有  
A. 心衰                      B. 休克                      C. 腹膜炎  
D. 腹部手术后                      E. 甲状腺手术后
14. 煮沸消毒灭菌时, 正确的操作是  
A. 物品完全浸没在水中                      B. 大小相同的盆应重叠                      C. 有轴节的器械宜夹闭  
D. 玻璃类用纱布包好                      E. 橡胶类待水沸后放入
15. 患者的权利包括  
A. 知情和同意的权利                      B. 隐私保密的权利                      C. 享受最高医疗待遇的权利  
D. 自由选择的权利                      E. 交纳医疗费用

16. 下列属于非语言沟通方式的是  
 A. 目光                      B. 电报                      C. 表情  
 D. 手势                      E. 报纸
17. 使用吸引器吸痰时，操作者应注意  
 A. 吸痰管要每日更换  
 B. 吸痰时宜反复上下提插以保证吸净  
 C. 为小儿吸痰时负压要小于 300mmHg  
 D. 每次吸引时间不应超过 1min  
 E. 如气管切开处和口腔均需吸痰时，应先吸气管切开处，再吸口腔
18. 抢救设备应严格执行“五定”制度，以下属于“五定”内容的是  
 A. 定数量品种              B. 定点安置              C. 定人保管  
 D. 定期更换              E. 定期消毒灭菌
19. 导致慢性肺源性心脏病的肺疾病有  
 A. COPD                      B. 支气管哮喘              C. 肺炎球菌肺炎  
 D. 支气管扩张              E. 重症肺结核
20. 结核菌素试验结果虽然阴性，但不可以排除结核病的情况有  
 A. 儿童                      B. 严重营养不良              C. 重症肺结核  
 D. HIV 感染              E. 癌症
21. 冠心病的危险因素包括  
 A. 糖尿病                      B. 免疫功能低下              C. 肥胖  
 D. 高脂血症              E. 老年人
22. 洋地黄类药物用药前需  
 A. 加用钙剂                      B. 询问有无恶心、呕吐      C. 测量体温  
 D. 注意心率、心律              E. 观察呼吸节律
23. 肝性脑病的诱发因素有  
 A. 上消化道出血              B. 应用镇静药              C. 感染  
 D. 高蛋白饮食              E. 腹痛
24. 提示上消化道出血或再出血的表现为  
 A. 黑便次数增多              B. 网织红细胞计数下降      C. 肠鸣音亢进  
 D. 血尿素氮持续升高              E. 补液后血压仍不稳定
25. 慢性肾炎患者的合理饮食包括  
 A. 保证足够热量              B. 尽早采用优质低蛋白饮食      C. 低磷饮食  
 D. 有水肿、高血压者限制水、钠摄入              E. 低钙饮食
26. 预防再生障碍性贫血患者出血的措施有  
 A. 床单平整、被褥轻软      B. 不用牙签剔牙              C. 严格限制活动  
 D. 避免肢体受压              E. 注射拔针后用干棉球压迫
27. 甲状腺危象主要表现为  
 A. 体温高于 39℃              B. 心率 100~120 次/分      C. 心房颤动

