

历年真题试卷（一）

一、单项选择题（每一考题下面有 A、B、C、D、E 五个备选答案，请从中选择一个最佳答案，每题 1.5 分，共 180 分）。

1. 以下哪项不属于护理学的任务

- A. 恢复健康
- B. 预防疾病
- C. 减轻痛苦
- D. 降低伤残
- E. 促进健康

2. 系统论最基本的原则是

- A. 优化原则
- B. 整体性原则
- C. 模型化原则
- D. 简化原则
- E. 层次性原则

3. 患者，女，36 岁，患乳腺癌广泛转移，病情日趋恶化，患者常独自一人坐在床上哭泣，不愿与医护人员、家属等交谈，你认为该临终患者的心理反应处于哪一阶段

- A. 否认期
- B. 协议期
- C. 忧郁期
- D. 转变期
- E. 接受期

4. “久闻不知其臭”是说明人类的哪一层次适应

- A. 心理层次
- B. 生理层次
- C. 生物层次
- D. 社会文化层次
- E. 以上都不是

5. 对人体健康影响最为深远又最能被控制的因素是

- A. 自然环境因素
- B. 健康服务系统
- C. 生物遗传因素
- D. 生活方式
- E. 社会环境因素

6. 护士小施接待一位新入院的患者，在与患者的初步接触过程中进行了 5min 的简短评估，患者将其患病的经过进行了大致的描述。此时护士小施与患者之间的沟通层次属于

- A. 一般性交谈
- B. 陈述事实
- C. 交流意见
- D. 交流感情
- E. 沟通高峰

7. 下列有关护理工作中的法律问题处理正确的是

- A. 当护士发现医嘱有明显的问题时，可拒绝执行，但无权向医生提出质疑
- B. 当护士发现医嘱有问题仍执行时，由此造成的后果主要由医生承担
- C. 护士如果利用工作之便盗卖吗啡等麻醉药品则不属犯法但需受行政处分
- D. 护士在抢救患者时可以执行口头医嘱
- E. 护士在执业护士的督导下，发生差错事故，由本人和带教护士共同承担法律责任

8. 下列最符合目标陈述要求的是

- A. 每 30min 测血压一次
- B. 2 周后患者能拄着拐杖行走 50 米
- C. 1 周后患者自理能力增强
- D. 出院前教会患者注射胰岛素
- E. 雾化吸入每天 2 次

9. 良好的医院物理环境要求

- A. 温度 18~22℃，湿度 50%~60%，噪声强度 45~55dB
- B. 温度 22~24℃，湿度 50%~60%，噪声强度 45~55dB
- C. 温度 18~22℃，湿度 40%~50%，噪声强度 45~55dB

- D.温度 22~24℃, 湿度 40%~50%, 噪声强度 35~45dB
E.温度 18~22℃, 湿度 50%~60%, 噪声强度 35~40dB
- 10.用平车搬运腰椎骨折患者, 下列措施不妥的是
A.在平车上垫木板 B.宜用四人搬运法 C.上坡时头在前
D.宜用两人搬运法 E.用门板抬送
- 11.关于隔离原则, 以下正确的是
A.帽子、口罩及隔离衣穿戴齐全的工作人员可在任何场所活动
B.患者用过的物品应分为已被污染和未被污染两类
C.护理人员穿隔离衣后必须尽快备齐用物
D.已经落在地上的物品均视为污染物品
E.传染源离开后所进行的消毒属随时消毒
- 12.一位新入院的慢性支气管炎、肺气肿患者, 呼吸困难, 紫绀明显, 消瘦, 烟瘾大, 责任护士首先要解决
A.热情接待, 做好入院介绍 B.吸氧
C.全面收集资料 D.进行戒烟的健康教育
E.书写护理计划
- 13.患者由于疾病对自我能力表示怀疑, 产生退缩或依赖心理, 称为
A.角色行为消退 B.角色行为缺如 C.角色行为冲突
D.角色行为减弱 E.角色行为强化
- 14.为昏迷患者进行口腔护理时, 以下操作不妥的是
A.先取下假牙 B.用开口器从白齿处放入, 协助开口
C.观察口腔情况后漱口 D.棉球干湿适宜
E.操作前后清点棉球数
- 15.在鼻饲插管过程中患者出现呛咳、紫绀, 应采取的措施是
A.嘱患者深呼吸 B.嘱患者做吞咽动作 C.托起患者的头部插管
D.用注射器抽吸胃液 E.拔出胃管休息片刻后再插管
- 16.鼻导管给氧, 氧流量 3L/min 时, 氧浓度为
A.29% B.33% C.35%
D.37% E.41%
- 17.股静脉注射时, 下列哪项是错误的
A.术者洗手后左手食指、中指应常规消毒 B.患者仰卧, 下肢伸直
C.穿刺部位在股动脉外侧 0.5cm 处 D.进针时针头与皮肤呈直角或 45° 角
E.误入动脉时可观察到鲜红色血液
- 18.禁用碳酸氢钠洗胃的中毒患者是
A.敌敌畏中毒 B.1059 中毒 C.敌百虫中毒
D.1605 中毒 E.乐果中毒
- 19.服后应及时漱口的药物是
A.磺胺类药物 B.止咳糖浆 C.酸剂、铁剂

- D.利尿剂 E.抗生素
- 20.膀胱高度膨胀又极度虚弱的患者导尿后第一次放尿不应超过
- A.300ml B.500ml C.600ml
- D.800ml E.1000ml
- 21.2岁以下的婴儿肌肉注射时,最好选用
- A.臀大肌 B.上臂三角肌 C.臀中肌、臀小肌
- D.股外侧肌 E.前臂外侧肌
- 22.输液器的点滴系数为15,500ml的溶液需要维持5h输注,每分钟的滴速应调至
- A.15滴/分 B.20滴/分 C.25滴/分
- D.30滴/分 E.40滴/分
- 23.最常见的输血反应是
- A.发热反应 B.过敏反应 C.溶血反应
- D.空气栓塞 E.出血倾向
- 24.以下会导致血压测量结果偏低的情况是
- A.袖带太窄 B.被测手臂高于心脏位置 C.袖带过松
- D.放气太慢 E.袖带不平整
- 25.关于需要层次论的叙述,不妥的是
- A.需要从低到高有一定层次性,但不是绝对固定的
- B.文化背景不同,但满足每一种需要的方式相同
- C.需要的满足过程是逐级上升的
- D.各层次需要互相依赖,彼此重叠
- E.人的行为是由优势需要决定的
- 26.下列不符合生长与发展规律的是
- A.身体发展沿着从头至脚方向进行
- B.个体都要经过相同的生长发展阶段
- C.技能发展沿着从一般到特殊,从简单到复杂的顺序进行
- D.技能发展从身体远端向身体中心方向进行
- E.个体发展具有非等速、非直线的特征
- 27.艾里克森认为,婴儿期主要的心理社会性发展问题是
- A.自主对羞怯或怀疑 B.主动对内疚 C.信任对不信任
- D.亲密对孤独 E.勤奋对自卑
- 28.属于开放性的提问是
- A.住院使你感到烦恼吗? B.当你知道病情时有什么想法?
- C.你的家庭成员中有糖尿病史吗? D.你现在感觉好些了吗?
- E.你喜欢喝酒吗?
- 29.适应模式的提出者是
- A.罗杰斯 B.韩德森 C.奥瑞姆
- D.纽曼 E.罗伊

- 30.在我国卫生部提出的医院分级管理方案中，医院被分成
- A.三级六等 B.三级七等 C.三级八等
D.三级九等 E.三级十等
- 31.全补偿护理系统适用于
- A.昏迷患者 B.慢性阻塞性肺气肿患者 C.高血压患者
D.扁桃体切除术后 E.糖尿病患者
- 32.进行大便隐血试验的患者在试验期宜进食
- A.萝卜 B.肉类 C.绿色蔬菜
D.禽类 E.铁剂
- 33.病区交班报告记录的顺序，首先是
- A.危重患者 B.手术患者 C.死亡患者
D.新入院患者 E.离开病区的患者
- 34.在健康教育过程中，对护理对象健康行为发生起最重要作用的因素是
- A.健康教育发生的时间 B.提供健康教育的方式
C.健康教育内容的实用性 D.护士与护理对象的关系
E.接受健康教育者的状态
- 35.下列不属于护理评判性思维的构成要素的是
- A.知识基础 B.临床经验 C.态度
D.认知技能 E.制定决策
- 36.护理诊断的陈述包括的三个要素是
- A.问题、症状体征，原因 B.诊断、主诉、现病史
C.症状或体征、相关因素 D.名称，相关因素，症状体征
E.症状、体征、问题
- 37.慢性呼吸衰竭的患者应用呼吸兴奋剂的先决条件是
- A.换气功能良好 B.气道通畅 C.紫绀不明显
D.无肝肾功能不全 E.呼吸不规则，但无惊厥
- 38.慢性阻塞性肺气肿最突出的症状是
- A.长期反复咳嗽 B.反复咳脓性痰 C.间歇少量咯血
D.逐渐加重的呼吸困难 E.活动后喘息
- 39.慢性支气管炎痰液性状一般为
- A.痰中带血 B.黏稠脓痰 C.铁锈色痰
D.黏液或泡沫样痰 E.粉红色泡沫样痰
- 40.对咳嗽、咳痰患者，护理措施错误的是
- A.保持室内空气新鲜，温、湿度适宜 B.咳脓痰者注意口腔护理
C.痰多可在饭后行体位引流 D.痰稠不易咳出者，鼓励多饮水
E.痰多且无力咳出者，帮助翻身拍背
- 41.肺心病失代偿期的治疗措施中，最主要的是
- A.控制感染，改善通气功能 B.应用利尿剂 C.应用强心剂

- D.应用脱水剂
E.糖皮质激素的应用
- 42.肺炎球菌性肺炎病治疗首选的抗生素为
A.庆大霉素
B.青霉素 G
C.红霉素
D.四环素
E.链霉素
- 43.呼吸衰竭最早出现的临床表现为
A.黄疸
B.精神错乱
C.呼吸困难
D.下肢水肿
E.消化道出血
- 44.控制哮喘急性发作症状时首选
A.沙丁胺醇
B.氨茶碱
C.喘定
D.泼尼松
E.色甘酸钠
- 45.患者，男，40岁，发热、咳嗽、胸痛伴意识模糊半天。体格检查发现患者面色苍白，血压为70/40mmHg，脉搏为120次/min。实验室检查：白细胞计数为 $16 \times 10^9/L$ ，中性分类为85%。X线胸片：右上肺有大片密度均匀阴影，该患者的诊断首先应考虑为
A.结核性胸膜炎
B.支气管扩张合并感染
C.支原体肺炎
D.休克性肺炎
E.肺脓肿
- 46.某肺结核患者，突然出现喷射性大咯血，继而咯血突然中断，表情恐怖，大汗淋漓，此时首要的护理措施是
A.取半卧位
B.加压给氧
C.建立静脉通道
D.人工呼吸
E.清除呼吸道血块
- 47.房颤患者主要应观察
A.P波的频率
B.P波的形态
C.血压的变化
D.心室率的改变
E.脉搏的改变
- 48.慢性风湿性心脏病最常见的瓣膜病变为
A.二尖瓣狭窄合并关闭不全
B.二尖瓣合并主动脉瓣
C.单纯主动脉瓣
D.主动脉瓣合并肺动脉瓣
E.肺动脉瓣合并三尖瓣
- 49.患者，男，56岁。突然心悸，气促，咯粉红色泡沫痰，血压180/90mmHg，心率136次/分，首先应给予的抢救药物是
A.西地兰、硝酸甘油、异丙肾上腺素
B.硝普钠、西地兰，呋塞米
C.毒毛花苷K、硝普钠、普萘洛尔
D.胍乙啶，酚妥拉明，西地兰
E.硝酸甘油、西地兰、多巴胺
- 50.对消化性溃疡有确诊价值的检查方法是
A.X线钡餐检查
B.胃镜检查与黏膜活检
C.幽门螺杆菌检查
D.胃液分析
E.粪便隐血试验
- 51.不属于消化性溃疡临床特点的是
A.慢性过程
B.周期性发作
C.常因胃底静脉曲张合并上消化道出血
D.具有一定节律性疼痛
E.多发生于秋冬和冬春之交

- 52.肝硬化患者最常见的并发症是
 A.上消化道出血 B.肝性脑病 C.原发性肝癌
 D.肝肾综合征 E.电解质紊乱
- 53.为清除肝硬化患者肠内积血，灌肠时首选的液体为
 A.温开水 B.生理盐水 C.稀醋溶液
 D.碳酸氢钠 E.肥皂水
- 54.引起肝性脑病最常见的病因是
 A.原发性肝癌 B.妊娠期急性脂肪肝 C.门体分流手术后
 D.肝炎后肝硬化 E.严重胆管感染
- 55.急性胰腺炎的主要症状是
 A.恶心 B.呕吐 C.腹痛
 D.发热 E.休克
- 56.急性胰腺炎患者禁食、胃肠减压的主要目的是
 A.防止感染蔓延 B.减少胃酸分泌 C.减少胰液分泌
 D.避免胃扩张 E.减轻腹痛
- 57.患者，男，50岁，肝硬化并发上消化道出血，在使用双气囊三腔管压迫止血期间，突然出现躁动、紫绀、呼吸困难，此时应立即
 A.报告医生 B.吸氧 C.应用呼吸兴奋剂
 D.应用镇静剂 E.放去气囊内气体
- 58.赵先生患消化性溃疡10余年，饮酒30min后出现剧烈上腹部疼痛，诊断为急性胃穿孔，首要护理措施为
 A.立即应用镇痛剂 B.立即输血 C.禁食和胃肠减压
 D.安慰并陪伴患者 E.立即补液
- 59.肾盂肾炎最常见的感染途径是
 A.血行感染 B.淋巴管感染 C.上行感染
 D.直接感染 E.腹腔感染
- 60.肾病综合征最常见的并发症是
 A.感染 B.血栓及栓塞 C.动脉粥样硬化
 D.肾功能不全 E.高血压
- 61.肾衰竭少尿期患者护理措施正确的是
 A.大量补液 B.摄入含钾食物 C.禁用库存血
 D.及时补充钾盐 E.高蛋白饮食
- 62.慢性肾衰竭后期患者，提示病情严重的表现是
 A.少尿，高血钾 B.中度贫血 C.乏力、食欲减退
 D.水肿、低钠血症 E.呼气有尿臭味
- 63.尿毒症最早出现的临床表现是
 A.抽搐 B.高钠血症 C.高钾或低钾血症
 D.高血压 E.食欲不振、恶心，呕吐

- 64.临床表现为高度水肿、低蛋白血症、高胆固醇血症、大量蛋白尿的患者，应首先考虑的疾病为
- A.慢性肾盂肾炎 B.慢性肾炎高血压型 C.急性肾盂肾炎
D.急性肾炎 E.肾病综合征
- 65.导致成年人缺铁最常见的原因是
- A.铁的摄入不足 B.铁的需要量增加 C.铁的吸收不良
D.铁不能被利用 E.慢性失血
- 66.特发性血小板减少性紫癜患者，首选的治疗措施是
- A.脾切除 B.输血小板 C.使用免疫抑制剂
D.血液透析 E.应用糖皮质激素
- 67.有关铁剂治疗缺铁性贫血的叙述，不正确的是
- A.血红蛋白恢复后继续服药 3~6 个月 B.网织红细胞数增加是治疗有效的指标
C.饭后服用 D.服药后可出现黑便
E.可防止缺铁性贫血的复发
- 68.不符合再生障碍性贫血临床特点的是
- A.进行性贫血 B.易发生感染 C.常见不同程度出血
D.外周血中可见幼红细胞 E.病情轻重与血细胞减少程度有关
- 69.某急性白血病患者，经治疗后在缓解期出现头痛、恶心、呕吐、视力障碍、瞳孔改变，最有可能是发生了
- A.颅内出血 B.脑血栓形成 C.中枢神经系统继发感染
D.中枢神经系统白血病 E.药物不良反应
- 70.下列不属于甲状腺功能亢进症临床表现的是
- A.易激动、失眠 B.怕热、多汗、乏力 C.多饮、多食、多尿
D.食欲亢进、腹泻 E.月经失调、闭经
- 71.2 型糖尿病的主要死亡原因是
- A.心血管并发症 B.糖尿病酮症酸中毒 C.呼吸道感染
D.泌尿道感染 E.肾衰竭
- 72.各型糖尿病最基本的治疗方法是
- A.注射胰岛素 B.口服降糖药 C.饮食疗法
D.卧床休息 E.纠正电解质紊乱
- 73.糖尿病患者餐前突然感到饥饿难忍、全身无力、心慌、出虚汗，继而神志恍惚，护士应立即采取的措施为
- A.静脉取血测血糖 B.协助患者饮糖水 C.进行血压监测
D.建立静脉通路 E.专人护理
- 74.患者肖某，女，49 岁，糖尿病酮症酸中毒，尿糖阳性。患者呼气有
- A.芳香味 B.氨臭味 C.大蒜味
D.烂苹果味 E.腐臭味
- 75.SLE 最常见的皮肤损害部位为

- A.面部 B.颈部 C.腿部
D.胸部 E.背部
- 76.类风湿关节炎缓解期患者的主要护理措施是
A.注意休息 B.密切观察药物副作用 C.关节功能锻炼
D.保持乐观情绪 E.控制感染
- 77.乙肝患者血清中检出抗-HBs (+), 说明
A.病情向慢性发展 B.已获得免疫力 C.仍有传染性, 需继续隔离
D.病毒在体内复制 E.血清中肯定同时存在 HBsAg (+)
- 78.护士被乙型肝炎患者血液污染的针头刺破皮肤后, 首先要采取的措施是
A.碘酒消毒 B.应用干扰素 C.立即注射乙肝疫苗
D.注射 HBIG E.注射丙种球蛋白
- 79.可使机体产生特异性主动免疫力的是
A.抗毒素 B.类毒素 C.丙种球蛋白
D.胎盘球蛋白 E.抗毒素血清
- 80.下列属于强制管理的传染病是
A.病毒性肝炎 B.细菌性痢疾 C.肺结核
D.狂犬病 E.霍乱
- 81.脑血管病患者病情观察最重要的是判断有无
A.呼吸衰竭 B.脑出血 C.脑疝
D.心力衰竭 E.脑梗死
- 82.患有高血压的老年患者情绪激动时易诱发
A.心力衰竭 B.脑出血 C.癫痫发作
D.脑梗死 E.蛛网膜下腔出血
- 83.脑出血患者头部抬高 15°~30°是为了减轻
A.呼吸困难 B.脑水肿 C.呕吐
D.头痛 E.脑缺氧
- 84.癫痫大发作最典型的临床表现是
A.牙关紧闭 B.口吐白沫 C.意识丧失
D.全身肌肉强直性收缩 E.大小便失禁
- 85.等渗性脱水患者输液, 首选的溶液是
A.5%葡萄糖液 B.5%葡萄糖氯化钠 C.平衡盐溶液
D.低分子右旋糖酐 E.5%碳酸氢钠
- 86.经鼻肠管进行肠内营养者容易发生的并发症是
A.血栓性静脉炎 B.泌尿系感染 C.吸入性肺炎
D.水、电解质紊乱 E.急性腹膜炎
- 87.休克早期的表现是
A.面色青紫 B.呼吸困难 C.脉压缩小
D.血压下降 E.意识不清

- 88.最常用的麻醉前用药是
- A.阿托品 B.氯丙嗪 C.哌替啶
D.苯巴比妥钠 E.山莨菪碱
- 89.器械护士的职责是
- A.术中观察病情 B.安置手术体位 C.整理无菌器械台
D.作好术前环境准备 E.向病房护士介绍术中情况
- 90.患者，男，36岁，因粘连性肠梗阻出现阵发性腹痛、腹胀、呕吐、肛门停止排气。在非手术治疗护理中，减轻肠道内压力，改善肠壁血液循环的措施是
- A.半卧位、观察病情 B.禁食、胃肠减压 C.应用阿托品解痉止痛
D.保证输液通畅 E.遵医嘱使用抗生素
- 91.患者，男，31岁，因车祸致头部受伤，无昏迷史，诉头痛，右耳道内有少量淡血性液体流出，生命体征正常。正确的护理是
- A.左侧卧位 B.床头抬高 15~30cm
C.定时冲洗耳道 D.无菌棉球堵塞外耳道
E.耳道内滴抗生素溶液
- 92.前列腺摘除术后预防出血的最主要措施是
- A.间断或持续膀胱冲洗 B.做好气囊导尿管的护理
C.耻骨上膀胱造瘘两周 D.一周内禁止肛管排气
E.按时使用止血药物
- 93.患者，女，32岁，因车祸发生脾破裂、开放性气胸、闭合性胫腓骨骨折等危急病情，抢救时首先应
- A.输血、输液 B.固定骨折肢体 C.镇静、止痛
D.封闭胸壁伤口 E.应用抗生素
- 94.下肢骨牵引的护理，错误的是
- A.抬高床头 30cm B.牵引重量不能触地 C.定时测量肢体长度
D.观察患肢的血液循环 E.保护牵引针孔处血痂
- 95.患者，男，42岁，因十二指肠溃疡急性穿孔，在硬膜外麻醉下行毕Ⅱ式胃大部切除术。术后第7天，患者进食后 15min，出现腹胀肠鸣、恶心呕吐，心慌、大汗和头晕，首先考虑的并发症是
- A.胃出血 B.输出段梗阻 C.输入段梗阻
D.倾倒综合征 E.十二指肠残端破裂
- 96.外伤性肠穿孔行肠修补术后第5天，患者体温升高，排便次数增多并伴里急后重感，首先考虑的并发症是
- A.切口感染 B.盆腔脓肿 C.肠间脓肿
D.肺部感染 E.膈下脓肿
- 97.急性阑尾炎最重要的体征是
- A.结肠充气试验阳性 B.腰大肌试验阳性 C.右下腹固定压痛
D.直肠指检有触痛 E.闭孔内肌试验阳性

- 98.胃穿孔时腹腔穿刺抽出液的性质是
 A.稀脓性有臭味 B.黄色、浑浊无臭味 C.不凝固血液
 D.血性脓液有臭味 E.血性渗出液
- 99.肝癌高危人群的普查方法是
 A.甲胎蛋白检测和 B 超 B.放射性核素肝扫描
 C.肝穿刺针刺细胞学检查 D.选择性肝动脉造影
 E.CT 检查
- 100.诊断结肠癌最有效最可靠的检查方法是
 A.B 型超声波 B.纤维结肠镜 C.直肠指检
 D.大便潜血检查 E.X 线钡剂灌肠造影
- 101.急性胰腺炎最常见的病因是
 A.酒精中毒 B.暴饮暴食 C.胆管疾病
 D.高脂血症 E.高钙血症
- 102.长期石膏外固定容易引起并发症是
 A.损伤性骨化 B.关节僵硬 C.创伤性关节炎
 D.骨筋膜室综合征 E.缺血性骨坏死
- 103.患者，女，32 岁，因车祸撞伤左上腹，出现腹痛、面色苍白、出冷汗、脉细速、血压下降，首先考虑
 A.胃穿孔 B.脾破裂 C.肝破裂
 D.肠穿孔 E.结肠穿孔
- 104.胃溃疡穿孔的腹痛性质是
 A.持续性胀痛 B.阵发性疼痛 C.持续性疼痛阵发性加剧
 D.“钻顶样”绞痛 E.持续性刀割样疼痛
- 105.患者，男，50 岁，因下肢患大隐静脉曲张，患者站立在大腿中部扎止血带，然后患者下蹲 15 次后，曲张静脉空虚萎陷，说明
 A.大隐静脉侧支循环良好 B.大隐静脉瓣膜功能不全
 C.小隐静脉瓣膜功能不全 D.交通支瓣膜功能不全
 E.下肢深静脉回流通畅
- 106.在损伤性气胸中，开放性气胸特有的病理生理变化是
 A.伤侧肺完全萎陷 B.健侧肺部分萎陷 C.纵隔摆动
 D.气体交换量下降 E.回心血量减少
- 107.有接触传染性的化脓性感染是
 A.疖 B.疔 C.丹毒
 D.脓肿 E.急性蜂窝织炎
- 108.浅表肉芽感染伤口，有较多坏死组织，湿敷溶液选用
 A.0.02%呋喃西林 B.攸琐溶液 C.0.1%洗必泰
 D.0.1%新洁尔灭 E.0.02%高锰酸钾
- 109.门-腔静脉分流术后 48h 内，最常见的并发症是

- A.切口感染 B.腹腔内出血 C.腹腔内感染
D.上消化道出血 E.肠系膜静脉血栓形成
- 110.常先生, 31岁, 甲状腺大部切除术后4h, 突然烦躁不安、呼吸困难, 颈部肿胀, 口唇发绀, 紧急处理首先应
- A.拆线, 敞开伤口 B.吸痰、吸氧 C.注射呼吸兴奋剂
D.请麻醉医师插管 E.气管切开
- 111.患者, 女, 35岁, 乳房周期性胀痛, 检查触及多个大小不等结节, 首先考虑
- A.乳癌 B.乳房纤维腺瘤 C.乳房囊性增生病
D.乳管内乳头状瘤 E.乳房脂肪瘤
- 112.患者, 男, 52岁, 右侧斜疝嵌顿5h, 有持续性腹痛, 伴呕吐。检查见全腹有压痛、肌紧张、疝块红肿、触痛明显、不能回纳。其病理类型属于
- A.易复性疝 B.难复性疝 C.滑动性疝
D.嵌顿性疝 E.绞窄性疝
- 113.患者, 女, 50岁, 因胆总管结石发生胆管炎, 出现右上腹部持续性腹痛, 伴阵发性加重1d, 体温39°C, 巩膜黄染, 病情观察中要特别注意
- A.体温、面色 B.腹部体征 C.血压, 神志
D.恶心呕吐 E.血、白细胞计数
- 114.患者, 女, 41岁, 因头部外伤不省人事, 约1h后渐苏醒, 后又再次昏迷。检查见左侧瞳孔散大, 对光反射迟钝。病情判断为
- A.急性帽状腱膜下血肿 B.慢性硬脑膜下血肿 C.急性脑内血肿
D.急性硬脑膜外血肿 E.颅骨骨膜下血肿
- 115.汪某, 27岁, 骑跨式受伤, 会阴部肿胀、瘀斑, 尿道口滴血, 尿意急迫, 但不能排出, 处理首选
- A.下腹部热敷、按摩 B.肌注氨甲酰胆碱 C.耻骨上膀胱造瘘
D.试插导尿管 E.耻骨上膀胱穿刺
- 116.患儿, 6岁, 在家玩耍不慎打翻开水瓶, 双下肢(包括臀部)被开水烫伤后皮肤出现大水疱, 疼痛明显, 水疱破裂创面鲜红色。该患儿的烧伤面积和烧伤深度为
- A.浅II度、40% B.深II度、40% C.浅II度、46%
D.深II度、46% E.浅II度、50%
- 117.肺癌行一侧全肺切除患者, 术后体位是
- A.平卧位 B.右侧卧位 C.左侧卧位
D.1/4侧卧位 E.患侧卧位
- 118.食管癌根治术后第4天, 拔除胃管后进流食。第5天体温39°C, 呼吸困难, 胸痛, X线透视见胸腔积液。首先考虑的并发症是
- A.肺炎 B.膈下脓肿 C.肺不张
D.食管吻合口瘘 E.支气管胸膜瘘
- 119.腰椎间盘突出症初次发作的患者, 首选的治疗和护理措施是
- A.局部封闭 B.绝对卧床休息 C.药物镇痛

D.骨盆牵引 E.功能锻炼

120.不能采用推拿疗法的颈椎病是

A.神经根型 B.椎动脉型 C.交感型
D.脊髓型 E.混合型

二、多项选择题（每一考题下面有 A、B、C、D、E 五个备选答案，请从中选择两个或两个以上的最佳答案，多选、漏选、错选均不得分，每题 2 分，共 60 分）。

1.为高热患者降温冰袋可放置在

A.前额、头顶 B.颈部、腋下 C.胸前区、腹部
D.腹股沟 E.足底

2.以下情况中，不宜行大量不保留灌肠的患者是

A.急腹症 B.肠道手术前准备 C.消化道出血
D.便秘 E.肝昏迷

3.下列需执行保护性隔离的是

A.白血病 B.大面积烧伤 C.艾滋病
D.脏器移植 E.早产儿

4.宜采用半坐卧位的患者有

A.心衰 B.休克 C.腹膜炎
D.腹部手术后 E.甲状腺手术后

5.煮沸消毒灭菌时，正确的操作是

A.物品完全浸没在水中 B.大小相同的盆应重叠
C.有轴节的器械宜夹闭 D.玻璃类用纱布包好
E.橡胶类待水沸后放入

6.患者的权利包括

A.知情和同意的权利 B.隐私保密的权利 C.享受最高医疗待遇的权利
D.自由选择的权利 E.交纳医疗费用

7.下列属于非语言沟通方式的是

A.目光 B.电报 C.表情
D.手势 E.报纸

8.使用吸引器吸痰时，操作者应注意

A.吸痰管要每日更换 B.吸痰时宜反复上下提拉以保证吸净
C.为小儿吸痰时负压要小于 300mmHg D.每次吸引时间不应超过 1min
E.如气管切开处和口腔均需吸痰时，应先吸气管切开处，再吸口腔

9.抢救设备应严格执行“五定”制度，以下属于“五定”内容的是

A.定数量品种 B.定点安置 C.定人保管
D.定期更换 E.定期消毒灭菌

10.呼气性呼吸困难主要见于

A.喉头水肿 B.支气管哮喘 C.肺炎

- E.拔管前经引流管造影
- 23.一周内不宜下床活动的患者是
 A.右半结肠切除术后 B.胃大部切除术后 C.门腔静脉分流术后
 D.大隐静脉高位结扎术后 E.肾挫伤非手术治疗
- 24.绞窄性肠梗阻的表现是
 A.阵发性腹痛 B.出现休克症状 C.腹膜刺激征阳性
 D.均匀腹胀 E.腹穿抽出血性液
- 25.毕 I 式胃大部切除术后,可能发生的并发症
 A.吻合口出血 B.输入襻梗阻 C.输出襻梗阻
 D.吻合口梗阻 E.十二指肠残端破裂
- 26.腹膜炎患者取半卧位的目的是
 A.使渗出液积聚盆腔 B.减少毒素吸收 C.利于呼吸和循环
 D.利于炎症局限 E.预防下肢静脉血栓
- 27.排便后可出现便血的疾病是
 A.内痔 B.血栓性外痔 C.肛周脓肿
 D.肛裂 E.肛痿
- 28.检查前需作碘过敏试验的是
 A.静脉胆管造影 B.经皮肝穿刺胆管造影
 C.肝内胆管 CT 扫描 D.静脉肾盂造影 E.逆行肾盂造影
- 29.肩关节脱位的临床表现包括
 A.患肩疼痛 B.手腕下垂 C.方肩畸形
 D.上肢牵拉试验阳性 E.杜加氏征阳性
- 30.颅内压增高“三主征”包括
 A.头痛 B.呕吐 C.意识障碍
 D.瞳孔散大 E.视神经盘水肿

三、问答题（每题 20 分，共 60 分）

1.患者，女，67 岁，消瘦，长期卧床，大小便失禁。骶尾部皮肤呈紫红色，有触痛，局部有硬结，并在表面有数个大小不等的水疱，请问：

- (1) 你认为患者出现了什么问题？
- (2) 导致该问题的原因有哪些？
- (3) 请列出该患者的护理措施。

2.患者，男，65 岁，发作性胸骨后疼痛伴恶心、呕吐 2h。患者于 2h 前因饱餐后出现胸骨后压榨性疼痛，自服硝酸甘油不能缓解，并伴有恶心、呕吐等不适。半小时前出现头晕、面色苍白，冷汗淋漓，遂来本院急诊。患者近 10 多年来，有反复发作性胸闷、心悸史，有冠心病及高血压家族史。护理体检体温 36.6℃，脉搏 94 次/分，呼吸 26 次/分，血压 70/50mmHg。烦躁不安，口唇微绀，四肢湿冷。心率 105 次/分，不规则，可闻及室性期前收缩 8~10 次/分，心前区第一心音低钝。请根据以上提供的资料回答下列问题：

- (1) 作出该病例的初步医疗诊断。

- (2) 为明确诊断，需补充哪些辅助检查？
 - (3) 提出 2 个主要的护理诊断、相关因素及相应的护理措施。
3. 请叙述近侧空肠肠痿的病理生理和腹膜炎期的护理措施。