

护理综合历年真题试卷（四）

一、单项选择题（每题 1.5 分，共 180 分。每一考题下面有 A、B、C、D、E 五个备选答案，请从中选择一个最佳答案）。

1. 护士指导患者留取痰液标本时，不正确的是
A. 最好清晨留取痰液标本 B. 留取后及时送检 C. 用力咳出呼吸道深处痰液
D. 最好是在刷牙后留取痰标本 E. 要注意防止唾液及上呼吸道分泌物污染
2. 因急性呼吸道感染诱发慢性肺源性心脏病失代偿的患者，在治疗时应采用小剂量作用缓和的利尿剂，主要是为了避免
A. 诱发肾损害 B. 加重肺血管痉挛 C. 加重组织器官缺氧
D. 降低抗生素效能 E. 增加痰液黏稠度
3. 慢性肺心病患者急性加重期应慎用
A. 镇静剂 B. 祛痰剂 C. 解痉平喘药
D. 呼吸兴奋剂 E. 抗感染药物
4. 吸气性呼吸困难的发生机制是
A. 上呼吸道狭窄 B. 细小支气管狭窄 C. 肺组织弹性减弱
D. 麻醉药抑制呼吸中枢 E. 呼吸面积减少
5. 下列有关支气管哮喘临床特征的描述，最恰当的是
A. 局限性吸气性干啰音 B. 反复发作的弥漫性呼气性干啰音
C. 反复发作的吸气性干啰音 D. 弥漫性吸气性干啰音
E. 反复发作的局限性呼气性干啰音
6. 患者，女，60 岁，脑卒中左下肢瘫痪。护士在制定预防压疮的护理措施中，最好的护理方法是
A. 每天请家属检查皮肤是否有破损 B. 改善全身营养状况
C. 每 2h 为患者翻身按摩 1 次 D. 骨隆突处用气圈
E. 使患者保持右侧卧位
7. 患者，男，52 岁，患 COPD 近 15 年，近 3d 因急性上呼吸道感染病情加重，体温 37.8℃，神志恍惚，昼睡夜醒，气促、不能平卧，痰色黄、黏稠，不易咳出。血气分析示 PaO₂ 为 56mmHg、PaCO₂ 为 67mmHg。考虑此患者发生了
A. 电解质紊乱 B. 呼吸性酸中毒 C. 脑疝先兆
D. 肺性脑病 E. 自发性气胸
8. 慢性心衰患者进行 6 分钟步行试验，被判断为重度心衰，是指患者的步行距离
A. <150m B. <250m C. <350m
D. <450m E. <550m
9. 可引起左心室前负荷过重的疾病是
A. 高血压 B. 主动脉瓣狭窄 C. 二尖瓣关闭不全
D. 肺动脉高压 E. 肺动脉瓣狭窄

10. 肾病综合症患者发现一侧下肢肿胀明显较另一侧严重，并伴有胀痛感，最可能发生了
- A. 蜂窝织炎 B. 周围神经炎 C. 深静脉血栓形成
D. 静脉受压 E. 慢性心力衰竭
11. 房颤患者主要应观察
- A. P 波的频率 B. P 波的形态 C. 血压的变化
D. 心室率的改变 E. 脉搏的改变
12. 心力衰竭患者使用利尿剂时应特别注意
- A. 心率变化 B. 血压变化 C. 电解质变化
D. 肾功能变化 E. 肝功能变化
13. 患儿，女，15 岁，担心肥胖而节食 1 年余，近半年来患儿食欲差，厌食，考虑为神经性厌食症。对该患儿处理最适合的是
- A. 顺应患儿心理 B. 培养健康的性心理 C. 长期服用促消化药物
D. 安排丰富的业余生活 E. 引导其树立正确的审美观
14. 患有高血压、动脉粥样硬化的老年患者，其饮食中不需限制的是
- A. 高胆固醇食物 B. 高动物脂肪食物 C. 高糖食物
D. 高钠食物 E. 高钙食物
15. 下列哪项心律失常采用机械兴奋迷走神经的方法可能终止发作
- A. 频发室性期前收缩 B. 房室传导阻滞 C. 心房颤动
D. 阵发性室上性心动过速 E. 阵发性室性心动过速
16. 某女，35 岁，急性腹膜炎术后 6 天并发肺部感染。检查血气分析结果：血 pH7.28， HCO_3^- 25mmol/L， PaCO_2 52mmHg。考虑为
- A. 呼吸性酸中毒 B. 呼吸性碱中毒 C. 代谢性酸中毒
D. 代谢性碱中毒 E. 混合性碱中毒
17. 患者，男，48 岁，诊断为糖尿病，患者拟在家中自行检测血糖。护士应告知其餐后 2h 血糖的正常值是
- A. <4.8mmol/L B. <5.8mmol/L C. <6.8mmol/L
D. <7.8mmol/L E. <8.8mmol/L
18. 某冠心病患者，半月来频繁发作心前区不适，含服硝酸甘油无效，疑为急性心肌梗死。最具诊断意义的辅助检查是
- A. 血常规 B. 尿常规 C. 血沉
D. 超声波 E. 心电图
19. 胃肠钡餐造影检查需要禁食
- A. 2h B. 4h C. 6h
D. 8h E. 12h
20. 患者的呕吐物量大并伴有含酸性发酵宿食，见于
- A. 慢性胃炎 B. 幽门梗阻 C. 急性胆囊炎
D. 急性胰腺炎 E. 慢性肠炎
21. 在引起消化性溃疡的损害因素中，占主导地位的是

- A.胃酸 - 胃蛋白酶 B.幽门螺杆菌感染 (Hp) C.非甾体类消炎药
D.饮食失调 E.精神因素
- 22.一健康女婴，足月顺产后 5d，因出现阴道血性分泌物被父母送来医院。该现象最可能是
A.假月经 B.阴道直肠瘘 C.尿道阴道瘘
D.会阴损伤 E.血友病
- 23.患者，女，43 岁，有风湿性心脏瓣膜病史。患者于户外运动时，突然出现右侧肢体无力，站立不稳，并有口角歪斜。该患者最可能是并发了
A.脑栓塞 B.短暂性脑缺血发作 C.颅内肿瘤
D.蛛网膜下腔出血 E.颅内动静脉瘤破裂
- 24.甲亢突眼的眼部护理内容不包括
A.佩戴有色眼镜 B.睡前涂抗生素眼膏 C.睡觉或休息时，抬高头部
D.多食碘盐 E.加盖眼罩防止角膜损伤
- 25.赵先生患消化性溃疡 10 余年，饮酒 30min 后出现剧烈上腹部疼痛，诊断为急性胃穿孔，首要护理措施为
A.立即应用镇痛剂 B.立即输血 C.禁食和胃肠减压
D.安慰并陪伴患者 E.立即补液
- 26.孕妇，26 岁，孕 39 周，上午家务劳动时突感胎动频繁，至傍晚胎动渐减弱、消失，急诊入院，听诊胎心音 90 次/分，下列护理措施不妥的是
A.左侧卧位，间断吸氧
B.行胎心监护
C.嘱孕妇增加营养和休息即可，继续观察病情
D.协助做好手术产的准备
E.做好新生儿的抢救和复苏准备
- 27.急性肾盂肾炎最具特征性的尿液为
A.血尿 B.蛋白尿 C.脓尿
D.乳糜尿 E.脂质尿
- 28.下列哪项指标有助于贫血的鉴别和（或）疗效观察与评价
A.血红蛋白 B.红细胞计数 C.白细胞计数
D.网织红细胞 E.血小板计数
- 29.8 岁男孩在排尿中途突然尿流中断，呼痛不已，应首先考虑
A.尿道结石 B.膀胱结石 C.肾结石
D.输尿管结石 E.肾盂结石
- 30.关于溶血反应所致的急性肾功能衰竭症状，错误的是
A.少尿或无尿 B.高钾血症 C.酸中毒
D.可出现管型尿和蛋白 E.尿素氮滞留
- 31.急性白血病患者突然出现高热，主要原因为
A.出血 B.感染 C.正常红细胞减少
D.血小板减少 E.白血病细胞浸润

- 32.确诊二尖瓣狭窄的最可靠的辅助检查是
 A.心电图 B.胸部 X 线片 C.超声心动图
 D.心导管检查 E.CT
- 33.伴有出血倾向的血液患者出现下列哪项表现，要高度警惕颅内出血
 A.高热 B.突发头痛 C.心悸气促
 D.恶心呕吐 E.血压下降
- 34.甲亢的心血管系统特征性表现是
 A.心悸气短 B.心律失常 C.睡眠时心率仍增快
 D.心脏增大 E.心尖部第一心音亢进
- 35.符合甲状腺危象表现的是
 A.体温 37℃ B.便秘 C.反应迟钝
 D.颜面水肿 E.心率 140 次/分
- 36.抢救糖尿病酮症酸中毒首要的和关键的措施是
 A.补液 B.防止诱因 C.使用小剂量胰岛素
 D.纠正脑水肿 E.纠正电解质和酸碱平衡失调
- 37.糖尿病最常见的急性并发症是
 A.神经病变 B.大血管病变 C.酮症酸中毒
 D.高渗性非酮症昏迷 E.感染
- 38.胰岛素治疗过程中最常见的不良反应是
 A.低血糖反应 B.过敏反应 C.注射部位脂肪萎缩
 D.酮症酸中毒 E.胃肠道反应
- 39.诊断糖尿病的主要依据是
 A.尿糖测定 B.血糖测定 C. OGTT 糖耐量试验
 D.血浆胰岛素低于正常 E.糖化血红蛋白含量增高
- 40.下列不符合 SLE 临床特点的是
 A.皮肤损害常见于暴露部位 B.肾脏损害多见
 C.多数出现关节畸形 D.可出现抽搐
 E.可有心肌炎
- 41.急性阑尾炎早期腹痛多位于上腹部和脐周，是因为
 A.内脏功能紊乱 B.腹膜炎刺激 C.内脏神经反射
 D.胃肠道反射痉挛 E.合并急性胃肠炎
- 42.某护士用下排气式高压蒸气灭菌锅进行灭菌，8:35am 锅内压力达到所需数值，其后一直维持在 103~137kPa 之间，结束灭菌的正确时间是
 A.8:45am B.8:50am C.9:05am
 D.9:35am E.10:00am
- 43.保护易感人群最重要的免疫措施是
 A.接种疫苗、菌苗、类毒素 B.注射高效免疫球蛋白
 C.口服中草药 D.接种抗毒素

- E.注射丙种球蛋白
- 44.下列关于狂犬病的预防措施,错误的是
- A.捕杀野犬 B.病犬、病猫、病兽击毙深埋或焚烧
C.正确处理被咬伤口 D.被狂犬咬伤后接种狂犬疫苗
E.易感人群在未被咬伤前即应预防性接种狂犬疫苗
- 45.有关细菌性痢疾错误的是
- A.急性患者里急后重明显 B.典型粪便为黏液脓血便
C.轻型腹部症状不明显 D.病后免疫持久
E.中毒型多见于 2~7 岁儿童
- 46.在我国诱发原发性肝癌最主要的疾病是
- A.甲型肝炎 B.乙型肝炎 C.肝脓肿
D.中毒性肝炎 E.肝棘球蚴病
- 47.脑出血患者最主要的死亡原因是
- A.坠积性肺炎 B.压疮感染 C.脑疝
D.溃疡大出血 E.呼吸衰竭
- 48.输卵管妊娠患者前来就诊时,最常见的主诉是
- A.腹痛 B.胸痛 C.咳嗽
D.咯血 E.呼吸急促
- 49.患者,女,45岁,因腹痛伴呕吐 1d 入院。主诉乏力,口渴,尿量少且色黄;体检:眼窝凹陷、脉细速、血压为 90/60mmHg,尿比重为 1.018,血清钠浓度为 142mmol/L。根据上述情况应首先补充的液体是
- A.3%氯化钠溶液 B.5%碳酸氢钠溶液 C.5%葡萄糖溶液
D.10%葡萄糖溶液 E.平衡液
- 50.呼吸性酸中毒的主要发病机制是
- A.H⁺排出有障碍 B.H⁺产生过多 C.CO₂排出障碍
D.HCO₃⁻排出过多 E.K⁺排出障碍
- 51.全身麻醉最严重的并发症是
- A.上呼吸道梗阻 B.低血压 C.高血压
D.心搏骤停 E.心律失常
- 52.术后患者早期呕吐的最常见原因是
- A.急性胃扩张 B.水、电解质紊乱 C.麻醉反应
D.急性肠梗阻 E.胃肠蠕动受抑制
- 53.控制破伤风患者痉挛的最主要措施是
- A.保持病室安静 B.限制亲友探视 C.使用镇静及解痉剂
D.护理措施要集中 E.静脉滴注破伤风抗毒素
- 54.胆道 T 管拔除前,夹管观察的内容是
- A.体温、血压、意识 B.腹痛、体温、黄疸 C.腹痛、呕吐、体温
D.黄疸、血压、意识 E.腹痛、血压、体温

55.某男, 30岁, 全麻后开始呼吸有鼾声, 且呼吸急促, 继之出现鼻翼扇动和三凹征, 应首先考虑为

- A.低氧血症 B.呕吐物误吸 C.坠积性肺炎
D.麻药毒性反应 E.舌后坠

56.男性 86 岁, 脑溢血后卧床半年多, 病人有时神志恍惚, 烦躁不安, 经检查下腹部隆起, 半球形囊性肿物, 有少量尿液自尿道口溢出浸湿衣、裤等, 应认为是

- A.真性尿失禁 B.充盈性尿失禁 C.压力性尿失禁
D.尿瘘 E.假性尿失禁

57.患者, 男性, 32 岁, 突发剧烈头痛, 伴呕吐。查体: 意识清楚, 双侧瞳孔等大等圆, 颈项强直, Kernig 征阳性。该患者最可能是

- A.脑出血 B.短暂脑缺血发作 C.蛛网膜下腔出血
D.脑梗死 E.脑血栓形成

58.患者, 女, 腰麻下行阑尾切除术, 术后 4h 患者烦躁不安, 主诉腹胀, 测血压、脉搏、呼吸均正常, 体检: 下腹部膨隆, 叩诊浊音, 首先考虑

- A.肠梗阻 B.急性胃扩张 C.腹腔内出血
D.急性腹膜炎 E.尿潴留

59.下列哪种药物不能用于臀红护理

- A.硝酸咪康唑霜 B.鱼肝油软膏 C.3%~5%鞣酸软膏
D.0.02%高锰酸钾溶液 E.氯化锌

60.患者, 女, 30 岁, 月经来潮期间出现乳房胀痛半年。两侧乳房内可触及多个大小不等、质地坚韧的结节状肿块, 首先考虑的疾病是

- A.乳癌 B.乳房囊性增生病 C.乳房纤维瘤
D.乳管内乳头状瘤 E.乳房脂肪瘤

61.患者, 男, 28 岁, 8 年来站立或腹压增高时反复出现右腹股沟肿物, 平卧安静时肿块明显缩小或消失。10h 前因提重物而肿块又出现, 伴腹痛、呕吐, 肛门停止排气和排便; 体检: 右阴囊可见一梨状肿块, 有触痛, 平卧后肿块不消失。最有可能的诊断是

- A.嵌顿性腹股沟斜疝 B.嵌顿性腹股沟直疝 C.绞窄性股疝
D.睾丸鞘膜积液 E.睾丸扭转

62.患者, 男, 50 岁, 左上腹撞伤伴腹痛 4h, 伤后曾呕吐 1 次, 为少量胃内容物。体检: 神志清, 血压为 100/76mmHg, 脉搏为 88 次/分, 上腹部有压痛、反跳痛及肌紧张, 移动性浊音 (-)。腹部平片示: 膈下有游离气体。考虑最可能为

- A.腹壁挫伤 B.脾包膜下血肿 C.胰腺损伤
D.肝破裂 E.腹腔内空腔脏器破裂

63.患者, 女, 56 岁, 右上腹绞痛、发热、黄疸间歇性反复发作, 最可能的诊断是

- A.胰头癌 B.急性传染性肝炎 C.肝癌
D.胆总管结石 E.阿米巴肝脓肿

64.患者, 男, 45 岁, 因肝癌行肝叶切除术后第一天, 患者感腹痛、心慌、气促、出冷汗, 血压下降, 首先考虑

- A.胆汁性腹膜炎 B.肠梗阻 C.肝断面出血
D.膈下脓肿 E.肝性脑病
- 65.男, 35 岁, 双侧股骨干闭合性粉碎骨折, 伤后 48 小时出现紫绀、呼吸困难、肺部啰音。此时应考虑
- A.脂肪栓塞 B.坠积性肺炎 C.感染
D.休克 E.挤压综合征
- 66.经皮肝穿刺胆管造影(PTC)术后容易发生的并发症是
- A.急性胰腺炎 B.气胸 C.内出血和腹膜炎
D.胆管出血 E.胆管感染
- 67.慢性呼吸衰竭病人应用呼吸兴奋剂的先决条件是
- A.换气功能良好 B.气道通畅 C.紫绀不明显
D.无肝肾功能不全 E.呼吸不规则, 但无惊厥
- 68.患者, 男, 71 岁, 因下腹隐痛伴里急后重, 解黏液脓血便三周来院诊治, 医生行直肠指检, 采用的检查体位是
- A.仰卧位 B.侧卧位 C.俯卧位
D.截石位 E.蹲位
- 69.患者平卧抬高下肢, 排空静脉血, 在大腿根部扎止血带阻断大隐静脉, 然后让患者站立, 10s 内放开止血带, 若出现自上而下的静脉逆向充盈, 提示
- A.交通静脉瓣膜功能异常 B.下肢深静脉通畅 C.小隐静脉瓣膜功能不全
D.大隐静脉瓣膜功能不全 E.下肢浅静脉通畅
- 70.慢性脓胸可出现的体征有
- A.肋间隙饱满 B.叩诊鼓音 C.支气管及纵隔偏向患侧
D.支气管及纵隔偏向健侧 E.下胸部叩诊过清音
- 71.患者, 男, 55 岁, 20 年前曾患肺结核, 近 4 个月来出现刺激性咳嗽, 痰中带血丝, 伴右侧胸痛、发热, X 线片示右上肺有 4cmx5cm 大小的阴影, 边缘模糊, 周围有毛刺。应考虑的诊断是
- A.肺结核 B.肺囊肿 C.肺良性肿瘤
D.肺脓疡 E.肺癌
- 72.食管癌患者出现持续性胸背痛多表示
- A.癌肿部位有炎症 B.癌肿已侵犯食管外组织
C.有远处血行转移 D.有食管气管瘘 E.侵犯喉返神经
- 73.下列有关体外循环术后的护理措施, 错误的是
- A.患者回病房后立即吸氧 B.作好胸腔闭式引流的护理
C.严格无菌技术操作 D.若血压、脉搏平稳, 即应取平卧位
E.密切观察和处理出血等并发症
- 74.患者, 男, 40 岁, 胸部外伤后出现呼吸困难、发绀、冷汗。体检: 心率为 112 次/分, 血压为 70/45mmHg, 气管向左偏移, 颈部广泛皮下气肿, 右侧胸廓饱满, 叩诊鼓音, 右肺呼吸音消失。最可能的诊断是

- A.损伤性血胸 B.肺挫裂伤 C.肋骨骨折
D.张力性气胸 E.创伤性窒息
- 75.患者，男，19岁，自发性气胸就医，置胸腔闭式引流，下地活动时不慎将引流管脱出，护士首要的处理是
- A.通知医师紧急处理 B.患者吸氧 C.嘱患者缓慢呼吸
D.将脱出的引流管重新置入 E.用手指捏闭引流口周围皮肤
- 76.患者，男，经常在持续高血压的基础上血压突然再升高，常表现为头痛、出汗、心动过速等；经各项检查，诊断为嗜铬细胞瘤，拟做手术治疗。术前护理措施中哪一项不恰当
- A.遵医嘱服降压药 B.心理护理 C.限制其活动范围
D.限制液体摄入 E.预防感染
- 77.患者，男，50岁，排尿过程中突然尿流中断，疼痛剧烈，改变体位后又可排尿，应考虑
- A.肾结石 B.输尿管结石 C.膀胱结石
D.后尿道结石 E.前尿道结石
- 78.原发性肝癌治疗的最好方法是
- A.放疗 B.化疗 C.手术治疗
D.免疫疗法 E.姑息疗法
- 79.后尿道断裂血尿外渗的范围是
- A.腹腔内 B.会阴部皮下 C.会阴浅袋
D.盆腔腹膜外膀胱周围 E.阴囊内
- 80.老人慎用吗啡，是因为吗啡容易引起
- A.恶心呕吐 B.呼吸抑制 C.心率减慢
D.喉头痉挛 E.血压下降
- 81.硬膜外麻醉后需平卧4~6小时，其原因是
- A.减轻药物吸收后的毒性反应 B.有利于维持血压稳定
C.防止呕吐误吸 D.防止术后头痛
E.有利于保持呼吸道通畅
- 82.股骨颈骨折患者行人工全髋关节术后，患肢应采取的体位是
- A.外展内旋位 B.内收内旋位 C.内收外旋位
D.外展外旋位 E.外展中立位
- 83.输液器的点滴系数为15，500ml的溶液需要维持5小时输注，每分钟的滴速应调至
- A.15滴/分钟 B.20滴/分钟 C.25滴/分钟
D.30滴/分钟 E.40滴/分钟
- 84.患者男性，68岁，诊断为脊髓型颈椎病，入院第二天行颈椎病前路手术，手术后患者出现呼吸困难的原因，不包括
- A.伤口出血 B.喉头水肿 C.术中损伤脊髓
D.术中损伤喉上神经 E.植骨块脱落
- 85.以下描述中属于以人的健康为中心阶段的特点是
- A.建立以患者为中心的护理教育模式

- B.系统化贯彻“护理程序”
 C.按“护理程序”的工作方法对患者实施整体护理
 D.护理方法是执行医嘱和护理常规
 E.强调护理是一门专业
- 86.某患者为毕业班老师，住院后每天批阅学生作业到很晚，此患者属于
 A.角色适应 B.角色行为冲突 C.角色行为强化
 D.角色行为消退 E.角色行为缺如
- 87.应激整体适应综合征的第一期是
 A.兴奋期 B.反应期 C.警觉期
 D.抵抗期 E.耗竭期
- 88.患者，男，30岁，半小时前因汽车撞伤头部入院，入院时已昏迷。对于此患者应采取的护患关系模式是
 A.主动-主动型 B.被动-被动型 C.主动-被动型
 D.指导-合作型 E.共同参与型
- 89.下列有关护理诊断排序的说法正确的是
 A.对于某个患者来说，护理诊断的先后顺序应是固定不变的
 B.现存的护理诊断一定排在有危险的护理诊断之前
 C.一个患者的首优问题只有一个
 D.护士可参照马斯洛需要层次学说排序
 E.必须先解决首优问题，然后再解决中优问题
- 90.患者，男，38岁，进行乙状结肠镜检查，应采取的体位是
 A.头低足高位 B.头高足低位 C.俯卧位
 D.膝胸卧位 E.端坐位
- 91.下列消毒剂中，分别属于高效、中效消毒剂的是
 A.戊二醛、新洁尔灭 B.戊二醛、环氧乙烷 C.碘伏、环氧乙烷
 D.过氧乙酸、乙醇 E.碘伏、乙醇
- 92.以下关于医院感染说法正确的是
 A.出院后发病的患者不属医院感染的范畴 B.感染和发病应同时发生
 C.一定是在患者住院期间遭受的感染 D.陪护者是医院感染的主要对象
 E.只要在住院期间发生的感染就属于医院感染
- 93.腰椎穿刺后6h内让患者采取去枕仰卧位的目的是
 A.防止颅内出血 B.预防颅内高压 C.预防颅内压减低
 D.预防颅内感染 E.防止脑缺血
- 94.防止躁动不安的患者坠床应使用
 A.床栏 B.肩部约束带 C.膝部约束带
 D.腕部约束带 E.踝部约束带
- 95.对外科手术后疼痛，镇痛剂最好用在
 A.麻醉清醒前 B.麻醉清醒后 C.疼痛发作前

- D.疼痛发作时 E.疼痛发作后
- 96.为口腔铜绿假单胞菌感染的患者进行口腔护理时可选用的漱口液是
 A.1%~3%过氧化氢 B.2%~3%硼酸 C.1%~4%碳酸氢钠
 D.0.02%呋喃西林 E.0.1%醋酸
- 97.患者王某,60岁,全身麻醉后行“全胃切除术”。护士在使用平板车搬运该患者时应该注意
 A.一个人搬运时,平车紧靠床边 B.两人搬运时,平车的头端和床尾呈钝角
 C.三人搬运时,力气大的站床头 D.四人搬运时,分两组分别站在床两侧
 E.推送患者时注意平车的大轮在前
- 98.肝硬化严重腹水患者应给予
 A.无盐低钠饮食 B.低脂饮食 C.低蛋白饮食
 D.高蛋白饮食 E.高热量饮食
- 99.有关紫外线消毒下述描述正确的是
 A.对空气消毒时,每次照射的时间一般为15~20min
 B.物品消毒,有效距离为2m
 C.消毒时间,需从灯亮5~7min后开始计时
 D.灯管表面应定期用清水擦拭
 E.室温越高,紫外线杀菌作用越强
- 100.下列应执行保护性隔离的患者是
 A.细菌性痢疾 B.肺结核 C.肝移植
 D.艾滋病 E.非典型性肺炎
- 101.患者,女,27岁,因体表面积40%烧伤入院。护士向患者解释创面局部涂抹磺胺嘧啶银的目的,错误的是
 A.促进创面干燥 B.促进创面结痂 C.促进创面愈合
 D.控制感染 E.防止出血
- 102.尿毒症、糖尿病等引起的代谢性酸中毒患者,其呼吸经常表现为
 A.Cheyne-Stokes respiration B.Biot's respiration
 C.Strident respiration D.Kussmaul's respiration
 E.Stertorous respiration
- 103.一氧化碳中毒患者缺氧的类型是
 A.低张性缺氧 B.循环性缺氧 C.组织性缺氧
 D.血液性缺氧 E.呼吸性缺氧
- 104.查找痰内癌细胞,标本可用乙醇固定,其浓度为
 A.25% B.35% C.50%
 D.70% E.95%
- 105.下列因素中导致血压读数偏低的是
 A.被测手臂位置高于心脏水平;袖带过松

- B.放气太慢；袖带过紧
C.视线高于汞柱；袖带过紧
D.视线低于汞柱；被测手臂位置低于心脏水平
E.患者刚爬上6楼；放气太快
- 106.当平静吸气时，脉搏明显减弱甚至消失的现象称为
A.水冲脉 B.绀脉 C.交替脉
D.奇脉 E.脱落脉
- 107.阿米巴痢疾患者，留取大便标本的容器为
A.蜡纸盒 B.玻璃皿 C.大试管
D.加温便器 E.塑料盒
- 108.膀胱冲洗时，滴入的治疗药物须在膀胱内保留时间为
A.10min B.15min C.20min
D.25min E.30min
- 109.成年女性导尿时，导尿管插入
A.2~3cm B.4~6cm C.6~8cm
D.7~8cm E.7~9cm
- 110.臀大肌注射时患者侧卧的正确姿势是
A.下腿伸直，上腿稍弯曲 B.两腿弯曲 C.上腿伸直，下腿稍弯曲
D.双膝向腹部弯曲 E.两腿伸直
- 111.患者，男，49岁，因风湿性心瓣膜病入院。给予抗感染和抗心衰治疗后好转，拟于今日出院，护士在指导中应强调，预防链球菌感染最重要的措施是
A.坚持锻炼，防止呼吸道感染 B.减少运动，多休息
C.坚持限制钠盐饮食 D.减轻心理压力，增强康复信心
E.定期复查，必要时作细菌培养
- 112.发生青霉素过敏性休克时，患者出现的呼吸系统症状是
A.意识丧失 B.血压下降 C.面色苍白
D.喉头水肿、气促 E.幻觉、谵妄
- 113.服后不宜立即饮水的是
A.磺胺药物 B.止咳糖浆 C.酸剂、铁剂
D.利尿剂 E.抗生素
- 114.因输液不慎，空气进入静脉，此时应立即采取
A.右侧卧位 B.左侧卧位、头低足高 C.仰卧中凹位
D.头高足低位 E.头低足高位
- 115.对血液病患者尤为适用的是
A.库存血 B.新鲜血 C.血尿
D.成分血 E.代血浆
- 116.当大量使用保存期长的库血，会引起
A.碱中毒，低血钠 B.碱中毒，低血钾 C.酸中毒，高血钾

- D.酸中毒，高血钠 E.酸中毒，低血钾
- 117.患者，男，71岁，诊断为阿尔兹海默症，目前临床最常用的治疗药物是
 A.抗焦虑药物 B.抗抑郁药物 C.抗精神病药物
 D.乙酰胆碱酯酶抑制剂 E.促脑代谢药物
- 118.患者，男，29岁，因高热、畏寒、咳嗽、流涕而住院治疗。医生开出以下口服药，护士在指导用药时嘱咐患者宜最后服用的是
 A.止咳糖浆 B.利巴韦林 C.维C银翘片
 D.对乙酰氨基酚 E.阿莫西林胶囊
- 119.以下关于临终关怀理念的叙述错误的是
 A.丰富患者生命，提高其生存质量
 B.采取积极措施帮助患者痊愈
 C.尊重临终患者的尊严和权利
 D.在照顾患者的同时也为家属提供心理和社会支持
 E.是社会进步的一种表现形式
- 120.临终患者开始接受自己患不治之症的事实，但抱有能治愈的希望，此期为
 A.协议期 B.接受期 C.否认期
 D.愤怒期 E.忧郁期

二、多项选择题（每题2分，共60分。每一考题下面有A、B、C、D、E五个备选答案，请从中选择两个或两个以上的最佳答案，多选、漏选、错选不给分）。

- 1.肺结核患者应采取下列哪些护理措施
 A.绝对卧床休息 B.给予高热量、高蛋白、高维生素的食物
 C.观察病情变化及药物不良反应 D.抗结核化学治疗期间均应住院隔离
 E.加强心理护理，进行保健指导
- 2.呼吸衰竭患者为保持呼吸道通畅，可采取的护理措施为
 A.应用祛痰剂 B.超声雾化吸入 C.气管切开
 D.机械辅助通气 E.环甲膜穿刺
- 3.针对COPD患者的家庭氧疗措施，正确的是
 A.吸氧浓度为35%左右 B.一昼夜吸氧时间应超过15h
 C.鼻导管给氧 D.氧疗目标为SaO₂达90%以上
 E.氧疗过程中监测血气分析
- 4.下列哪些情况下易发生洋地黄中毒
 A.心肌缺血 B.低钾血症 C.肾功能减退
 D.维持量给药 E.老年人服用
- 5.夜间阵发性呼吸困难的发作与下列哪些发病机制有关
 A.静脉回心血量增加 B.平卧时膈肌上升，肺活量减少
 C.夜间迷走神经兴奋性增高 D.熟睡时对缺氧更敏感

- E.夜间机体耗氧量增加
- 6.慢性风湿性心脏病常见的并发症包括
- A.心力衰竭 B.心房颤动 C.动脉栓塞
D.室壁膨胀瘤 E.亚急性感染性心内膜炎
- 7.为减轻腹泻患者的症状，其饮食要求为
- A.少渣 B.低脂肪 C.高蛋白质
D.易消化 E.高热量
- 8.下列关于肝硬化大量腹水患者的护理措施，正确的是
- A.给予半卧位 B.定期测量体重 C.放腹水后应缚腹带
D.给予低钾食物 E.避免骤然增加腹压的动作
- 9.肝性脑病前驱期临床表现为
- A.性格改变 B.扑翼样震颤 C.肌张力增高
D.行为异常 E.睡眠障碍
- 10.导致血液患者死亡的主要原因包括
- A.贫血 B.颅内出血 C.败血病
D.全身衰竭 E.发热
- 11.酮症酸中毒的诱因包括
- A.感染 B.饮食不当 C.创伤
D.手术、妊娠 E.¹³¹I 治疗不当
- 12.护理急性脑出血患者应注意预防
- A.呼吸道感染 B.脑疝 C.应激性溃疡
D.压疮 E.心力衰竭
- 13.休克代偿期的症状是
- A.尿量减少 B.皮肤黏膜紫绀 C.收缩压正常，脉压缩小
D.意识模糊 E.烦躁不安
- 14.BeCk 三联征是指
- A.呼吸困难 B.心律失常 C.血压降低，脉压小
D.中心静脉压升高 E.心音遥远，脉搏微弱
- 15.移植后不会发生排斥反应的是
- A.异种移植 B.异种联合移植 C.同质移植
D.同种异体移植 E.断肢再植
- 16.瘢痕性幽门梗阻患者术前的特殊准备是
- A.备皮、配血 B.术前 3d 每晚洗胃 C.药物过敏试验
D.纠正代谢性碱中毒 E.心理护理
- 17.患者，女，25 岁，甲状腺大部切除术后返回病房，患者声音嘶哑，饮水易出现呛咳，可能的并发症是
- A.一侧喉返神经损伤 B.喉上神经内支损伤 C.喉上神经外支损伤
D.双侧喉返神经损伤 E.甲状旁腺损伤

18. 下列胆管检查前需作碘过敏试验的是
 A. CT B. B 型超声波 C. 静脉胆管造影
 D. ERCP E. PTC
19. 肛门坐浴的目的包括
 A. 促进排便反应 B. 促进炎症吸收 C. 消除局部分泌物
 D. 改善局部血液循环 E. 使肛门括约肌放松
20. 腹膜炎患者采用半卧位，其目的包括
 A. 有利于脓液积聚于盆腔 B. 有利于呼吸和循环 C. 有利于炎症局限及引流
 D. 促进胃肠道功能恢复 E. 防止膈下感染
21. 关于泌尿系统结石患者的护理正确的是
 A. 卧床休息 B. 多饮水 C. 注意饮食调节
 D. 适当运动 E. 控制水分摄入
22. 护理的发展阶段经历了
 A. 以家庭为中心 B. 以疾病为中心 C. 以患者为中心
 D. 以健康为中心 E. 以社会为中心
23. 下列属于阻碍有效沟通的行为是
 A. 改变话题 B. 主观判断 C. 核实
 D. 多说安慰话，如“你一定会好的。” E. 尽快下结论
24. 患者朱某因颈椎骨折入院，在对其进行搬运的过程中，应注意
 A. 可采用三人搬运法 B. 可采用四人搬运法 C. 保持头部处于中立位
 D. 上下坡时，患者头部应位于低处 E. 头颈两侧用衣物或沙袋加以固定
25. 如患者不慎咬破体温计，正确的做法是
 A. 立即洗胃 B. 立即清除玻璃碎屑 C. 饮大量蛋清液或牛奶
 D. 饮大量生理盐水，卧床休息 E. 病情允许下服用富含膳食纤维的食物
26. 下列属于晶体溶液的是
 A. 5%~10%葡萄糖溶液 B. 复方氯化钠溶液 C. 4%碳酸氢钠
 D. 706 代血浆 E. 低分子右旋糖酐
27. 判断心脏骤停的主要标准是
 A. 意识丧失 B. 呼吸停止 C. 心电图呈直线
 D. 颈动脉搏动消失 E. 心音消失
28. 以下属于洗胃禁忌证的有
 A. 强酸中毒 B. 肝硬化伴食管静脉曲张 C. 重金属中毒
 D. 胃癌 E. 胃穿孔
29. 使用人工呼吸器的适应症
 A. 呼吸停止 B. 呼吸肌疲劳 C. 呼吸机瘫痪
 D. 呼吸中枢衰竭 E. 麻醉时呼吸管理
30. 长期卧床的骨科病人，护理应注意预防的并发症是
 A. 垂足 B. 泌尿系统结石 C. 压疮

D.肌肉萎缩

E.肺部感染

三、问答题（每题 20 分，共 60 分）。

1.患者，女，45岁，扁桃体炎反复发作10余年。3年前体检时发现尿蛋白（++），镜下血尿3/HP。无明显高血压、水肿等症状，肾功能检查正常。诊断为“急性肾小球肾炎”，给予卧床休息、预防感染、对症支持治疗后好转。近1个月来感全身乏力，胃纳明显下降，咽喉部肿痛，尿量减少，来院就诊。

护理体检：体温37.5℃，脉搏87次/分，呼吸9次/分，血压160/110mmHg。神志清，精神尚可，贫血貌，颜面轻度浮肿，胸腹部检查（-），双下肢中度凹陷性水肿，神经系统检查（-）。实验室检查：血液检查白细胞 $6.5 \times 10^9/L$ 中性粒细胞比例70%，淋巴细胞比例30%，血红蛋白100g/L，尿液检查蛋白（++），颗粒管形3/HP，肾功能检查尿肌酐 $250 \mu\text{mol/L}$ ，血尿素氮 18mmol/L ，肾小球滤过率 30ml/min 。

请根据以上提供的资料，回答下列问题：

- （1）作出该病例的初步医疗诊断。
- （2）为明确诊断，需补充哪些辅助检查？
- （3）提出2个主要的护理诊断和相关因素，制定相应的护理措施。

2.病历摘要：李先生，43岁，2h前骑自行车被汽车撞倒，头部着地，当即昏迷约10min，醒后诉头痛，在转送过程中再次昏迷，并呕吐胃内容物2次。体检：体温37℃，呼吸12次/分，脉搏62次/分，血压130/70mmHg。意识不清，针刺肢体能睁眼并有肢体伸直动作，回答问题有音无语。右颞部头皮触及 $4 \text{cm} \times 5 \text{cm}$ 血肿，右耳后乳突区有瘀斑，右侧瞳孔直径约3.5mm，对光反应迟钝，左侧瞳孔直径2mm，对光反应正常。右耳道流淡血性液体，嘴角向左侧歪。左侧肢体瘫痪、肌张力稍增高、腱反射亢进，病理反射阳性。CT检查结果：右颞部硬脑膜外血肿、颅底骨折。经积极准备后手术治疗。请回答：

- （1）患者到医院时，意识障碍按Glasgow评分为几分？
- （2）该患者手术前应做好哪些护理？
- （3）该患者因颅底骨折存在“有感染的危险与脑脊液外漏有关”，请制定相应的护理目标和护理措施。

3.患者，女，截瘫，卧床两个月，小便失禁。现骶尾部皮肤有约 $5 \text{cm} \times 5 \text{cm}$ 大小呈紫红色，且表面有一较大水疱，局部软组织肿胀、发硬，疼痛明显。请分析回答：此患者出现了什么问题？针对此患者目前状况，你将如何护理？