

历年真题试卷（十）

一、单项选择题（每一考题下面有 A、B、C、D、E 五个备选答案，请从中选择一个最佳答案，每题 1.5 分，共 180 分）。

1. 一般晚期慢性肺源性心脏病的最重要治疗措施是
A. 持续吸氧 B. 大量利尿 C. 支气管解痉
D. 兴奋呼吸 E. 控制感染
2. 下列哪种呼吸提示病情最危重
A. 呼吸浅速 B. 呼吸深快 C. 呼吸与呼吸暂停相交替
D. 每分钟呼吸超过 24 次 E. 每分钟呼吸少于 10 次
3. 肝颈静脉回流征阳性提示
A. 胸腔积液 B. 高血压 C. 心房颤动
D. 右心功能不全 E. 左心功能不全
4. 确定给氧方法和浓度的首要指标是
A. 发绀的轻重 B. 神志状态 C. 呼吸困难的程度
D. 肺功能检查结果 E. 病情和血气检查
5. 关于中毒性肺炎抗休克护理措施错误的是
A. 去枕平卧位 B. 热水袋体表保暖 C. 高流量吸氧
D. 迅速建立静脉通路 E. 输液速度先快后慢
6. 下列哪项表现不提示右心功能不全
A. 劳力性呼吸困难 B. 腹水 C. 紫绀
D. 肝颈静脉回流征阳性 E. 下肢水肿
7. 长期服用噻嗪类利尿剂最常引起
A. 高钾 B. 低钠 C. 高钙
D. 低钾 E. 高尿酸血症
8. 闻及舒张期奔马律常提示
A. 主动脉瓣关闭不全 B. 心包大量积液 C. 静脉压升高
D. 左室功能低下 E. 严重心律失常
9. 心力衰竭最常见的诱发因素是
A. 过度劳累 B. 摄入盐过多 C. 感染
D. 心律失常 E. 洋地黄应用不当
10. 心功能的评估主要依据
A. 病程长短 B. 活动耐力 C. 有无并发症
D. 心脏体征 E. 辅助检查资料
11. 洋地黄中毒引起的心律失常，最常见的是
A. 房室传导阻滞 B. 房颤 C. 窦性心动过速
D. 伴 2:1 传导的阵发性房性心动过速 E. 室性早搏
12. 漂浮导管检查的护理措施哪项不正确

天任考研

- A.术前排尿 B.做碘过敏试验 C.留置导管一般不应超过 72h
D.定时用肝素溶液冲洗导管 E.每天清洁伤口
- 13.关于高血压危象的叙述,下列哪项是错误的
A.收缩压可达 33.8kPa B.可见于急进型高血压 C.可有高血压脑病的表现
D.舒张压 ≥ 15.6 kPa E.主要是由于脑部血管痉挛所致
- 14.消化性溃疡夜间痛、后背痛最明显的是
A.胃溃疡 B.十二指肠球部溃疡 C.十二指肠球后溃疡
D.幽门管溃疡 E.食管溃疡
- 15.溃疡性结肠炎急性发作期哪项检查提示预后不良
A.血清 γ 球蛋白降低 B.血沉加快 C.白细胞升高
D.凝血酶原时间延长 E.贫血
- 16.尿毒症患者低 Ca^{2+} , 抽搐主要见于
A.酸中毒加重时 B.大量利尿剂 C.静脉补葡萄糖时
D.迅速纠正酸中毒 E.厌食恶心, 呕吐
- 17.关于肾盂肾炎的治疗原则,下列除哪项外均正确
A.多喝水 B.调整尿的酸碱度 C.停药后每月复查尿常规并做尿培养一次
D.尿常规恢复正常即停药 E.根据药物敏感实验选药
- 18.为提高尿细菌培养阳性率,下列注意事项中错误的是
A.使用抗生素前留尿 B.抗生素停用 5d 后留尿
C.采集尿标本前多喝水 D.保证尿液在膀胱内停留 6~8h
E.清洁外阴后留中段尿置于无菌试管内
- 19.肾小球肾炎不出现
A.脓尿 B.血尿 C.低比重尿
D.蛋白尿 E.管型尿
- 20.提示早期颅内出血最有意义的是
A.呕吐 B.视力模糊 C.呼吸急促
D.头晕 E.头痛
- 21.血液病伴高热时错误的护理措施是
A.冰盐水灌肠 B.多喝水 C.输液
D.头部置冰袋 E.乙醇擦浴
- 22.甲状腺功能亢进患者最具特征性的心血管体征为
A.睡眠时心率仍快 B.心律失常 C.脉压增大
D.水冲脉 E.毛细血管搏动征
- 23.糖尿病饮食护理不妥的是
A.按标准体重计算每天所需总热量 B.三餐总热量按习惯随时进餐
C.三餐要定时定量进餐 D.食量要与胰岛素治疗配合
E.胰岛素治疗者最好六餐制

- 24.皮质醇增多症患者如出现腹胀、四肢无力应首先考虑
A.低血钾 B.低血钙 C.低血压
D.低血糖 E.低血钠
- 25.系统性红斑狼疮最常见的皮肤损害部位是
A.背部 B.暴露部位 C.胸部
D.腹部 E.外阴
- 26.急性中毒已昏迷的患者，不能采用
A.催吐 B.洗胃 C.导泻
D.解毒剂 E.氧疗
- 27.一氧化碳中毒最好的氧疗措施是
A.低流量持续吸氧 B.高流量间歇吸氧 C.氧气湿化瓶内加酒精
D.静脉注射双氧水 E.高压氧
- 28.护理脑血栓形成患者，下列哪项不妥
A.保持安静 B.保暖 C.水平卧位
D.头置冰袋 E.增加营养
- 29.总铁结合力在下面哪种情况时增高
A.肿瘤性贫血 B.明显的缺铁 C.恶性贫血
D.血友病 E.铁利用性贫血
- 30.脑出血患者出现呼吸变慢、瞳孔不等大，应考虑
A.呼吸道不通畅 B.呼吸衰竭 C.脑疝
D.室颤先兆 E.脑出血加重
- 31.患者，男，56岁，COPD多年，近来呼吸困难，医嘱鼻导管给氧，给氧操作正确的是
A.氧气筒放置距暖气应5m B.给氧前用干棉签清洁鼻孔
C.导管插入长度为鼻尖到耳垂的1/2 D.给氧时，调节氧流量后插入鼻导管
E.停止给氧时，应先关氧气开关
- 32.饮大量白开水后尿量增多，主要是由于
A.血浆胶体渗透压降低 B.抗利尿激素分泌减少 C.血浆晶体渗透压升高
D.醛固酮分泌减少 E.肾小球囊内压降低
- 33.关于体液调节哪项是错误的
A.包括神经调节 B.包括激素调节 C.口渴中枢在下丘脑
D.通过抗利尿激素调节钠的吸收 E.通过醛固酮调节钠的吸收
- 34.下列哪项是高渗性脱水的原因
A.胃穿孔腹膜炎 B.急性肠梗阻 C.慢性消化道瘘
D.禁食 E.大面积烧伤暴露疗法
- 35.急性代谢性酸中毒时，机体主要的代偿方式是
A.细胞外液缓冲代偿 B.呼吸代偿 C.肾脏代偿
D.细胞内液缓冲代偿 E.组织蛋白缓冲代偿
- 36.对有体液平衡失调的患者进行护理估计，哪项不正确

- A.气管切开 24h 失水 1000ml
 B.体温升高 1℃，每千克体重失水 40ml
 C.出汗湿透一套衬衣裤失水 1000ml
 D.500ml 汗水约失盐 1.25g
 E.禁食成人每天需水 2500ml
- 37.有关休克的代谢变化，错误的是
 A.蛋白质分解代谢增强 B.血糖降低 C.代谢性酸中毒
 D.抗利尿激素分泌增加 E.尿酸增加
- 38.关于失血性休克补充血容量的目的哪项是正确的
 A.恢复细胞内液的容量 B.提高血液浓度 C.降低血液黏滞度
 D.保持微循环的血液瘀滞 E.纠正碱中毒
- 39.关于感染性休克的描述，哪项是错误的
 A.休克纠正后，着重治疗感染 B.病毒感染是导致休克的重要因素
 C.常常早期合并代谢性酸中毒 D.严重感染补充足量血容量至为关键
 E.原发灶的存在是引起休克的主要原因
- 40.下列哪项不是休克微循环扩张期的变化
 A.组织缺氧加重 B.血管内微血栓形成 C.ATP 生成减少
 D.毛细血管瘀血 E.酸中毒
- 41.吸入和静脉麻醉前不可缺少的药物是
 A.苯巴比妥钠 B.地西洋（安定） C.哌替啶
 D.氯丙嗪（冬眠灵） E.阿托品
- 42.休克引起的急性肾衰属于
 A.肾缺血所致肾性损害 B.肾中毒所致肾性损害 C.肾前性病变
 D.肾后性改变 E.以上都是
- 43.患者，男，29 岁，初步诊断为阿米巴痢疾收入院，医嘱：留取粪便做阿米巴原虫检查。护士应为患者准备的标本容器是
 A.无菌容器 B.清洁容器 C.干燥容器
 D.装有培养基的容器 E.加温的清洁容器
- 44.关于外科手术热的描述哪项是错误的
 A.是手术创伤的反应 B.变化幅度在 0.5~1.0℃
 C.一般不超过 38℃ D.手术 5d 后逐渐恢复正常
 E.不需特殊处理
- 45.13 岁女生，因月经初潮来门诊咨询。该女生自述对月经初潮来临很紧张，害怕身体出现疾病，近期情绪难控制，心神不定，烦躁不安，常与他人争吵。护士针对其进行保健指导，以下不正确的是
 A.告知其月经是女性的正常生理现象 B.嘱其月经期以卧床休息为主
 C.讲授有关青春期生理知识，性教育 D.鼓励其多与他人交流，多参加文娱活
 E.月经期注意保暖，最好不游泳
- 46.患者，男，56 岁，因肺心病需要吸氧，错误的操作是
 A.插管前用湿棉签清洁鼻孔 B.插管前检查导管是否通畅

- C.先调节好流量再插管
D.给氧期间不可直接调节氧流量
E.停用氧气时先关流量开关
- 47.转铁蛋白为
A.总铁结合力×(1.8~13)
B.总铁结合力×(0.3~23)
C.总铁结合力×(2.4~33)
D.总铁结合力×(0.8~43)
E.总铁结合力×(1.2~20)
- 48.女婴,4个月。足月儿,体检指标正常,此月龄最适合添加的辅食是
A.蛋黄
B.饼干
C.粥
D.烂面
E.土豆泥
- 49.患者,男,25岁,患肺炎入院治疗。患者进入病区后,护士的初步护理工作不包括
A.迎接新患者
B.通知病区医生
C.测量生命体征
D.准备急救物品
E.建立患者住院病历
- 50.患者,男,70岁,因肾功能衰竭住院。护士观察其24h尿量为360ml,该患者的排尿状况是
A.正常
B.尿量偏少
C.无尿
D.少尿
E.尿潴留
- 51.最容易发生嵌顿的腹外疝是
A.腹股沟斜疝
B.股疝
C.腹股沟直疝
D.脐疝
E.切口疝
- 52.关于胃的解剖生理,下列哪项是错误的
A.神经供应属于自主神经系统
B.副交感神经是抑制胃的分泌和运动功能
C.神经供应包括交感神经与副交感神经
D.副交感神经即为左、右迷走神经
E.胃分为3部分
- 53.关于阑尾的解剖生理,下列哪项是错误的
A.是一个淋巴器官
B.具有一定的免疫力
C.阑尾的组织结构与结肠相差很大
D.神经位于系膜内
E.阑尾静脉与动脉伴行
- 54.关于肛裂的描述,下列哪项是错误的
A.是指肛管皮肤层部分裂开
B.发生于经常便秘者
C.治疗目的是软化大便
D.大便后肛门剧烈疼痛
E.可手术治疗
- 55.关于下肢静脉曲张的描述,下列哪项是错误的
A.主要发生在大隐静脉
B.曲张静脉易发生静脉炎
C.易并发小腿溃疡
D.易并发Buerger病
E.有恶变的可能
- 56.发生胸外伤时,纵膈摆动可发生在
A.张力性气胸
B.开放性气胸
C.闭合性气胸
D.损伤性血胸
E.多根肋骨骨折

- 57.体外循环手术后，一般几天可下床活动
 A.术后当天 B.术后 2~3d C.术后 3~5d
 D.术后 5~7d E.术后 10d
- 58.肾结核多发生在
 A.20~40 岁 B.20 岁以下 C.婴儿
 D.老年人 E.女性
- 59.新鲜性骨折的时间期限是伤后
 A.2d 内 B.3d 内 C.5d 内
 D.1 周内 E.2 周内
- 60.骨折表现最有诊断意义的是
 A.局部疼痛 B.局部肿胀 C.局部瘀血
 D.肢体活动障碍 E.假关节活动
- 61.颅底骨折忌耳鼻堵塞是为了
 A.降低颅内压 B.防止头疼 C.防止脑疝
 D.防止脑脊液流失 E.防止颅内继发感染
- 62.关于急诊室工作制度，哪项有错误
 A.有高度的责任感
 B.坚守岗位，如需离开，必须与有关人员联系
 C.各分科诊疗室用物整个急诊室共同使用
 D.严格查对，防差错事故发生
 E.做好急诊室的各项统计工作
- 63.肾损伤非手术治疗下列护理哪项是错误的
 A.定时观察生命体征 B.注意血尿情况 C.观察体温变化
 D.早期起床活动 E.注意腹痛的变化
- 64.患者，男，35 岁，右外踝软组织损伤半天，局部青紫，肿胀，目前应采取的措施是
 A.热湿敷 B.冰袋冷敷 C.红外线灯照射
 D.局部按摩 E.早期功能锻炼
- 65.心电—机械分离是指
 A.心脏停顿 B.心室停顿 E.心室颤动
 D.心房、心室肌完全失去电活动能力 E.缓慢而无效的心室自主节律
- 66.患者，男，56 岁，支气管哮喘发作，呼吸困难。此时护士应该协助其采取的体位是
 A.半坐卧位 B.端坐位 C.中凹卧位
 D.头高足低位 E.头低足高位
- 67.下列哪项不属于急性心功能不全临床上的表现
 A.休克 B.急性肺水肿 C.心源性晕厥
 D.心内膜炎 E.心搏骤停
- 68.地高辛用于治疗心力衰竭的主要药理作用是
 A.扩张冠状动脉 B.增强心肌收缩力 C.减轻心脏前负荷

- D.减少心律失常发生 E.降低心脏的传导性
- 69.毒物的体内过程，下列哪项描述是正确的
- A.毒物主要经两条途径而被吸收 B.皮肤吸收毒物一般较快
C.皮肤对脂溶性物质较难吸收 D.毒物在体内分布于体液和组织中
E.肾是毒物在体内代谢转化的主要场所
- 70.心肺脑复苏（CPR）ABC三个步骤中的“A”是指
- A.胸外心脏按压 B.人工呼吸 C.清理口腔污物
D.开放气道 E.头部降温
- 71.抢救时间的记录不包括
- A.患者到达的时间 B.医生到达的时间 C.抢救措施落实的时间
D.病情变化的时间 E.家属到达的时间
- 72.急性蜂窝织炎患者应用抗生素治疗，选择抗生素最理想的依据是
- A.感染发生部位 B.感染的严重程度 C.药物敏感试验结果
D.患者的抵抗力 E.病菌的类型
- 73.临产后主要的产力
- A.子宫收缩力 B.腹肌收缩力 C.膈肌收缩力
D.肛提肌收缩力 E.骨骼肌收缩力
- 74.慢性阻塞性肺气肿的病理改变不包括
- A.肺过度膨胀 B.外观苍白或灰白 C.镜检可见肺大泡
D.肺血供增多 E.弹力纤维网破坏
- 75.有关直肠肛管周围脓肿的叙述，错误的是
- A.多由肛腺或肛窦感染引起 B.肛门周围脓肿最多见
C.坐骨直肠窝脓肿很少见 D.骨盆直肠窝脓肿全身中毒症状明显
E.一旦脓肿形成应及时切开引流
- 76.对类风湿性关节炎的描述，不正确的是
- A.基本病变是滑膜炎 B.发病与自身免疫有关 C.有皮下结节示病情活动
D.类风湿因子为阳性 E.不引起脏器损害
- 77.心脏复苏首选的药物是
- A.阿托品 B.利多卡因 C.肾上腺素
D.异丙肾上腺素 E.氯化钙
- 78.患儿，2岁，诊断为动脉导管未闭。对该患儿做健康指导时，不妥的是
- A.建立合理的生活制度 B.充分运动，增强体质 C.合理营养，促进生长
D.预防呼吸道感染 E.指导定期复诊
- 79.患儿，男，10个月。3d前突然双眼上翻，面肌和四肢抽动急诊入院，诊断为维生素D缺乏性手足抽搦症。该患儿出院时，护士对家长进行健康指导最重要的内容是
- A.指导母乳喂养 B.提倡进行站立锻炼 C.多抱患儿到户外晒太阳
D.添加含维生素D的食物 E.处理惊厥和喉痉挛的方法
- 80.患者，男，70岁，因患肺癌行多次放疗护士进行皮肤护理正确的是

- A.保持皮肤清洁干燥 B.肥皂水清洗 C.热敷理疗
D.外用药物 E.按摩
- 81.马斯洛提出的管理理论是
A.科学管理理论 B.动机激励理论 C.管理过程理论
D.组织领导理论 E.人际关系理论
- 82.下列哪项是科学管理理论的内容
A.标准化原则 B.以人为中心的原则 C.民主
D.自由 E.鼓励下属参与
- 83.下列不属于动机激励理论范围的是
A.人类需要层次论 B.科学管理理论 C.双因素理论
D.强化理论 E.公平理论
- 84.做血气分析的血标本应放置于
A.干燥试管密封 B.无菌试管中密封 C.肝素抗凝注射器中密封
D.枸橼酸钠试管中密封 E.草酸钾抗凝试管中密封
- 85.患者，女，34岁，为左侧乳腺癌根治术后第2d，左上肢康复训练中正确的是
A.做转绳运动 B.手指爬墙运动 C.让患者左手洗脸、梳头
D.下床时用吊带托扶左上肢 E.扶住患者左上肢下床活动
- 86.人才智力结构中，能将智力结构转化为物质力量的因素是
A.观察力 B.想像力 C.记忆力
D.思考力 E.实践能力
- 87.卫生部规定普通病房空气中菌落总数不超过
A.2500cfu/m³ B.2500cfu/m² C.800cfu/m³
D.500cfu/m³ E.500cfu/m²
- 88.与效益原理相对应的原则是
A.能级原则 B.动力原则 C.价值原则
D.行为原则 E.弹性原则
- 89.下列哪种不属于交叉感染的途径
A.输液 B.胃镜检查 C.病历夹
D.输血 E.长期服用免疫抑制剂
- 90.患者，男，42岁，诊断高血压3年。性情温和，体态匀称。平时面食为主，饮食清淡，喜食咸菜等腌制食品。目前对其最主要的饮食护理指导是
A.低脂饮食 B.低磷饮食 C.低钠饮食
D.低蛋白饮食 E.低纤维素饮食
- 91.为使被试者的心理活动变化在自然情景中真实流露，应采取
A.连续性观察 B.轮换性观察 C.隐蔽性观察
D.重复性观察 E.实验性观察
- 92.被誉为“心理学之父”的人是
A.奥利维亚 B.冯特 C.希波克拉底

- D.马斯洛 E.克伦特尔
93. “入芝兰之室久而不闻其香”，这是感觉的
- A.不敏感现象 B.联觉现象 C.对比现象
- D.适应现象 E.选择现象
- 94.知觉的特性不包括
- A.选择性 B.恒常性 C.适应性
- D.理解性 E.整体性
- 95.短时记忆是指注意保持时间在
- A.2s 以内 B.1min C.1h
- D.1d E.1 周
96. “忧者见之则忧，喜者见之则喜”指的是一种
- A.心境 B.激情 C.情感
- D.应激 E.喜怒无常
- 97.个性心理特征
- A.能力、气质、想像 B.气质、性格、记忆 C.能力、气质、情绪
- D.能力、气质、性格 E.能力、性格、情绪
- 98.下列关于气质的说法哪项是错误的
- A.气质体现的是个体活动的风格 B.气质是个体心理活动稳定的动力特征
- C.气质受先天性因素的制约 D.气质具有很大的稳定性
- E.气质是固定不变的
- 99.下列关于应激的说法哪项不正确
- A.应激包括刺激、认知评价.反应三个环节 B.应激表现为一种紧张状态
- C.应激对个体身心健康有害 D.应激是一种特殊的情绪状态
- E.在日常生活中应激是不可避免的
- 100.SCL-90 测验主要测评
- A.智力 B.性格 C.气质
- D.心理健康 E.人际能力