

历年真题试卷（十三）

一、单项选择题（每一考题下面有 A、B、C、D、E 五个备选答案，请从中选择一个最佳答案，每题 1.5 分，共 180 分）。

- 1.最早提出护理程序的护理专家是
A.E.Wiedenbach B.L.V.Bertalanffy C.Roy
D.L.Hall E.D.Johson
- 2.个人价值观或人生目标出现挫折，自尊心受到威胁或伤害时的过激反应称为
A.焦虑 B.恐惧 C.抑郁
D.愤怒 E.敌意
- 3.自我概念的组成不包括
A.自我形象 B.角色表现 C.自我特征
D.自尊 E.身体心象
- 4.使用青霉素的患者，如再次使用同批号的青霉素药物注射时，免做过敏试验要求间断时间不超过
A.1d B.2d C.3d
D.4d E.5d
- 5.无菌操作中取无菌溶液时不必
A.检查瓶口有无裂缝 B.检查瓶盖有无松动 C.核对瓶签上溶液名称、浓度、有效期
D.注意有无配伍禁忌 E.检查无菌溶液有无沉淀、浑浊或变色
- 6.临终患者的最早心理反应期是
A.愤怒期 B.否认期 C.协议期
D.接受期 E.忧郁期
- 7.李某，女，45 岁。因胃溃疡大出血入院，医嘱输血 200ml，当输到 15ml 左右时，患者诉头痛、四肢麻木、腰背剧痛，护士立即采取措施，处理不妥的是
A.立即停止输血，与医生联系 B.采集血标本重新做血型鉴定
C.静脉注射葡萄糖酸钙 10ml D.安慰患者，避免心理紧张
E.双侧腰部封闭并热敷
- 8.根据纽曼的健康系统模式，下列哪项属于人际压力源
A.失业 B.压力 C.失血
D.与同事关系紧张 E.失眠
- 9.纽曼系统模式认为抵抗防线的功能是
A.缓冲和过滤作用 B.保护正常防线的完整 C.位于最外层，首先抵御压力源
D.维持机体基本结构正常 E.是机体防御系统的主体
- 10.尿液中加入浓盐酸用于何种检查时的防腐
A.内分泌检查 B.肌酐、肌酸 C.爱迪氏计数
D.尿蛋白定量 E.尿素、尿酸
- 11.判断心跳停止，触动大动脉搏动的时间应为

- A.1~3s B.4~9s C.10s
D.15s E.20s
12. 护士小李在检查药柜时，发现下列药物的保管措施有一项是错误的
- A. 盐酸肾上腺素在盒内用黑纸遮盖 B. 氨茶碱片装在有色密封瓶内
C. 糖衣片装在密封瓶内，盖紧 D. 乙醇装在玻璃瓶内，盖紧
E. 乙肝疫苗装在塑料盒内
13. 患者，女，48岁。下班后感到心慌，数脉搏时发现两个正常的搏动后出现一次过早的搏动。此脉搏是
- A. 二联律 B. 三联律 C. 脉搏异常
D. 间歇脉 E. 脉搏短绌
14. 患者刘某，男，30岁。上午8时在硬膜外麻醉下行阑尾切除术，上午11时回病房，术后一般情况良好、血压平稳，下午6时患者主诉伤口疼痛难忍，医嘱：哌替啶 50mg im q6h prn。此医嘱属于
- A. 长期医嘱 B. 长期备用医嘱 C. 临时医嘱
D. 临时备用医嘱 E. 即刻执行的医嘱
15. 护理活动的行动指南是
- A. 估计阶段 B. 计划阶段 C. 实施阶段
D. 评价阶段 E. 反馈阶段
16. 目前医院内感染的研究对象主要是
- A. 住院患者 B. 工作人员 C. 陪护人员
D. 探视人员 E. 门诊患者
17. 青霉素过敏试验可疑阳性患者作对照试验宜选择
- A. 利多卡因 B. 5%葡萄糖溶液 C. 注射用水
D. 0.9%氯化钠溶液 E. 5%葡萄糖盐水
18. 下列哪项不是促进患者休息的护理措施
- A. 尊重患者的休息习惯 B. 做好心理护理，解除患者焦虑
C. 各种诊疗护理活动相对集中 D. 协助患者自我放松
E. 满足患者一切要求
19. 下列哪个区域是传染病区的半污染区
- A. 病室内走廊及病区化验室 B. 治疗室、库房
C. 病房、厕所 D. 浴室、洗涤间
E. 配餐室、值班室
20. 李某，女，患风湿性心脏病，心力衰竭住院，护士应如何为患者安排床位
- A. 安排在观察室 B. 安排在患者多的大病房 C. 可随意选择床位
D. 安排在隔离室 E. 安排在离护士站较近的小病房
21. 患者李某，男，60岁。3周前因脑血管意外导致左侧肢体瘫痪。患者神志清楚，说话口齿不清，体质虚弱，生活完全不能自理，不能参加活动。护士为该患者制定的下列护理措施

哪项是错误的

- A.应该给患者使用垂足板
B.扶住患者下床时允许其身体前仰或后倒
C.该患者可能需要使用助行器
D.护士定期为该患者做全范围关节运动
E.鼓励患者尽早参加日常活动
- 22.患者在生病之后担心影响学习和考试,表现为烦躁不安、茫然、悲伤,这种情况属于
A.患者角色缺如
B.患者角色强化
C.患者角色冲突
D.患者角色消退
E.患者角色适应
- 23.对少数民族患者进行护理时,尤应注意帮助其
A.社会适应
B.代偿适应
C.文化适应
D.心理适应
E.技术适应
- 24.护理诊断所具有的最显著特点是
A.从心理社会角度考虑问题
B.对疾病本质的诊断
C.从生物学角度考虑问题
D.主要考虑患者的病理生理变化
E.能通过护理措施减轻和解决问题
- 25.当你值班时,一名急性左心衰患者入院,你首要的任务是
A.准备好急救器材和药品,配合医生进行抢救
B.进行入院护理评估,制定护理计划
C.向患者进行自我介绍
D.填写入院登记本、诊断卡和床头卡
E.进行入院指导和健康宣教
- 26.当患者听到自己患不治之症,他们会四处求医,抱着侥幸心理,希望是误诊,属于
A.否认期
B.愤怒期
C.协议期
D.忧郁期
E.接受期
- 27.患者林某,男,76岁,肝癌,病情日趋恶化,患者徒感悲伤,要求见一些亲朋好友,并急于交代后事,请问此临终患者心理反应属于
A.否认期
B.愤怒期
C.协议期
D.忧郁期
E.接受期
- 28.为患者进行吸痰时不妥的是
A.调节负压成人 40~53.3kPa
B.检查口鼻腔,取出活动义齿
C.插管时应打开负压
D.每次吸痰时间<15s
E.痰液黏稠者可配合蒸汽或雾化吸入
- 29.患者,男,36岁,因交通意外导致脊柱骨折,下肢瘫痪,大小便失禁,为保持外阴清洁,拟行留置导尿管。导尿时,应为患者准备的体位是
A.膝胸卧位
B.截石卧位
C.头低脚高位
D.仰卧屈膝位
E.左侧卧位
- 30.关于患者的权利不正确的是
A.知情同意
B.隐私保密
C.投诉

- D.自我保健 E.自由选择
- 31.帮助患者进行放松训练缓解压力的最简单的方法是
- A.深呼吸训练 B.听音乐 C.渐进性肌肉放松训练
- D.引导想象放松训练 E.言语想象放松训练
- 32.关于特级护理的内容不正确的是
- A.每 15~30min 观察病情及生命体征 B.安排专人 24h 护理
- C.制定护理计划,严格执行,准确记录 D.备好急救所需药品和用物
- E.做好基础护理,严防并发症,确保患者安全
- 33.支气管哮喘急性发作的患者适合的卧位是
- A.侧卧位 B.仰卧位 C.半坐卧位
- D.头高脚低位 E.端坐位
- 34.当患者输入大量库存血后容易出现
- A.高血钾 B.低血钙 C.低血钠
- D.高血钠 E.高血铁
- 35.患者,男,32岁。因与妻子闹纠纷,产生轻生念头,服大量毒药,药名不详,现患者处于昏迷状态,为该患者进行洗胃时首先应
- A.立即灌入洗胃液进行洗胃 B.问患者服的是什么毒药
- C.抽取胃内容物立即送检 D.灌入牛奶
- E.灌入蛋清水
- 36.在制定护理计划中,预期目标陈述的是
- A.在护理活动所应达到的程度 B.家属对患者的支持程度
- C.患者健康状况所应达到的程度 D.患者所希望得到的结果
- E.护理人员所希望得到的结果
- 37.肺癌患者出现声音嘶哑,应考虑
- A.压迫食管 B.压迫颈交感神经 C.压迫喉返神经
- D.压迫膈神经 E.压迫上腔神经
- 38.左心功能不全最严重的表现是
- A.心悸、气短 B.咳嗽、咳痰增多 C.肺水肿
- D.夜间阵发性呼吸困难 E.心律失常
- 39.关于对慢性特发性血小板减少性紫癜行护理评估,叙述正确的是
- A.病程呈自限性 B.好发于儿童 C.皮下血肿多见
- D.血小板常 $<20 \times 10^9/L$ E.骨髓粒细胞增多
- 40.脑出血和蛛网膜下腔出血的重要区别点为
- A.昏迷程度 B.有无高血压 C.有无定位性体征
- D.起病速度 E.有无脑疝形成
- 41.伤寒最严重的并发症是
- A.肠结核 B.肠穿孔 C.伤寒性肝炎
- D.伤寒性心肌炎 E.便秘

- 42.关于血液病出血倾向的护理措施中，错误的是
 A.保持衣服轻软 B.避免皮肤摩擦 C.可行局部冷敷
 D.高维生素饮食 E.深部肌肉注射
- 43.呼吸衰竭的治疗主要在于
 A.治疗原发病 B.祛除诱因 C.支持疗法
 D.纠正缺氧和二氧化碳潴留 E.纠正酸碱平衡失调
- 44.患者何某，男，30岁。因两年前胃溃疡做过“胃切除”，近半年来经常头晕、心悸，体力逐渐下降，诊断为缺铁性贫血，给口服10%枸橼酸铁胺和稀盐酸治疗，下列有关口服铁剂的护理中哪项错误
 A.血红蛋白恢复正常后，仍应坚持治疗数月 B.禁饮茶 C.需用吸管服用
 D.如有消化道反应，可与牛奶同服 E.应按剂量、按疗程服用
- 45.肝性脑病患者应当
 A.供给足量的热能与蛋白质 B.给予足量脂肪以提供热能
 C.供给足量的糖和钠盐 D.每天给水不少于2500ml
 E.给予足量的碳水化合物
- 46.有关急性心肌梗死发生心律失常的处理，下列哪组不正确
 A.室性早搏—利多卡因 B.室颤—非同步直流电除颤
 C.阵发室速—洋地黄 D.窦性心动过缓—阿托品
 E.三度房室传导阻滞—安装心脏起搏器
- 47.多尿是指
 A.尿量>3000ml/d B.尿量<400ml/d C.尿量<100ml/d
 D.尿量>2500ml/d E.尿量<10ml/d
- 48.2型糖尿病时，经速效胰岛素治疗，尿糖转为阴性后突然昏迷，应首先考虑为
 A.低血糖反应 B.高渗性昏迷 C.酮症酸中毒
 D.癫痫发作 E.血管病变致脑出血
- 49.70%类风湿关节炎患者可出现
 A.类风湿因子阳性 B.抗核抗体阳性 C.抗双链DNA抗体
 D.LE细胞 E.抗Sm抗体阴性
- 50.急性多发性神经根神经炎的首发症状通常为
 A.呼吸困难 B.四肢远端对称性无力 C.吞咽困难
 D.双侧周围性面瘫 E.排尿困难
- 51.原发性肺结核的原发病灶自然演变过程中最常见的是
 A.自行钙化或吸收 B.发展为肺门淋巴结核 C.发展为胸膜炎
 D.病灶坏死溶解形成空洞 E.血行播散
- 52.关于消化性溃疡患者的饮食，哪些是不妥的
 A.饮食应定时定量，避免过饱过饥 B.避免粗糙、过冷、过热和刺激大的食物
 C.避免急食，多加咀嚼，以增加唾液分泌 D.饥饿时疼痛，在餐间应加一定量零食

- E.在发作的急性期，可少量多餐
- 53.下列哪项可确诊糖尿病
- A.症状+随机血糖 $\geq 11.1\text{mmol/L}$
 B.症状+空腹血糖 $\geq 7.8\text{mmol/L}$
 C.1h 血糖 $\geq 11.1\text{mmol/L}$
 D.随机血糖 $\geq 11.1\text{mmol/L}$;空腹血糖 $\geq 7.8\text{mmol/L}$
 E.2h 血糖 11.1mmol/L
- 54.引起右心室负荷增加的疾病为
- A.主动脉瓣关闭不全 B.二尖瓣狭窄 C.三尖瓣关闭不全
 D.房间隔缺损 E.阻塞性肺气肿
- 55.白血病患者的健康指导不正确的是
- A.指导患者加强营养 B.向患者说明坚持用药的重要性
 C.向患者解释化疗的不良反应 D.指导患者定期复查血象
 E.若化疗药漏于皮下应立即用普鲁卡因局部封闭
- 56.能较早提示左心功能不全失代偿的依据是
- A.心动过速 B.心脏扩大 C.心肌肥厚
 D.夜尿增多 E.劳力性呼吸困难
- 57.呼吸衰竭时出现的电解质紊乱少见的类型是
- A.高钾血症 B.低钾血症 C.低钠血症
 D.低氯血症 E.高钙血症
- 58.反复发作的短暂脑缺血发作将会导致下列何种结果
- A.脑出血 B.蛛网膜下腔出血 C.脑梗塞
 D.脑膜炎 E.脑栓塞
- 59.伴高血压的支气管哮喘发作时，首选药物是
- A.舒喘灵 B.糖皮质激素 C.肾上腺素
 D.异丙肾上腺素 E.麻黄碱
- 60.下列哪一项是气肿型阻塞性肺气肿的临床表现
- A.多见于青年 B.有发绀 C.气促明显，多为持续性
 D.桶状胸不明显 E.呼吸音正常
- 61.预防夜间阵发性呼吸困难发作，主要的护理措施是
- A.保持安静，减少声、光刺激 B.夜间继续吸氧
 C.夜间睡眠应保持半卧位 D.睡前给少量镇静药
 E.注意保暖
- 62.大咯血窒息的患者，应立即采取
- A.头低脚高位 B.半卧位 C.平卧位
 D.坐位 E.健侧卧位
- 63.典型支气管哮喘发作时，最主要的临床表现是
- A.带哮鸣音的吸气性呼吸困难及双肺哮鸣音

- B.带哮鸣音的呼气性呼吸困难及双肺哮鸣音
C.带哮鸣音的混合性呼吸困难及双肺哮鸣音
D.带哮鸣音的混合性呼吸困难及粉红色泡沫痰
E.带哮鸣音的混合性呼吸困难及咯血
- 64.患者刘某，男，20岁。支气管哮喘突然出现胸痛、气急、极度呼吸困难、大汗、烦躁不安。左侧肺部哮鸣音消失，应考虑并发
- A.自发性气胸 B.支气管哮喘急性发作
C.左心衰竭
D.肺炎 E.胸膜炎
- 65.慢性阻塞性肺疾病，鼓励加强腹式呼吸的原因是
- A.增加肺泡张力 B.有利于痰液的咳出 C.扩大呼吸幅度，增加肺泡通气量
D.间接增加肋间肌活动度 E.借助腹肌进行呼吸
- 66.慢性肺心病，肺、心功能失代偿期，临床最突出的表现是
- A.右心衰竭 B.左心衰竭 C.呼吸衰竭
D.呼吸困难 E.喘息
- 67.以下哪项疼痛的特点不符合心绞痛的特征
- A.部位为心前区或左上腹 B.疼痛性质为绞痛或烧灼感
C.休息或停止诱发因素可缓解 D.深吸气可缓解
E.含服硝酸甘油有效
- 68.左心衰竭的基本表现是
- A.腹水 B.呼吸困难 C.下肢水肿
D.胸痛 E.胸腔积液
- 69.抢救急性肺水肿的患者吸氧时，湿化瓶内乙醇的浓度为
- A.10%~20% B.20%~30% C.30%~50%
D.40%~60% E.60%~70%
- 70.一旦发现心脏骤停，应立即进行
- A.口对口人工呼吸 B.心前区叩击 C.胸外心脏按摩
D.心腔内注射肾上腺素 E.保持呼吸道通畅
- 71.中止室上心动过速的首选方法是
- A.刺激迷走神经 B.心脏电复律 C.射频消融
D.静脉注射利多卡因 E.静脉注射异搏定
- 72.患者，男，56岁，因心房纤颤住院，心率108次/分，心音强弱不等，心率不规则，脉搏弱且不规则。此时应如何准确观察脉搏与心率
- A.先测心率、后测脉搏 B.先测脉率、后测心率
C.两人分别测脉率和心率，但应同时起止
D.两人分别测脉率 E.两人分别测脉率和心率
- 73.风湿性心瓣膜病最常侵犯的瓣膜是
- A.主动脉瓣 B.二尖瓣 C.肺动脉瓣
D.三尖瓣 E.二尖瓣+主动脉瓣

- 74.风湿性心脏病患者保持适当活动的益处下列哪项除外
- A.可防止双下肢静脉血栓形成 B.延缓瓣膜进一步损害
C.增加冠状动脉侧支循环 D.防止便秘
E.增强机体抵抗力
- 75.二尖瓣狭窄最有诊断价值的体征为
- A.二尖瓣面容 B.左心界扩大 C.心尖区舒张期杂音
D.两肺湿性啰音 E.肺动脉瓣区第二心音亢进
- 76.急性心肌梗死一般多长时间内禁用洋地黄类药物
- A.2h B.24h C.6h
D.48h E.12h
- 77.患者，男，17岁，因心悸、胸闷1个月余入院。患者既往健康，一个半月前有感冒、发热病史。心电图示频发室性早搏，实验室检查示病毒中和抗体效价明显增高，该患者的诊断为
- A.病毒性心肌炎 B.扩张型心肌炎 C.心律失常
D.心包炎 E.心肌梗死
- 78.患者刘某，因乏力、心前区不适入院。诊断为病毒性心肌炎，经对症支持治疗好后准备出院，出院指导中不正确的是
- A.继续休息，避免劳累，3~6个月后方可考虑恢复部分或全部轻体力工作
B.适当锻炼身体以增强抵抗力
C.避免感冒，预防呼吸道感染
D.出院后只要无明显症状，即可参加轻体力工作
E.发现有胸闷、心悸等不适及时就诊
- 79.上消化道出血特征性的临床表现是
- A.发热 B.呕血，黑便 C.急性周围循环衰竭
D.肠源性氮质血症 E.贫血
- 80.慢性胃炎的发病可能与哪种细菌有关
- A.嗜盐杆菌 B.空肠弯曲菌 C.幽门螺杆菌
D.沙门菌 E.大肠埃希菌
- 81.消化性溃疡疼痛节律性消失可能是
- A.出血 B.幽门梗阻 C.癌变
D.胃底静脉破裂 E.穿孔
- 82.消化性溃疡患者服用酸剂宜在
- A.两餐之间 B.餐前1h C.饭后1h
D.每日清晨1次 E.进餐时与食物同服
- 83.对消化性溃疡大出血患者护理措施不包括
- A.迅速建立静脉通道 B.暂禁食 C.观察粪便颜色及量
D.立即应用双气囊三腔管 E.冰盐水洗胃
- 84.提示溃疡病穿孔最有价值的体征是

- A.上腹部疼痛加剧 B.腹肌紧张 C.休克征象
D.肝浊音界消失 E.疼痛节律性消失
- 85.患儿，2岁，急性上呼吸道感染，体温39°C，因全身抽搐就诊。为明确抽搐原因，在收集患儿健康史时，应重点询问
- A.出生史 B.喂养史 C.家族史
D.过敏史 E.既往发作史
- 86.在急性肠梗阻的保守治疗过程中，关键性措施是
- A.胃肠减压 B.纠正水、电解质酸碱平衡失调
C.缓解肠痉挛性疼痛 D.输血 E.抗生素应用
- 87.诊断原发性肝癌主要靠
- A.有慢性肝炎或肝硬化病史 B.有脂肪肝病史
C.肝功能检查 D.甲胎蛋白升高+B超检查
E.肝脏肿大伴压痛
- 88.患者，男，30岁。劳动时不慎摔伤，骑跨在树干上，会阴部受伤，伤后排尿困难及尿潴留，会阴部及阴囊肿胀，瘀斑伴剧痛，可能性最大的诊断是
- A.会阴部软组织损伤 B.尿道球部损伤 C.尿道膜部损伤
D.膀胱破裂 E.盆骨骨折
- 89.容易发生急性肾衰竭的软组织损伤是
- A.裂伤 B.挫伤 C.扭伤
D.严重挤压伤 E.闭合性骨折
- 90.一严重胸外伤、呼吸困难、休克、颌面部骨折的患者保持呼吸道通畅的最佳急救措施为下列哪一条
- A.气管切开 B.气管插管 C.口腔安放通气道
D.环甲膜穿刺或切开 E.人工呼吸
- 91.下列代谢性酸中毒的常见原因中，哪项是错误的
- A.急性腹膜炎 B.休克 C.长期禁食
D.长期反复呕吐 E.急性肾衰竭
- 92.甲状腺功能亢进患者脉压增大的主要原因是
- A.情绪紧张 B.收缩压升高 C.舒张压降低
D.心率增快 E.周围血管阻力增高
- 93.关于脾破裂的处理下列哪项是不正确的
- A.行脾切除术 B.行脾缝合修补术 C.待失血性休克好转后手术
D.可收集腹腔内出血，行自身输血 E.白细胞计数多升高
- 94.中毒型细菌性痢疾的传播途径是
- A.血液 B.消化道 C.呼吸道
D.皮肤接触 E.昆虫媒介
- 95.肌力测定的分级描述中错误的是
- A.1级：肌完全不能收缩，为完全瘫痪

- B.2级：肌收缩可使关节活动，但不能对抗重力
C.3级：肌仅有抗重力，无抗阻力收缩
D.4级：肌有抗重力和抗阻力收缩
E.5级：肌有对抗强阻力收缩
- 96.胆道T管引流期间，观察胆汁性状正常的是
A.胆汁稀薄且颜色淡黄 B.胆汁清晰呈黄绿色 C.胆汁混有泥沙样沉淀
D.胆汁浑浊呈淡黄色 E.胆汁黄色有絮状沉淀
- 97.下列哪一项不是外科感染使用抗菌药物的原则
A.在可以不联合用药时尽量不联合用药
B.用药时首先考虑使用广谱抗生素
C.在严重感染时使用大量杀菌性抗生素
D.对于致病菌不明确的严重感染可以联合用药
E.根据药敏试验或细菌培养结果使用抗生素
- 98.化脓性指头炎切开引流的指征为
A.手指明显肿胀 B.有波动感 C.波动性疼痛
D.手指功能障碍 E.穿刺抽到脓液
- 99.诊断乳房深部脓肿主要依据是
A.乳房红、肿、热、痛 B.全身发热，乳房压痛 C.超声波检查提示液平段
D.穿刺抽得脓液 E.局部检查有波动感
- 100.诊断溃疡病急性穿孔最有意义的是
A.溃疡病史 B.突起脐周剧痛，转移至右下腹 C.腹痛剧烈
D.膈下游离气体 E.腹部剧痛数小时后缓解，提示病情好转
- 101.风湿性心脏病根本的治疗措施是
A.抗感染 B.抗心衰 C.抗风湿
D.外科手术 E.介入治疗
- 102.一名前臂骨折患者，经手法复位，小夹板固定5h后，感觉剧痛，手指麻木、肿胀、活动不灵，考虑其原因为
A.神经损伤 B.神经受压和静脉受压 C.动脉受压和静脉受压
D.静脉受压 E.动脉损伤
- 103.急性肾衰竭少尿期造成患者死亡的常见电解质失衡是
A.高磷血症和低钙血症 B.低钠血症 C.低氯血症
D.高镁血症 E.高钾血症
- 104.患者，男，68岁。两年前开始出现尿频，夜间明显，随后出现排尿费力，逐渐加重，近半年来尿频明显，并有尿急、尿痛，肉眼血尿，有时有尿流中断现象，应首先考虑为
A.膀胱肿瘤 B.尿道狭窄合并肾结核 C.前列腺增生
D.慢性细菌性膀胱炎合并膀胱结石 E.前列腺增生合并膀胱结石
- 105.甲状腺功能亢进症术前准备通常不包括
A.T₃、T₄测定 B.喉镜检查 C.控制心率

- D.给予氢化可的松 E.测基础代谢率
- 106.患者，女，26岁。首次妊娠2个月合并甲亢，甲状腺较大，有轻度呼吸困难，应行下列哪项治疗
- A.抗甲状腺药物治疗 B.甲状腺大部切除术 C.终止妊娠+抗甲状腺药物治疗
D.终止妊娠+手术治疗 E.终止妊娠+¹³¹I治疗
- 107.有以下哪一项表现时，初步诊断不考虑为腹部闭合性损伤并发腹内脏器损伤
- A.早期出现休克征象 B.持续性剧烈腹痛 C.有明显的腹膜刺激症状
D.有昏迷-清醒-再昏迷 E.有移动性浊音
- 108.患儿，男，4岁，以病毒性脑膜炎入院。经积极治疗，除右侧肢体仍活动不利，其他临床症状明显好转，家长要求回家休养，护士为其进行出院指导，不妥的是
- A.给予高热量、高蛋白、高维生素饮食 B.患侧肢体保持功能位，尽量减少活动
C.指导用药的注意事项 D.保持患儿心情舒畅 E.指导定期随访
- 109.骨折血肿机化演进期大约需要
- A.3d B.5d C.1周
D.2周 E.3周
- 110.急性肾衰竭少尿、无尿期急需防治的电解质失调是
- A.低血钠 B.低血钙 C.高血镁
D.高血钾 E.低血钾
- 111.患者，男，27岁。体质瘦弱，右腰部被汽车撞伤后出现肉眼血尿，血压为14/9kPa，脉搏为100次/分，右腰部明显肿胀，压痛及肌紧张存在，且伤后肿胀范围逐渐增大，最有可能为
- A.肾实质挫伤 B.肾盂部分裂伤 C.肾横断裂伤
D.肾蒂血管损伤 E.输尿管损伤
- 112.患者，男，70岁，腹股沟三角突出半球形包块，易还纳，未进入阴囊，不透光，主要考虑为
- A.鞘膜积液 B.隐睾 C.股疝
D.斜疝 E.直疝
- 113.关于乳房肿块的叙述，下列哪项是正确的
- A.乳头溢液为无色液，是乳房囊性增生病
B.乳房内结节大小不等、坚韧、轻压痛是乳管内乳头状瘤
C.乳房内实质性肿块，生长快，轻刺痛、活动差是乳房纤维腺瘤
D.皮肤“橘皮样”改变是乳癌重要体征之一
E.超声波检查为实质性肿块，提示恶性肿瘤
- 114.急性腹膜炎提示病情恶化的重要指征是
- A.腹胀加重 B.腹痛加重 C.呕吐频繁
D.肛门停止排气 E.肠鸣音亢进
- 115.外科治疗门静脉高压症最主要的目的是
- A.减轻肝性脑病 B.纠正血小板减少 C.预防腹水并发感染

- D.防治食管胃底静脉破裂出血 E.治疗顽固性腹水
- 116.一颈部软组织刀割伤患者，受伤时间已达 12h，伤口长 6cm，无血管神经损伤。处理应
A.清创后一期缝合 B.按感染伤口处理 C.清创后延期缝合
D.加压包扎 E.冲洗消毒后缝合
- 117.患者，男，67 岁，肺源性心脏病急性加重期。血气分析：pH7.25，PaCO₂9.3kPa，HCO₃⁻30mmol/L。对其酸碱失衡的治疗措施应为
A.静脉滴注 5%碳酸氢钠 B.静脉滴注盐酸精氨酸 C.给予利尿剂
D.补充氯化钾 E.改善通气功能
- 118.下列哪一项不是肠外营养的并发症
A.气胸 B.高或低血糖 C.电解质紊乱
D.切口难以愈合 E.微量元素缺乏
- 119.肩关节脱位的表现中不正确的是
A.肩部外伤史 B.方肩畸形 C.关节盂空虚
D.Thomas 征 (+) E.Dugas 征 (+)
- 120.患者，男，30 岁。因溃疡病大出血，输入库存血 1500ml，发现呼吸深快，有烂苹果味，皮肤青紫，血压为 90/75mmHg。实验室检查：血清钾为 7.0mmol/L，钠为 135mmol/L，动脉血 pH 为 7.2，血浆 HCO₃⁻为 17mmol/L。该患者电解质失衡诊断为
A.低钾血症 B.低钠血症 C.高钾血症
D.高钙血症 E.高钠血症

二、多项选择题（每一考题下面有 A、B、C、D、E 五个备选答案，请从中选择两个或两个以上的最佳答案，多选、漏选、错选均不得分，每题 2 分，共 60 分）。

- 1.根据西方对护理学知识体系的认识，护理学的概念和知识应包括
A.伦理学知识 B.医学基础知识 C.美学知识
D.个人知识 E.科学知识
- 2.为昏迷患者做口腔护理时应
A.擦拭口腔后要漱口
B.使用开口器时应从白齿放入
C.擦洗口腔时血管钳夹紧棉球，一次只能用一个
D.棉球不可过湿，以免溶液吸入气道
E.将义齿取下
- 3.纽曼发展了独特的护理工作步骤包括
A.护理诊断 B.护理计划 C.护理目标
D.护理结果 E.护理评价
- 4.护患关系的特征包括
A.专业性 B.时限性 C.单向性
D.协作性 E.利益性
- 5.护理诊断的结构包括

- A.潜在的健康问题 B.现有的健康问题 C.问题产生的原因
D.与问题产生有关的症状和体征 E.潜在问题的症状和体征
- 6.以下哪些属于对患者活动能力的评估内容
A.年龄 B.心肺功能状态 C.骨骼肌肉的状态
D.排泄功能 E.患者目前的患病情况
- 7.贯穿于护理程序全过程的是
A.护理评估 B.护理诊断 C.护理计划
D.护理实施 E.护理评价
- 8.助患者翻身，符合要求的是
A.为输液患者翻身，翻身后检查导管是否通畅
B.为牵引患者翻身，不放松牵引
C.为手术患者翻身，翻身后检查更换辅料
D.翻身间隔时间以 4h 为宜
E.给颅脑手术后患者翻身，头部不卧于患侧
- 9.为了促进有效沟通，在选择沟通方式及语言上应把握的原则包括
A.简介清晰 B.深入浅出 C.开诚布公
D.实事求是 E.强调意义
- 10.护理血液透析患者应注意观察
A.卧床休息至血压稳定为止
B.保持瘘管血流通畅
C.防止外瘘管脱出造成大出血
D.使用肝素时，应特别注意穿刺部位的出血倾向
E.外瘘管有无感染征象
- 11.内分泌疾病患者常有精神方面的异常，与之相关的因素可能有
A.大多数患者需终生治疗 B.自我形象的变异 C.生殖功能异常
D.激素昼夜节律变更 E.激素反馈调节失控
- 12.肾盂肾炎患者的护理诊断有
A.排尿异常 B.体温过高 C.体液不足
D.知识缺乏 E.潜在并发症-慢性肾功能不全
- 13.咯血致窒息的护理措施是
A.置患者于头低足高位，轻拍背部以利于血块排出
B.清除口、鼻腔内血凝块，或迅速用鼻导管接吸引器插入气管内抽吸
C.必要时立即行气管插管或气管镜直视下吸取血块
D.患者自主呼吸未恢复时，应行人工呼吸，给高流量吸氧
E.需密切观察病情变化，检测血气分析和凝血机制
- 14.关于血液系统疾病患者的发热，描述正确的有
A.多见于急性白血病、淋巴瘤、再障等患者 B.常可发展为高热，难以控制
C.常由于成熟粒细胞减少导致感染所致 D.物理降温为主，必要时可用药物降温

- E.控制感染是治愈发热的主要手段
- 15.心房纤颤时心电图表现可有
- A.P波消失代之以F波 B.P波消失代之以颤动波
C.R-R间期绝对不规则 D.QRS波群形态与正常大多数相同
E.R-R间期相等
- 16.对肝硬化患者的健康教育下列正确的是
- A.避免刺激性食物 B.可以饮少量啤酒 C.定期门诊复查
D.低盐饮食 E.避免罐头食品
- 17.患者徐某,20年前患急性黄疸性肝炎,近5年右上腹胀痛诊断为肝硬化,近两天出现大量腹水,其护理措施是
- A.准确记录每日出入量 B.定期测量腹围 C.尽快放出腹水减压
D.指导患者取半卧位 E.按医嘱给予利尿剂
- 18.患者,女,27岁,有反复发作尿频、尿急、尿痛史,肾区叩击痛(+).下列保健指导正确的是
- A.多饮水 B.保持大便通畅 C.保持外阴清洁
D.禁用盆浴 E.经常预防性服用抗菌药物
- 19.急性肾盂肾炎患者的护理诊断及合作性问题包括
- A.体温过高 B.知识缺乏 C.疼痛
D.体液过多 E.排尿异常
- 20.骨髓穿刺前后,护士所做的准备有
- A.术后平卧4h B.嘱患者侧卧位,选髂前上棘为穿刺点 C.做普鲁卡因皮试
D.穿刺当日嘱患者不要沐浴 E.观察穿刺部位有无出血
- 21.环磷酰胺的不良反应是
- A.胃肠道反应 B.脱发 C.心脏损害
D.出血性膀胱炎 E.骨髓抑制
- 22.清创术的目的在于
- A.使污染伤口转变为清洁伤口 B.除去伤口内的污染物
C.切除少量皮肤以利于引流 D.清除失去活力的组织
E.避免使用抗生素
- 23.骨折石膏固定后特有的并发症是
- A.远端肢体肿胀 B.缺血性肌挛缩 C.压迫性溃疡
D.开放性伤口感染 E.皮肤糜烂、水疱
- 24.全身麻醉患者喉头发出鼾声,应考虑为
- A.吸入呕吐物 B.胃内容物返流 C.舌后坠
D.喉痉挛 E.气管分泌物过多
- 25.术后患者的体位正确的有
- A.脊柱手术后取仰卧位 B.颈、胸、腹部手术后取半卧位

- C.臀部手术后取坐位
D.四肢手术后平卧，患肢抬高
E.不论何种卧位应舒适安全
- 26.关于器官移植的排斥现象，下列哪些是正确的
A.排斥反应加重时器官血流增加
B.异体移植发生排斥反应多于术后 14d 内出现
C.淋巴细胞是与排斥反应相关的主要细胞
D.排斥反应的特点是移植器官被大量炎症细胞浸润
E.对移植物的慢性排斥反应不能通过血清传递
- 27.颅脑外伤后引起躁动不安的因素有
A.脑水肿
B.颅内血肿
C.尿潴留
D.卧姿不适
E.脑疝
- 28.紫绀型心脏病喜“蹲踞”的机制是
A.患者自觉不适，“蹲踞”使症状得以改善
B.增加外周阻力，减少右向左分流
C.右向左分流减少，氧合血流量增加，机体缺氧情况改善
D.患者习惯性动作
E.紫绀型心脏病的特有体征
- 29.患者做完膀胱镜检查回病房后，护士应
A.限制液体摄入 12h
B.保证绝对卧床休息 12h
C.灌肠
D.监测尿量和颜色
E.大量饮水
- 30.脾切除术后导致肠系膜血栓形成，可能出现的症状是
A.腹胀
B.腹痛
C.腹泻
D.血便
E.黏液便

三、问答题（每题 20 分，共 60 分）

1.患者钟某，70 岁。昨天因情绪激动后突然意识丧失，大小便失禁，被送入医院进行抢救。查：体温为 37°C，脉搏为 90 次/分，血压为 180/100mmHg。听诊：心音规律，呼吸不规则，鼾声呼吸，意识完全丧失，对各种刺激均无反应，请你根据上述情况判断：

- (1) 可能的医疗诊断是什么？（2 分）
- (2) 请提出至少 5 个护理诊断。（10 分）
- (3) 你应如何加强临床基础护理？（8 分）

2.患者，男，34 岁。4 年来上腹隐痛伴反酸，嗝气，腹胀满，尤餐后加重，时有恶心，呕吐，呕吐物为胃内容物及黄绿苦水，胸骨后不适，有烧灼感，间断出现黑便，服用制酸药后症状缓解，未介意，体重未减轻，无发冷、发热。护理体检：一般状态佳，心肺检查正常，腹部平软，上腹部轻度压痛，肝脾未触及，肠鸣音无增强及减弱。辅助检查：血常规为 Hb140g/L。大便潜血实验（+）。五肽胃泌素测定胃酸分泌正常。血清学检查抗壁细胞抗体阴性，抗内因子抗体阴性。快速尿素酶试验幽门杆菌（HP）阳性，胃镜检查可见胃窦黏膜呈红白相间样改变，表面有白色分泌物，幽门口持续开放，见大量胆汁反流。请问：

- (1) 本病最可能的医疗诊断是什么？（4 分）
- (2) 主要护理诊断有哪些？（4 分）

(3) 应采取哪些护理措施? (12分)

3.患者,男,40岁,长途运输司机。因左侧腰痛1个月,加重伴左侧腿部疼痛、无力3d入院。患者1个月前出现左侧腰痛,自贴伤湿止痛膏未见好转,3d前弯腰抬重物时感腰痛加重,背不能伸直,伴左腿疼痛、无力。既往体健,开车20年,有烟酒嗜好。家中无类似病史。体检:L₄~L₅左侧压痛并有放射痛,左腿肌力下降,左腿直腿抬高试验45°(+).X线正位片示腰椎轻度侧弯,侧位片示腰椎生理前凸消失,L₄~L₅间隙狭窄。请问:

(1) 该患者的诊断是什么? (4分)

(2) 患者的主要护理问题是什么? (4分)

(3) 请制定其主要的护理措施。(12分)