



- D.求医行为                      E.保健行为
- 11.病因预防又称为
- A.一级预防                      B.二级预防                      C.三级预防  
D.四级预防                      E.临床预防
- 12.患者因病住院治疗一段时间后痊愈，各项指标正常，医嘱给予出院，但患者自我感觉病还未彻底治愈，害怕回家后再复发，不愿出院，患者的这一行为属于
- A.患者角色行为冲突      B.患者角色行为缺如      C.患者角色行为强化  
D.患者角色行为消退      E.患者角色行为异常
- 13.根据世界卫生组织规定的噪声标准，白天医院病区较理想的强度是
- A.10~20dB                      B.50~60dB                      C.25~30dB  
D.70~80d                      E.35~40dB
- 14.破伤风患者应采用哪种隔离措施
- A.呼吸道隔离                      B.严密隔离                      C.肠道隔离  
D.接触隔离                      E.保护性隔离
- 15.输液、输血发生空气栓塞时，应立即协助患者采取
- A.左侧卧位                      B.右侧卧位                      C.头高足低位  
D.半坐卧位                      E.平卧位
- 16.器官移植后各种体内插管的护理包括
- A.心导管及动、静脉切开管每天清洁创面1次，并更换敷料  
B.胸、腹、胃、膀胱等引流瓶（袋）每天更换消毒  
C.每天更换胸膜腔负压瓶内液体  
D.每天更换静脉输液管  
E.气管导管每班更换消毒
- 17.下列哪一种患者需要做特殊口腔护理
- A.消化不良                      B.糖尿病                      C.胃炎  
D.昏迷                              E.肺脓肿
- 18.当一患者骶尾部皮肤破溃，显露红润创面，并有脓性分泌物，此属于压疮哪一期
- A.炎性浸润期                      B.瘀血红润期                      C.坏死溃疡期  
D.组织坏死期                      E.浅度溃疡期
- 19.防止交叉感染最重要的措施是
- A.无菌物品应放在清洁、干燥、固定处                      B.无菌物品应定期检查  
C.凡未经消毒的手和物品，不可跨越无菌区                      D.无菌操作前洗手，修剪指甲  
E.一份无菌物品只能供一位患者使用
- 20.传染病区内正确使用隔离衣的方法是
- A.半污染区，清洁面朝内      B.先扣袖扣，再扣领扣      C.污染区，清洁面朝外  
D.消毒双手后再解袖扣      E.送消毒时，清洁面朝外
- 21.败血症的常见热型是
- A.间歇热                              B.弛张热                              C.波浪热

- D.不规则热                      E.双峰热
- 22.患者，女，37岁。患乙肝近10年，去年确诊为肝硬化。近来常有鼻出血、牙龈出血。出血的最主要原因是
- A.脾功能亢进                      B.血小板功能障碍                      C.毛细血管脆性增加  
D.血小板缺乏                      E.肝脏合成凝血因子减少
- 23.患者何某，男，33岁。因高热行乙醇擦浴，置冰袋于头部是为了
- A.防止脑水肿                      B.提高脑组织对缺氧的耐受性                      C.防止头部充血  
D.有利于脑细胞功能的恢复                      E.防止心律失常
- 24.学生刘某，男，18岁。篮球比赛时不慎踝部扭伤，应立即给予
- A.局部按摩                      B.局部冷湿敷                      C.红外线照射  
D.放置热水袋                      E.松节油涂擦
- 25.关于无盐低钠的饮食原则下列叙述错误的是
- A.必须控制食物中自然存在的钠含量                      B.禁用腌制品  
C.禁用含钠食物和药物                      D.每天控制食物中钠含量 $<0.7g$   
E.适用于重度高血压水肿较重患者
- 26.大量不保留灌肠的目的不包括
- A.解除便秘                      B.分娩前准备                      C.高热降温  
D.治疗肠道感染                      E.肠道手术前准备
- 27.患者陈某，男，50岁。因脊髓损伤致尿失禁，给予留置导尿管7d，引流通畅，近日发现尿液混浊，可采取的护理措施是
- A.及时拔除导尿管                      B.每天更换导尿管一次                      C.定期消毒尿道口  
D.定时更换卧位                      E.进行膀胱冲洗
- 28.患者李某，女，43岁。肺叶切除术后第二天，为预防呼吸道感染，护士采取的护理方法，哪一项最佳
- A.超声波雾化吸入疗法                      B.压缩雾化吸入疗法                      C.蒸气吸入疗法  
D.氧气雾化吸入疗法                      E.手压式雾化器雾化吸入疗法
- 29.药品的保管原则不正确的是下列哪一项
- A.内服药、注射药、外用药分类保管                      B.剧毒药标记用蓝边  
C.抗生素按有效日期先后排列不敷                      D.生物制品保存 $4^{\circ}C$ 环境  
E.易挥发、潮解的药物，须装瓶内并盖紧
- 30.患者，女，50岁，高血压性心脏病，排便后，突感胸闷，咳嗽、大汗淋漓，脉搏为120次/min，呼吸为30次/min，不能平卧，烦躁不安，两肺布满湿啰音，给患者吸氧宜用
- A.低流量持续吸氧                      B.高流量持续吸氧                      C.低流量间隙吸氧  
D.乙醇湿化吸氧                      E.高流量间隙吸氧
- 31.患者，男，55岁，患急性肺水肿，护士为其吸氧时，可加入
- A.碘伏                      B.乙醇溶液                      C.氯化钠溶液  
D.葡萄糖溶液                      E.碳酸氢钠溶液
- 32.患者高某，女，76岁。独住，因子女不孝而厌世服毒，邻居发现后将昏迷的老人送入医

院救治。在不知老人服何毒物时，护士应采取的护理措施是

- A.禁忌洗胃，待查明毒物名称后再处理
- B.抽出胃内容物，再用温开水洗胃
- C.用生理盐水灌肠，减少毒物吸收
- D.鼻饲牛奶或蛋清水，以保护胃黏膜
- E.氧气吸入，待清醒后用催吐法排出毒物

33.中国第一所临终关怀医院—南汇护理院诞生于

- A.1991年3月
- B.1993年5月
- C.1976年12月
- D.1988年5月
- E.1988年10月

34.关于静脉炎的处理错误的是

- A.患肢抬高、制动
- B.局部冰袋冷敷
- C.局部50%硫酸镁湿热敷
- D.超短波理疗
- E.如意黄金散加醋调成糊状外敷

35.书写病室报告时应先书写

- A.手术患者
- B.危重患者
- C.新入院患者
- D.转入患者
- E.转出患者

36.直肠癌最常见的临床症状是

- A.肠梗阻症状
- B.直肠刺激症状
- C.黏液血便
- D.会阴部持续性剧痛
- E.贫血

37.支气管哮喘患者突然出现胸痛、气急、呼吸困难、大汗，首先应考虑

- A.自发性气胸
- B.支气管哮喘急性发作
- C.左心衰竭
- D.肺炎
- E.胸膜炎

38.仰卧位时吸入性肺脓肿好发生的部位是

- A.肺下叶背段
- B.肺下叶后基底段
- C.肺上叶前段
- D.肺尖
- E.右肺叶后段

39.肺结核患者，突然大咯血，从鼻中涌出，因害怕，患者极力屏气随即出现烦躁不安，挣扎坐起，极度呼吸困难，颜面青紫，大汗淋漓，双眼上翻，立即应采取的抢救措施是

- A.鼻导管给氧，注射呼吸兴奋剂
- B.进行人工呼吸
- C.胸穿抽气
- D.清除血块或气管切开
- E.输液、输血、注射止血剂

40.肺心病呼吸衰竭患者，入院后急查血气分析： $\text{PaO}_2$ 为40mmHg， $\text{PaCO}_2$ 为75mmHg立即鼻导管给氧4L/min，2h后患者发绀减轻，但神志不清呈现昏睡状态，复查血气分析： $\text{PaO}_2$ 为80mmHg， $\text{PaCO}_2$ 为95mmHg，此时首先应立即给予的处理是

- A.应用呼吸兴奋剂
- B.应用糖皮质激素
- C.加大氧流量
- D.检查有无气道阻塞
- E.降低氧流量

41.中度慢性阻塞性肺疾病的分级标准是

- A. $\text{FEV}_1/\text{FVC}<70\%$
- B. $\text{FEV}_1\geq 80\%$ 预计值
- C. $\text{FEV}_1<80\%$ 预计值
- D. $50\%\leq\text{FEV}_1<80\%$ 预计值
- E. $30\%\leq\text{FEV}_1<50\%$ 预计值

42.慢性肺心病形成肺动脉高压最主要的因素是

- A.血容量增多
- B.血液黏滞度增高，增加肺血管阻力
- C.血管床横面积减少
- D.肺小动脉痉挛

- E.肺小血管形成
- 43.对观察下肢深静脉血栓形成征象具有临床意义的双下肢周径差值是  
 A.>0.5cm                      B.>0.8cm                      C.>1.0cm  
 D.>1.2cm                      E.>1.5cm
- 44.机械通气时表示通气恰当的呼气末 CO<sub>2</sub> 浓度为  
 A.4.5%~5%                      B.3.5%~1.5%                      C.5%~6.5%  
 D.2.5%~3.5%                      E.4%~5.5%
- 45.患者,男,36岁,乏力、晕厥史3d,心电图P波与QRS波无关系,P波频率为90次/min, QRS波为32次/min。首选哪种治疗方法  
 A.含化硝酸甘油                      B.立即同步电复律                      C.静脉注射西地兰  
 D.静脉注射心得安                      E.安装临时起搏器
- 46.张某,男,60岁,血压为170/100mmHg,受凉后出现头痛眩晕,胸闷、气急、恶心、呕吐,视力模糊,经降压治疗,病情很快好转,该患者可能的诊断是  
 A.恶性高血压                      B.高血压危象                      C.高血压脑病  
 D.冠心病                      E.短暂性脑缺血发作
- 47.主动脉瓣关闭不全无下述哪种体征  
 A.股动脉枪击音                      B.主动脉瓣区舒张期杂音                      C.脉压增大  
 D.Graham-Steel杂音                      E.Austin-Flint杂音
- 48.风心病二尖瓣狭窄及主动脉关闭不全患者,合并房颤,心率为130次/min,在应用洋地黄诊疗过程中,出现下列哪些情况应立即停止用药  
 A.心电图出现鱼钩样ST-T改变                      B.心悸减轻                      C.QT间期缩短  
 D.血压轻度降低                      E.心率为58次/分
- 49.患者,男,58岁,诊断为急性前壁心肌梗死,发病第2天突然出现短阵意识丧失.抽搐,心电图上最可能出现的心律失常是哪一种  
 A.房性早搏                      B.心房颤动                      C.心室颤动  
 D.室性早搏                      E.窦性心律不齐
- 50.病毒性心肌炎的患者大多数在发病前有如下哪项病史  
 A.关节痛病史                      B.发病前1~3周上呼吸道或肠道感染病史                      C.心绞痛病史  
 D.头晕病史                      E.心慌病史
- 51.心脏电复律时两电极板距离不应小于  
 A.10cm                      B.8cm                      C.7cm  
 D.6cm                      E.9cm
- 52.急性胰腺炎腹痛明显者需禁食、禁水多长时间为宜  
 A.1~3h                      B.6~12h                      C.12~36h  
 D.1~3d                      E.1~3周
- 53.十二指肠球部溃疡患者,3d上腹痛加重,反复呕吐,为胃内容物及咖啡样物,共3次约500ml,无宿食,吐后疼痛缓解,最可能合并  
 A.幽门梗阻                      B.上消化道出血                      C.穿孔



- A.造血 T 细胞移植      B.免疫抑制剂治疗      C.糖皮质激素  
D.维生素 B<sub>12</sub>      E.脾切除
- 66.一位急性白血病患者，检出染色体结构异常，t(15, 17)最可能是哪种白血病  
A.CML      B.ALL      C.AML-M4  
D.AML-M2      E.AML-M3
- 67.再生障碍性贫血患者必须绝对卧床休息的指征是血小板数低于  
A.50x10<sup>9</sup>/L      B.60×10<sup>9</sup>/L      C.40x10<sup>9</sup>/L  
D.20×10<sup>9</sup>/L      E.10×10<sup>9</sup>/L
- 68.多数化疗药物骨髓抑制作用最强的时间为化疗后  
A.第 7~14d      B.第 3~7d      C.第 1~7d  
D.第 15~20d      E.第 5~10d
- 69.王某，胃次全切除术后二年，近日感头痛，乏力。Hb: 60g/L, RBC: 1.5×10<sup>12</sup>/L, MCV: 20fl;网织红细胞比例为 1.5%。此患者最可能的诊断是  
A.巨幼红细胞性贫血      B.缺铁性贫血      C.再生障碍性贫血  
D.感染性贫血      E.溶血性贫血
- 70.抗甲状腺药物最严重的毒副作用是  
A.皮疹      B.肝功能损害      C.粒细胞缺乏症  
D.胃肠反应      E.过敏
- 71.患者，男，25 岁，1 型糖尿病患者，2d 前中断胰岛素后出现昏迷，血糖为 23mmol/L，经抢救并静脉滴注碳酸氢钠后血糖下降，神志好转，酸中毒减轻，但不久又进入昏迷，其最可能的原因是  
A.并发脑水肿      B.并发低血糖      C.并发脑血管意外  
D.并发乳酸酸中毒      E.并发肾衰竭
- 72.住院期间，当患者出现低血糖反应症状时，首先采取的措施是  
A.口服 50%葡萄糖注射液 20ml      B.急查血糖  
C.让患者吃一块巧克力      D.让患者吃饼干等甜食E.吸氧
- 73.他汀类药物的副作用不包括  
A.肝功能损害      B.横纹肌溶解      C.急性肾衰  
D.肌肉疼痛      E.面部潮红
- 74.我国成年男性腹部脂肪积蓄的腰围诊断界限为  
A.≥80cm      B.≥82cm      C.≥83cm  
D.≥84cm      E.≥85cm
- 75.治疗痛风急性发作的特效药物是  
A.吲哚美辛      B.塞来昔布      C.秋水仙碱  
D.布洛芬      E.糖皮质激素
- 76.对 SLE 患者错误的保健指导是  
A.严格按医嘱治疗      B.外出时避免日光照射C.可食用芹菜，但忌食无花果  
D.育龄妇女应避免孕      E.忌用易诱发本病的药物

- 77.患者，女，33岁，近3个月来感乏力，全身不适，双手近侧指关节疼痛伴肿胀，有明显晨僵，活动后疼痛减轻。其最可能的诊断是
- A.类风湿关节炎      B.风湿性关节炎      C.增生性关节炎  
D.系统性红斑狼疮      E.痛风
- 78.蛛网膜下腔出血的特征性体征是
- A.偏瘫      B.感觉障碍      C.动眼神经麻痹  
D.脑膜刺激征      E.偏盲
- 79.脑出血患者急性期绝对卧床休息的时间为
- A.1~2周      B.1~3周      C.2~4周  
D.1周      E.2周
- 80.有关动脉硬化性脑梗塞的护理下列错误的是
- A.保持安静避免搬动      B.发病2周后即可做肢体锻炼      C.定时测血压  
D.不能进食者及早鼻饲      E.头部冰袋冷敷
- 81.缺血性脑血管病的有关护理诊断下列哪项不确切
- A.躯体移动障碍      B.语言沟通障碍      C.体液不足  
D.生活自理能力缺陷      E.有废用综合征的危险
- 82.流行性感病毒最容易发生变异的型别为
- A.乙型流感病毒      B.甲型流感病毒      C.丙型流感病毒  
D.丁型流感病毒      E.甲型和乙型流感病毒
- 83.在我国，属于丙类传染病的是
- A.麻疹      B.流行性出血热      C.流行性脑脊髓膜炎  
D.麻风病      E.流行性乙型脑炎
- 84.引起胃肠型食物中毒的最常见细菌为
- A.变形杆菌      B.大肠杆菌      C.金黄色葡萄球菌  
D.沙门氏菌      E.副溶血弧菌
- 85.抗休克的最基本治疗措施是
- A.应用血管活性药物      B.扩充血容量      C.纠正酸中毒  
D.应用抗生素      E.增强心功能
- 86.对高渗性脱水患者执行输液治疗时，应首先输入
- A.等渗盐水      B.5%葡萄糖液      C.平衡液  
D.右旋糖酐      E.林格液
- 87.择期手术后12d，体温38°C，最可能的原因是
- A.手术切口感染      B.上呼吸道感染      C.伴发肺部感染  
D.基础代谢增高      E.组织吸收反应
- 88.腰麻后患者去枕平卧6~8h主要是预防
- A.头痛      B.呕吐      C.低血压  
D.切口痛      E.腰痛
- 89.手术人员穿无菌手术衣和戴无菌手套后，其灭菌区应是

- A.双肩及胸部                      B.腰以上胸背及手                      C.双手及胸、腹部  
D.双手及臂、腰以上前胸部                      E.双手及胸、腹、背部
- 90.切开空腔脏器前，要先用纱布垫保护周围组织，是为了  
A.避免损伤空腔脏器                      B.防止或减少污染                      C.防止水分蒸发过多  
D.防止术后胃扩张                      E.防止术后腹胀
- 91.关于急性肾衰患者少尿期的饮食护理，下列哪项错误  
A.限制饮水                      B.低蛋白                      C.富含维生素  
D.以糖为主                      E.多吃水果
- 92.全身化脓性感染抽血作血培养，其最佳时间是  
A.高热时                      B.间歇期                      C.寒战时  
D.输入抗生素时                      E.输入抗生素后
- 93.卷轴带用于径围不一致的小腿和前臂的包扎法是  
A.环形                      B.螺旋形                      C.螺旋反折形  
D.“8”字形                      E.回反形
- 94.肿瘤放疗易损伤皮肤，护理时应  
A.保持皮肤干燥，清洁                      B.肥皂水清洗                      C.热敷理疗  
D.外用药物                      E.按摩
- 95.患者，男，25岁，不慎被开水烫伤左上肢、躯干部（除会阴部）及双臀部，患者烧伤面积是  
A.9%                      B.18%                      C.27%  
D.40%                      E.46%
- 96.某护士为一患淋巴瘤的患者静脉注射氮芥，患者感局部明显疼痛，肿胀，回抽无回血，立即拔出针头，但局部仍痛，下列处理哪项正确  
A.给止痛药                      B.以热水袋热敷                      C.以50%硫酸镁湿热敷  
D.外敷止痛膏                      E.局部冷敷，以稀硫代硫酸钠局部封闭
- 97.患儿，女，9岁，确诊水痘，现处于出疹期，自述皮疹瘙痒难忍。护士给予患儿的护理措施正确的是  
A.指导其可隔衣服挠抓皮疹患处  
B.皮疹完全消退前不可洗澡，以防继发感染  
C.局部可涂抹地塞米松霜  
D.遵医嘱口服抗组胺药物  
E.皮疹处不可涂抹炉甘石洗剂
- 98.斜疝修补术后，预防阴囊血肿的措施是  
A.平卧位，膝下垫软枕                      B.预防便秘尿潴留                      C.切口处用沙袋压迫并托起阴囊  
D.咳嗽时用于按压伤口                      E.不宜过早下床活动
- 99.急性腹膜炎已明确诊断，决定手术治疗，术前处理哪项不妥  
A.禁食、输液                      B.备皮、备血                      C.应用胃肠减压  
D.禁用镇静止痛剂                      E.给麻醉前用药

- 100.胃十二指肠溃疡急性穿孔，非手术治疗中哪项最重要  
 A.安静卧床，取半卧位 B.禁食、补液 C.应用抗生素  
 D.给予胃肠减压 E.禁用镇静止痛剂
- 101.胃大部切除术后 4d，患者发生不含胆汁的频繁呕吐，可能是  
 A.胃肠吻合口炎症水肿 B.近侧空肠段梗阻 C.远侧空肠段梗阻  
 D.倾倒综合征 E.低钾血症
- 102.患者，男，40 岁，阑尾穿孔腹膜炎手术后第 7d，体温为 39℃，伤口无红肿，大便次数增多，混有黏液，伴有里急后重，应考虑并发  
 A.盆腔脓肿 B.膈下脓肿 C.细菌性痢疾  
 D.肠炎 E.肠粘连
- 103.当化脓性阑尾炎细菌侵入阑尾系膜小静脉时，可引起的严重并发症是  
 A.坏疽性阑尾炎 B.阑尾穿孔腹膜炎 C.阑尾周围脓肿  
 D.腹腔脓肿 E.化脓性门静脉炎
- 104.急性腹膜炎发生休克的主要原因是  
 A.剧烈疼痛 B.腹膜吸收大量毒素，血容量减少  
 C.肠内积液刺激 D.大量呕吐失液 E.腹胀引起呼吸困难
- 105.胃肠减压期间，若胃管堵塞，首先应该  
 A.重新置管 B.加压吸引 C.减压吸引  
 D.暂停吸引 E.用生理盐水 10~20ml 冲洗胃管
- 106.幽门梗阻患者于术前护理，下列哪项可减轻胃黏膜水肿有利于术后吻合口愈合  
 A.纠正脱水 B.纠正低氯低钾性碱中毒 C.给予流质或禁食  
 D.术前数日每晚用温等渗盐水洗胃 E.加强营养
- 107.由于左半结肠癌的类型和肠道解剖特点，临床上容易出现哪项症状  
 A.全身中毒症状 B.黏液血便 C.腹泻、便秘交替  
 D.腹部肿块 E.慢性肠梗阻
- 108.门静脉高压症患者，分流手术前的护理措施哪项是错误的  
 A.卧床休息 B.肌注维生素 K C.应用护肝药物  
 D.留置胃管 E.高糖低脂高维生素饮食
- 109.胆管 T 管拔除前，夹管观察的内容是  
 A.体温、血压、意识 B.腹痛、体温、黄疸 C.腹痛、呕吐、体温  
 D.黄疸、血压、意识 E.腹痛、血压、体温
- 110.以下哪项是血栓闭塞性脉管炎晚期特有的临床表现  
 A.间歇性跛行 B.休息痛 C.足背动脉搏动消失  
 D.营养性改变 E.趾端坏疽
- 111.颅脑损伤患者意识障碍有中间清醒期，一侧瞳孔散大，对光反应消失，对侧肢体偏瘫，提示为  
 A.脑挫裂伤 B.脑干损伤 C.硬脑膜外血肿

- D.枕骨大孔疝                      E.脑内血肿
- 112.对张力性气胸的现场急救，首先应
- A.厚敷料加压包扎              B.闭式胸膜腔引流              C.人工呼吸
- D.胸腔穿刺排气                  E.快速输液、吸氧
- 113.某胸腔手术后患者，胸腔闭式引流管不慎自胸壁伤口脱出，首要措施是
- A.急呼医生处理                  B.将引流管重新插入胸腔
- C.手指捏紧引流口皮肤          D.到换药室取凡士林纱布堵塞引流口
- E.急送手术室
- 114.对肾损伤非手术治疗的护理下列哪项是错误的
- A.定时观察生命体征              B.注意血尿情况                  C.观察体温变化
- D.早期起床活动                  E.注意腹痛的变化
- 115.膀胱结石的典型症状是
- A.尿频、尿急                      B.排尿中断                      C.血尿
- D.脓尿                                  E.尿潴留
- 116.某患者食管癌手术后第3d，拔除胃管后进流质饮食，第5d体温高达39°C，呼吸困难，胸痛，X线胸透见有胸腔积液，首先考虑的并发症是
- A.吸入性肺炎                      B.膈下脓肿                      C.切口感染
- D.食管吻合口瘘                  E.支气管胸膜瘘
- 117.患者，男，86岁，脑出血后卧床半年多，患者有时神志恍惚，烦躁不安，经检查下腹部隆起，半球形囊性肿物，有少量尿液自尿道口溢出浸湿衣裤等，应认为是
- A.真性尿失禁                      B.充盈性尿失禁                  C.压力性尿失禁
- D.尿瘘                                  E.反射性尿失禁
- 118.患儿，女，4岁，出生后1个月发现心脏杂音，确诊室间隔缺损，近日来，患儿无诱因出现青紫、不喜动、乏力、呼吸急促，考虑该患儿可能出现
- A.艾森门格综合征                  B.法洛四联症                      C.呼吸衰竭
- D.差异性青紫                      E.心力衰竭
- 119.下列哪项骨牵引护理是错误的
- A.床尾或床头抬高15~30cm              B.牵引针不可左右移动
- C.去除牵引针孔的血痂                  D.维持肢体在整复或固定的位置
- E.鼓励患者功能锻炼
- 120.患者，男，35岁，双侧股骨干闭合性粉碎骨折，伤后48h出现紫绀、呼吸困难、肺部啰音。此时应考虑
- A.脂肪栓塞                          B.坠积性肺炎                      C.感染
- D.休克                                  E.挤压综合征

**二、多项选择题（每一考题下面有A、B、C、D、E五个备选答案，请从中选择两个或两个以上的最佳答案，多选、漏选、错选均不得分，每题2分，共60分）。**

- 1.属于护理程序中护理计划阶段的内容是

- A.分析资料                      B.提出护理诊断                      C.排列护理诊断的顺序  
D.确定预期目标                      E.制定护理措施
- 2.下列关于需要的描述，正确的是  
A.需要是由未满足的要求引起的内部紧张状态    B.需要是人对其某种目标的渴求或欲望  
C.需要是个体行为的动力性源泉                      D.需要能够维持生命的延续  
E.需要能够提高物质和精神生活水平
- 3.下列护理诊断描述正确的是  
A.排便异常：便秘，与生活方式改变有关  
B.体液不足：与频繁呕吐有关  
C.体温升高：与腹腔内细菌繁殖有关  
D.皮肤完整性受损：与护士未及时翻身有关  
E.潜在并发症：吻合口破裂
- 4.下列宜采用半坐卧位的患者是  
A.胃大部切除术后患者    B.甲状腺切除术后患者    C.肠痿患者  
D.肺源性心脏病代偿期患者                      E.胸腔积液患者
- 5.下列哪些患者应使用保护具，防止意外  
A.小儿患者                      B.昏迷患者                      C.高热患者  
D.躁动患者                      E.危重患者
- 6.下列关于要素饮食的应用正确的是  
A.应用原则是由低、少、慢开始，逐渐增加    B.应用要素饮食期间要定期进行营养评估  
C.糖尿病患者应慎用                      D.不能用于婴幼儿和消化道出血者  
E.使用前需高温蒸煮，防止腹泻
- 7.帮助尿失禁患者重建正常的排尿功能，正确的做法是  
A.控制患者每日白天摄入 1000~1500ml 液体    B.入睡前限制饮水，减少夜间尿量  
C.观察排尿反应，定时使用便器                      D.长期尿失禁者，可行导尿术，持续引流  
E.安慰、开导，鼓励患者
- 8.大量输血患者可能出现的反应有  
A.溶血反应                      B.肺水肿                      C.出血倾向  
D.酸中毒                      E.枸橼酸钠中毒反应
- 9.胸外心脏按压的有效性判断是  
A.口唇、面色、甲床由发绀转为红润                      B.瞳孔随之缩小，有时可有对光反应  
C.昏迷变浅出现反射或挣扎                      D.血压维持在 60mmHg 以上  
E.呼吸逐渐恢复
- 10.结核性胸腔积液的治疗包括  
A.全身抗痨                      B.胸腔穿刺抽液                      C.可应用糖皮质激素  
D.应用利尿剂加快胸水消退                      E.胸腔内注射粘连剂，如四环素等
- 11.慢性肺心病心衰使用利尿剂易出现

- A.低钾、低氯性碱中毒 B.痰液黏稠不易咳出 C.影响通气/血流比值  
D.血液黏稠 E.加重组织缺氧
- 12.哮喘治疗的目标是
- A.尽可能控制、消除症状  
B.预防、控制哮喘发作，使就诊的次数达到最低  
C.使肺功能尽可能接近正常  
D.保证患者能参加正常活动  
E.避免哮喘药物的不良反应
- 13.下列心衰的治疗措施属于减轻心脏负担的是
- A.休息 B.保证足够的钠盐摄入 C.使用利尿剂  
D.使用洋地黄类药物 E.使用硝酸甘油
- 14.急性心力衰竭的护理要点包括
- A.去枕平卧位  
B.给予高流量吸氧  
C.使用快速利尿剂时注意监测电解质  
D.使用血管扩张剂时应监测血压  
E.静点硝普纳时，为使药效更强应提前配置
- 15.下列有关使用硝酸甘油时的护理内容，正确的是
- A.为加强药物疗效，应嘱患者用温开水吞服硝酸甘油  
B.服用硝酸甘油后 35min 疼痛仍不缓解，可再服 1 片  
C.静脉点滴硝酸甘油时滴速宜慢  
D.使用硝酸甘油后出现头部胀痛是中毒表现，应立即停药  
E.初次使用时应避免站立体位，以免致低血压
- 16.与肝性脑病发病相关的因素有
- A.假神经递质 B.支链氨基酸增多 C.血氨增高  
D.芳香氨基酸减少 E.五羟色胺产生增多
- 17.下列有关急性胰腺炎引发的腹痛叙述正确的是
- A.可向腰背部放射 B.为间断性的疼痛 C.进食后缓解  
D.弯腰时加重 E.为持续性的疼痛
- 18.甲亢患者伴明显突眼者其护理措施是
- A.嘱患者白天戴墨镜 B.睡眠时眼睑不能闭合者需覆盖纱布或眼罩  
C.睡眠应取高枕卧位 D.低盐饮食、限制水量  
E.作眼球运动时严防向上凝视
- 19.下列表现中哪些属于缺铁性贫血的特殊表现
- A.心悸 B.耳鸣 C.反甲或匙状甲  
D.Plummer-Vinson 综合征 E.异食癖
- 20.重症肌无力患者禁忌使用的药物包括
- A.庆大霉素 B.奎宁 C.氯丙嗪

- D.镇静剂                      E.青霉素
- 21.关于乙型肝炎的叙述正确的是
- A.母婴传播是我国乙肝传播重要的传播途径      B.肝外损害主要由免疫复合物引起  
C.肝细胞病变主要取决于机体的免疫状况      D.秋冬季节多见  
E.初次感染 HBV 的年龄越小，慢性化越高
- 22.下列关于高位性小肠梗阻特征的描述，错误的是
- A.腹胀不明显                      B.呕吐发生晚                      C.呕吐发生早  
D.腹胀呈不对称性                      E.呕吐物有粪样物
- 23.关于急腹症的患者入院后的处理，下列正确的是
- A.禁食和胃肠减压                      B.补液，记出入量                      C.确诊为胆管炎后，可给予哌替啶止痛  
D.非休克患者可采取半卧位                      E.未明确诊断者禁止热敷
- 24.关于疝的术后护理，下列叙述错误的是
- A.仰卧位                      B.切口置沙袋压迫                      C.保持大小便通畅  
D.鼓励患者早期下床活动                      E.若咳嗽，应保护伤口，及时治疗
- 25.以下哪些是 TNA 的特点
- A.有助于维持肠黏膜结构和屏障的完整性                      B.营养素的吸收和利用更符合生理需求  
C.经济实用，患者花费较少                      D.简化输液过程，节省护理时间  
E.减少污染机会
- 26.术后不宜早期下床活动的是
- A.胆囊切除术                      B.肝叶切除术                      C.胃大部切除术  
D.门静脉分流术                      E.脾切除术
- 27.闭式胸膜腔引流的目的是
- A.排除积气和渗液                      B.矫正纵隔移位                      C.保持和恢复胸膜腔负压  
D.使肺恢复膨胀状态                      E.清除残腔
- 28.防止颅内压骤然升高的护理措施包括
- A.避免情绪激动                      B.保呼吸道通畅                      C.保持环境安静，防止患者躁动  
D.避免剧烈咳嗽和便秘                      E.及时控制癫痫发作
- 29.患者，男，52 岁，自诉 2 个月前开始，解黏液血便，大便软不成形，每天 3~5 次，并有里急后重感，自认为是痔疮，用痔疮塞肛治疗无效，故来医院治疗。经肠镜活检，确诊为直肠癌，决定行直肠癌根治术。术前进行肠道准备，下列措施正确的有
- A.术前 2d 进流质饮食      B.口服甲硝唑或新霉素等肠道抗生素  
C.手术前 1d 晚清洁灌肠      D.术前 2d 口服缓泻剂  
E.术前 8h 禁食，4h 禁水
- 30.以下临床表现哪些符合神经根型颈椎病的特征
- A.压头试验阳性                      B.一过性脑缺血症状                      C.手部发麻、精细活动失调、握力减退  
D.颈部僵硬、颈痛                      E.上肢牵拉试验阳性