

全真模拟试卷（五）

一、单项选择题（每一考题下面有 A、B、C、D、E 五个备选答案，请从中选择一个最佳答案，每题 1.5 分，共 180 分）。

1. 下列哪一项不属于护理专业的特征

- A. 以为人类服务为目的 B. 有完善的教育体制 C. 有系统而坚实的专业理论基础
D. 有良好的科研体系 E. 有专业自主性

2. 下列哪一项是影响健康的主要因素

- A. 心理因素 B. 生物因素 C. 环境因素
D. 社会因素 E. 文化因素

3. “2000 年人人享有卫生保健”的战略目标的提出者是

- A. 联合国 B. WHO C. 国务院
D. 全国人大 E. 卫生部

4. “一般适应综合征”首先是由以下哪种学说提出的

- A. 席尔的压力与适应学说 B. 拉扎勒斯的压力与应对学说
C. 霍姆斯的生活事件与疾病关系学说 D. 拉赫的生活事件与疾病关系学说
E. 伯纳德的应激反应学说

5. 人际关系双方的心理方位在角色行为体现上具有明显的上下位之分，旁观者能迅速分辨，称为

- A. 完全性心理方位 B. 内隐性心理方位 C. 服从性心理方位
D. 权威性心理方位 E. 外显性心理方位

6. 人间最传神的非语言沟通的表现形式是

- A. 面部表情 B. 着装 C. 眼神
D. 身体姿势 E. 环境安排

7. 下列有关患者入院后护士收集资料的过程，不妥的做法是

- A. 通过患者的主诉获得主观资料 B. 通过与患者交谈获得病史资料
C. 通过观察患者非语言行为获得客观资料 D. 通过医生病历获得体检资料
E. 通过阅读实验室报告获得检验结果

8. 在护理计划中，预期目标陈述的是

- A. 护理活动所应达到的程度 B. 患者健康状况所应达到的程度
C. 家属对患者的支持程度 D. 医疗活动所应达到的水平
E. 护理部领导的管理水平

9. 下列关于马林诺斯基对文化功能的阐述正确的是

- A. 文化不能解释社会的规范体系 B. 文化使各个群体利益更加冲突
C. 世界历史进程可完全被当时的文化所表现 D. 文化是各民族相互区分的标志
E. 文化是民族社会发展的外在动力

10. 华森的关怀科学模式的核心内容是

- A. 早期诊断 B. 早期治疗 C. 康复锻炼
D. 人性关怀 E. 健康教育

11. “功能制护理”的大力推行是受以下哪种护理哲学思潮的影响

- A.禁欲主义 B.浪漫主义 C.实用主义
D.人本主义 E.存在主义
- 12.健康促进模式（HPM）的提出者是
A.霍克巴姆 B.贝克 C.伦斯·格林
D.勒·潘德 E.恩格尔
- 13.下列病室通风的目的中不合适的是
A.保持空气的新鲜 B.调节室内的温度和湿度
C.降低空气中的微生物的密度 D.减少热量散失
E.使患者精神振奋、心情愉快
- 14.下列关于光线对人的作用不正确的是
A.红外线能被皮肤吸收，使皮肤及深部组织受到温热作用
B.适量的日光照射，使人食欲增加，舒适愉快
C.紫外线有强大的杀菌作用
D.可见光、红外线，紫外线及各种射线都有很强的生物学作用
E.光线对人的心理无作用
- 15.被套式备用床的被头边缘与床头的距离是
A.10cm B.15cm C.20cm
D.25cm E.30cm
- 16.患者，男，38岁，车祸伤及头部，当即出现右侧鼻唇沟变浅，右外耳道流出淡血性液体，右耳听力下降，CT示颅内少量积气。目前患者适宜的体位是
A.头低位 B.仰卧中凹位 C.左侧卧位
D.右侧卧位 E.平卧位
- 17.不需要使用保护具的患者为
A.分娩后产妇 B.昏迷 C.高热
D.躁动 E.僾妄
- 18.患者，女，绒毛膜癌，出现剧烈头痛、喷射性呕吐、偏瘫。家属询问护士可能的原因，护士正确的回答是
A.肺转移 B.脑转移 C.阴道转移
D.肝转移 E.肾转移
- 19.以下哪种患者不适宜床上擦浴
A.使用石膏固定的患者 B.衰竭的患者 C.传染病患者
D.使用牵引的患者 E.无法自行沐浴的患者
- 20.导致压疮发生的最常见原因是
A.皮肤受到潮湿物的刺激 B.年龄因素 C.压力因素
D.营养状况 E.体温升高
- 21.下列关于慢波睡眠的描述，正确的是
A.慢波睡眠分为五个时期 B.入睡期是所有睡眠期中睡得最浅的一期
C.浅睡期只维持几分钟 D.中度睡眠期生命体征不规则
E.深度睡眠期不利于促进体力恢复
- 22.下列关于快波睡眠的描述，正确的是

- A.与慢波睡眠相比,快波睡眠的唤醒阈降低 B.脑耗氧量及脑血流量降低
C.生长激素分泌增多 D.快波睡眠期不会做梦
E.快波睡眠与觉醒时很难区分
- 23.不适合用于压力蒸汽灭菌的物品是
A.油剂 B.搪瓷物品 C.玻璃器皿
D.金属制品 E.纤维织物
- 24.热力消毒灭菌法中效果最好的是
A.燃烧法 B.干烤法 C.煮沸法
D.高压蒸气灭菌法 E.流通蒸汽灭菌法
- 25.正确使用无菌持物钳的方法是
A.门诊换药室的无菌持物钳应每周消毒一次 B.始终保持钳端向上,不可跨越无菌区
C.取放持物钳时不可触及容器壁 D.到远处取物应速去速回
E.可以夹取任何无菌物品
- 26.取用无菌溶液时,先倒出少许溶液是为了
A.冲洗瓶口 B.检查溶液的颜色 C.冲洗无菌容器
D.检查溶液有无污染 E.查液有无浑浊
- 27.患者,女,30岁,汽车撞伤左侧大腿,致股骨中段闭合性骨折,行骨牵引复位固定。牵引术后,下列护理能防止牵引过度的是
A.将床尾抬高15~30cm B.每天用70%酒精滴牵引针孔
C.定时测定肢体长度 D.保持有效的牵引作用
E.鼓励功能锻炼
- 28.患儿,男,8岁。右肱骨九上伸直型骨折,手法复位后屈肘位石膏托固定第1天,患儿诉右手疼痛,见手指苍白发凉。X线复查骨折整复良好,现应采取的主要措施是
A.给予安慰和关怀 B.给予止痛剂 C.抬高患肢,活动手指
D.减小右肘屈曲度,另行固定 E.立即术前准备,手术探查肱动脉
- 29.乙醇拭浴后,体温降至何值应取下头部冰袋
A.37.5℃ B.38.0℃ C.38.5℃
D.39.0℃ E.39.5℃
- 30.化学加热袋的最高温度可达
A.46℃ B.56℃ C.66℃
D.76℃ E.86℃
- 31.冷疗法的生理效应是
A.细胞代谢减少 B.毛细血管通透性增加 C.血管扩张
D.需氧量增加 E.血液流动增快
- 32.流质饮食不宜长期食用是因为
A.影响患者食欲 B.影响消化吸收 C.增加护士工作负担
D.增加营养室工作负担 E.所含热量及营养素不足
- 33.患者,女,38岁。妊娠11周,休息时仍胸闷、气急。查脉搏122次/分,呼吸23次/分,心界向左侧扩大,心尖区有II级收缩期杂音,性质粗糙,肺底有湿啰音,处理应是

天任考研

- A.立即终止妊娠 B.加强产前监护 C.控制心衰后终止妊娠
D.控制心衰后继续妊娠 E.限制钠盐摄入
- 34.发挥药效最快的给药途径是
A.口服 B.外敷 C.吸入
D.皮下注射 E.静脉注射
- 35.输液引起急性循环负荷过重（肺水肿）的特征性症状是
A.咳嗽、呼吸困难 B.心慌、恶心、呕吐 C.发绀、烦躁不安
D.咳嗽、咳粉红色泡沫性痰、气促、胸闷 E.胸闷、心悸伴呼吸困难
- 36.意识完全丧失，对各种刺激均无反应，全身肌肉松弛，深浅反射均消失，此时患者处于
A.嗜睡 B.意识模糊 C.昏睡
D.浅昏迷 E.深昏迷
- 37.患者，男，60岁。诊断为慢性阻塞性肺疾病。现需判断患者气流受限情况，应采取的检查是
A.痰培养 B.血细胞计数 C.肺功能检查
D.影像学检查 E.动脉血气分析
- 38.患者，男，40岁。体检时胸部X线显示右侧胸腔有大量积液。此时应首选的检查是
A.肺功能测定 B.胸腔穿刺术 C.动脉血气分析
D.放射性核素检查 E.纤维支气管镜检查
- 39.影响血流阻力的主要因素是
A.毛细血管口径 B.小动脉和微动脉口径 C.血液黏滞性
D.动脉管壁弹性 E.心脏收缩力
- 40.患者，男，68岁。刺激性咳嗽3周，经抗生素治疗未缓解。胸部X线显示右肺有原因不明的阴影，此时应进一步检查下列哪项
A.肺功能测定 B.胸腔穿刺术 C.动脉血气分析
D.放射性核素检查 E.纤维支气管镜检查
- 41.患者，男，70岁。诊断为慢性阻塞性肺气肿，其最可能出现的酸碱失衡是
A.代谢性酸中毒 B.代谢性碱中毒 C.呼吸性酸中毒
D.呼吸性碱中毒 E.代谢性酸中毒合并呼吸性碱中毒
- 42.患者，女，25岁。诊断哮喘5年。近年来每当春季给花园除草后即出现咳嗽、咳痰伴哮喘发作，其可能的过敏原是
A.花粉 B.尘螨 C.寄生虫
D.病毒感染 E.细菌感染
- 43.患者，男，50岁。近1个月来干咳，伴有低热、盗汗，自觉乏力。拟诊肺结核，为进一步明确诊断，最重要的检查是
A.痰菌检查 B.胸部CT检查 C.痰细胞学检查
D.支气管碘油造影 E.纤维支气管镜检查
- 44.某女性患者，因心力衰竭需限制钠盐摄入，患者不可过多使用的调味品是
A.味精 B.黄酒 C.蒜
D.番茄酱 E.米醋
- 45.患者，男，68岁。间断性心前区疼痛1个月，多在夜间发作，与活动无关，每次发作15分钟，发作时心电图II、

AVF 导联 ST 段抬高。最可能的诊断为

- A. 稳定型心绞痛 B. 恶化型心绞痛 C. 急性心肌梗死
D. 变异型心绞痛 E. 卧位型心绞痛

46. 自身免疫性胃炎引起恶性贫血的原因是

- A. 红细胞遭到破坏 B. 药物副作用 C. 缺乏叶酸
D. 影响铁的吸收 E. 维生素 B, 吸收不良

47. 患者，男，46 岁。诊断为“上消化道出血”收住院，为明确出血病因，首选的检查方法是

- A. 大便隐血试验 B. X 线钡剂造影 C. 内镜检查
D. 血常规检查 E. B 超检查

48. 患者，女，38 岁。患乙肝近 10 年，去年确诊为肝硬化。近来常有鼻出血、牙龈出血。出血的主要原因是

- A. 肝脏合成凝血因子减少 B. 脾功能亢进 C. 毛细血管脆性增加
D. 血小板缺乏 E. 血小板功能障碍

49. 由肾脏产生的最终合成血管紧张素 II 的激素是

- A. 肾素 B. 促红细胞生成素 C. 前列腺素
D. 激肽类 E. 缓激肽

50. 特发性血小板减少性紫癜的发病机制主要是

- A. 骨髓造血功能破坏 B. 血小板抗体的存在 C. 小血管炎性反应
D. 凝血因子的缺乏 E. 血小板生成抑制

51. 处于活动期的系统性红斑狼疮患者其辅助检查可能出现

- A. 血沉降低 B. 免疫球蛋白降低 C. 血清补体 C3 增多
D. 抗核抗体定量降低 E. 皮肤狼疮带试验阳性

52. 患者，女，45 岁。患类风湿关节炎 12 年。3d 前再次出现双手腕肿痛，下列检查中，提示患者病情活动的指标是

- A. 血沉偏低 B. C 反应蛋白增高 C. 关节腔滑液增多
D. 血常规示轻度贫血 E. 关节 X 线检查示关节端骨质疏松

53. COPD 患者，中老年，体弱，痰量较多者，应避免使用

- A. 祛痰药 B. 抗生素 C. 解痉药
D. 平喘药 E. 强烈镇咳剂

54. 肺源性心脏病急性加重期的治疗关键是

- A. 补液
B. 低流量吸氧
C. 纠正电解质紊乱
D. 使用呼吸机改善通气状况
E. 控制感染，解除支气管痉挛，改善通气功能

55. 患者，男，15 岁。平素体健，每于剧烈运动后出现胸闷、咳嗽和呼吸困难。其最可能的诊断是

- A. 运动性哮喘 B. 支气管扩张 C. 急性支气管炎
D. 慢性支气管炎 E. 咳嗽变异性哮喘

56. 患者，女，36 岁。咳嗽 1 月余，伴低热、痰中带血 10d。全胸片示：右肺上叶尖段炎症，伴有空洞形成。最可能的诊断是

- A. 肺脓肿 B. 支气管扩张 C. 浸润型肺结核

- D.癌性空洞伴感染 E.金黄色葡萄球菌肺炎
- 57.患者，女，47岁。确诊肺脓肿后经抗生素治疗3个月，仍咳脓痰，X线片显示脓腔直径6cm。下一步治疗应首先考虑
- A.手术治疗 B.加强体位引流 C.中医中药治疗
D.加大抗生素用量 E.气管内滴注抗生素
- 58.患者，女，妊娠39周，无诱因性阴道出血约200ml，腹部检查：腹部软无压痛，胎位清楚，胎心158次/分，阴道可见少量活动性出血。诊断可能性最大是
- A.胎盘早期剥离 B.早产 C.前置胎盘
D.正常动产 E.凝血功能障碍
- 59.患儿，女，5岁。2周前与水痘患儿有密切接触。现该患儿体温为39°C，胸前区出现红斑疹、丘疹，护士不能采用的降温措施是
- A.冰枕 B.温湿敷 C.阿司匹林口服
D.适量对乙酰氨基酚口服 E.多饮水，增加排尿
- 60.电复律治疗术后护理中不恰当的是
- A.持续24h心电监护 B.按医嘱服用抗心律失常药
C.常规低流量吸氧 D.禁食至清醒后2h E.术后应立即下床活动
- 61.患者，男，12岁。2d前受凉后出现咽干、咽痛、鼻塞、流涕、干咳、头痛，轻微畏寒。体检：体温37.1°C，咽红，扁桃体无肿大。两肺呼吸音清，未闻及干湿啰音。患者可能的诊断是急性上呼吸道感染
- A.急性上呼吸道感染 B.急性病毒性咽炎 C.急性病毒性喉炎
D.急性病毒性支气管炎 E.急性支气管炎
- 62.患者，男性，58岁，诊断为急性前壁心肌梗塞，发病第二天突然出现短阵意识丧失，抽搐，心电图上最可能出现的心律失常是哪一种
- A.房性早搏 B.心房颤动 C.心室颤动
D.室性早搏 E.窦性心律不齐
- 63.患者，男，60岁。20年前曾患肝炎。近2个月来纳差、消瘦，肝区疼痛明显。体检：轻度黄疸，面部有蜘蛛痣、腹膨隆，肝肋下2Cm，剑下4Cm，质硬，压痛；脾肋下3Cm；移动性浊音阳性。拟诊为肝癌。现首先应检测的是
- A.血氨 B.甲胎蛋白 C.血清胆红素
D.血清白蛋白 E.血清ALT和AST
- 64.一位急性心肌梗死患者心电监护时发现一提前出现的宽大畸形QRS波群，T波与QRS波主波方向相反，你认为此提前出现的QRS波群最可能是
- A.窦性心律不齐 B.房性期前收缩 C.交界区期前收缩
D.室性期前收缩 E.正常现象
- 65.出血坏死型胰腺炎患者出现Cullen征是指
- A.黄疸加重 B.背部皮肤青紫 C.腰部两侧出现灰紫色瘀斑
D.脐周皮肤红斑 E.脐周出现皮肤青紫
- 66.患儿，男，1岁，诊断动脉导管未闭6个月。3d前，发热，咳嗽，近1d来咳嗽、呼吸急促，三凹症明显，尿少，急诊入院。体检：体温38°C，脉搏160次/分，呼吸55次/分，肝肋下5Cm；诊断动脉导管未闭合并心力衰竭，正确的饮食指导是
- A.低脂饮食 B.低盐饮食 C.低蛋白饮食

- D.高脂饮食 E.高蛋白饮食
- 67.患者，男，37岁。有溃疡病史。中午饱餐后出现上腹剧烈疼痛，伴恶心，呕吐。腹肌紧张，出冷汗，休克。首先应考虑并发症是
- A.癌变 B.感染 C.大出血
D.急性穿孔 E.幽门梗阻
- 68.关于糖尿病酮症酸中毒的描述正确的是
- A.多发于老年，常无糖尿病史，常有感染、呕吐、腹泻等病史
B.起病急，有饥饿感、多汗、心悸、手抖等交感神经兴奋的表现
C.皮肤潮湿多汗，呼吸正常
D.脉搏细速，血压下降
E.尿糖阳性，尿酮阴性
- 69.根据《传染病防治法》的规定，甲类传染病要求发病后于
- A.2h内上报 B.4h内上报 C.6h内上报
D.8h内上报 E.10h内上报
- 70.患者，男，22岁。因高热、腹泻住院，确诊为伤寒。现体温下降，症状逐渐减轻。此时，应特别警惕的并发症是
- A.癫痫 B.胃溃疡 C.肠穿孔
D.视网膜炎 E.呼吸衰竭
- 71.以下不属于TIA临床特征的是
- A.发病突然 B.持续时间短暂，一般10~15min C.最长不超过24h
D.遗留神经功能缺损体征 E.多有反复发作的历史
- 72.患儿，男，9岁，有近期胫骨骨折史。突发高热、寒战、右下肢近膝关节处剧痛，活动受限。体检：局部深，压痛，白细胞 $20 \times 10^9/L$ 。最可能的诊断是
- A.骨结核 B.膝关节缺血性坏死 C.化脓性骨髓炎
D.一过性滑膜炎 E.急性血源性骨髓炎
- 73.患者，男，56岁。有高血压病史，早晨因用力排便突然出现头痛、呕吐，右侧肢体偏瘫，CT示高密度影。该患者最可能的诊断是
- A.脑出血 B.脑血栓形成 C.癫痫
D.脑栓塞 E.帕金森病
- 74.吉兰-巴雷综合征患者的主要护理问题是低效型呼吸，其主要原因是
- A.面神经炎 B.延髓麻痹 C.呼吸肌麻痹
D.肺部感染 E.周围性面瘫
- 75.患者，男，20岁。患流行性乙型脑炎，并出现中枢性呼吸衰竭，应立即静脉滴注的是
- A.碳酸氢钠 B.生理盐水 C.20%甘露醇
D.去甲肾上腺素 E.低分子右旋糖酐
- 76.阿托品治疗有机磷农药中毒可消除的症状是
- A.呼吸困难 B.肌肉抽搐 C.血压升高
D.心率加快 E.呼吸肌麻痹
- 77.慢性肾盂肾炎患者经中西医结合治疗，尿常规检查已正常。为判断该病是否治愈，应做的检查是
- A.复查尿常规 B.尿沉渣涂片检查 C.PSP排泌试验

- D.12h 尿细胞计数 E.清洁中段尿培养
- 78.急性肾小球肾炎患儿出现严重循环充血时，首选的药物是
 A.强心药 B.降压药 C.利尿药
 D.抗感染药 E.扩张血管药
- 79.胃镜检查术后护理措施不妥的是
 A.术后禁食 1d，防止胃扩张 B.嘱患者不要用力咳嗽
 C.术后可按摩腹部，减轻腹胀 D.不要吞唾液，以免呛咳
 E.检查后可出现咽痛等症状，嘱患者不要紧张
- 80.三腔管使用过程中发生窒息的最主要原因是
 A.牵引过紧 B.喉头水肿 C.气道炎症
 D.胃气囊破裂阻塞咽喉 E.血液反流入气管
- 81.15 岁的女中学生，月经周期 20~45d，行经时间 7~10d，量多，上次月经持续 10 多天未净，诊断为：功能失调性子宫出血。护士指导患者预防逆行性感染的有效措施是
 A.每日洗澡，勤换卫生护垫和内裤
 B.口服抗生素，加强体育锻炼
 C.每日用 1: 5000 的高锰酸钾溶液会阴冲洗 2 次，勤换卫生护垫和内裤
 D.出血期间 1: 5000 的高锰酸钾溶液坐浴
 E.大小便后清洗外阴，更换卫生护垫
- 82.患者，男，43 岁。因反复咯血收住入院。患者平时无咳嗽、咳痰、乏力、盗汗、低热等。考虑支气管扩张可能。为明确诊断，应进行的检查是
 A.痰细菌学培养 B.胸部 X 线检查 C.胸部 CT
 D.纤维支气管镜 E.支气管造影
- 83.呼吸衰竭患者保持呼吸道通畅，维护呼吸功能的重要环节是
 A.清除积痰 B.加压吸氧 C.使用呼吸兴奋剂
 D.控制呼吸道感染 E.纠正酸碱平衡紊乱
- 84.对行纤维支气管镜检查的患者，术前半小时内应皮下注射
 A.阿托品 B.麻黄碱 C.利多卡因
 D.肾上腺素 E.异丙肾上腺素
- 85.下列关于血气分析标本的采集方法，正确的是
 A.大多取肘静脉血 B.一般取 0.5ml 血 C.选用 1ml 干燥注射器
 D.注射器需用利多卡因润滑内壁 E.拔出针头后立即送检
- 86.对行胸腔闭式引流患者的护理措施正确的是
 A.引流瓶处于胸腔上位置 B.绝对限制患者翻身 C.绝对限制患者咳嗽
 D.每天进行数次手臂和全范围关节活动
 E.若胸腔引流管不慎滑出胸腔时，应迅速用干纱布将伤口覆盖，嘱患者吸气，并立即通知医生
- 87.过敏性紫癜最常见的类型是
 A.腹型 B.紫癜型 C.关节型
 D.肾型 E.混合型
- 88.急性白血病患者出现感染的主要原因是

天任考研

- A.长期营养不良 B.白细胞增多 C.淋巴细胞增多
D.成熟粒细胞减少 E.人体免疫力下降
- 89.患者，男，19岁，因胸痛就医，病例资料中有助于判断自发性气胸的信息是
A.胸痛发生时在与同学打篮球 B.有轻度呼吸困难
C.听诊患侧呼吸音减弱 D.胸片显示有气胸线 E.叩诊患侧呈鼓音
- 90.引起再生障碍性贫血最常见的药物是
A.氯霉素 B.磺胺药 C.保泰松
D.阿司匹林 E.苯妥英钠
- 91.张某，男，60岁，血压170/100mmHg，受凉后出现头痛、眩晕、胸闷、气急、恶心、呕吐、视力模糊，经降压治疗，病情很快好转，该病人可能的诊断是
A.恶性高血压 B.高血压危象 C.高血压脑病
D.冠心病 E.短暂性脑缺血发作
- 92.患者男性，36岁，乏力、晕厥史三天，心电图P波与QRS波无关系，P波频率90次/分，QRS波32次/分。首选哪种治疗方法
A.含化硝酸甘油 B.立即同步电复律 C.静脉注射西地兰
D.静脉注射心得安 E.安装临时起搏器
- 93.诊断膀胱破裂最简易的方法是
A.耻骨上膀胱穿刺 B.腹腔穿刺 C.膀胱镜检查
D.导尿及膀胱注水试验 E.CT检查
- 94.患者，女，38岁，患有滴虫性阴道炎，患者向护士询问内裤的处理方法
A.煮沸消毒5~10min B.日光暴晒 C.肥皂清洗
D.食醋浸泡 E.紫外线消毒
- 95.以下何种病症不是肾、输尿管结石常见的
A.腰痛和镜下血尿 B.肾绞痛时伴有恶心，呕吐
C.尿中有红细胞、白细胞 D.肾绞痛时向下肢、外阴部和大腿内侧放射
E.无痛性肉眼可见的血尿伴有条状血块
- 96.患者，男，40岁，发现右肾多发结石，左肾盂结石直径1.2cm，当发生肾绞痛时，护士可准备哪些药物
A.盐酸哌替啶+654-2 B.吗啡 C.安痛定
D.苯巴比妥钠 E.APC
- 97.下列哪种疾病的病理改变主要在肾，而临床表现是膀胱
A.肾肿瘤 B.肾结石 C.急性肾盂肾炎
D.肾结核 E.肾脓肿
- 98.患者，男，50岁，肾结核。拟行一侧肾全肾切除术，术前抗结核治疗至少要
A.1周 B.2周 C.3周
D.1个月 E.2个月
- 99.目前最常用的治疗前列腺增生的手术方式是
A.耻骨上经膀胱前列腺摘除术 B.耻骨后前列腺摘除术
C.经会阴前列腺切除术 D.经尿道前列腺电切术
E.前列腺激光切除术

- 100.患者，男，65岁，前列腺增生症并发尿潴留，做膀胱造影术时，护士应提供
- A.普通橡胶导尿管 B.前列腺导尿管 C.草状导尿管
D.气囊导尿管 E.金属导尿管
- 101.肾癌三联症是指
- A.血尿、发热、肿块 B.腰痛，肿块、血尿 C.尿急、尿频、尿痛
D.腰痛、血尿、血压升高 E.发热、血沉快、血压升高
- 102.下列有关肾细胞瘤的描述错误的是
- A.肾癌患者可能出现间歇或持续性低热 B.肾癌患者可能发生低血钙
C.肾癌患者可能出现高血压 D.肾癌患者可能出现红细胞计数增多
E.肾癌患者可能出现腰痛
- 103.肺心病呼吸衰竭患者，入院后急查血气分析为 $\text{PaO}_2 40\text{mmHg}$ ， $\text{PaCO}_2 75\text{mmHg}$ ，立即鼻导管给氧 $4\text{L}/\text{分}$ ，2小时后病人发绀减轻，但神志不清呈现昏睡状态，复查血气分析为 $\text{PaO}_2 80\text{mmHg}$ ， $\text{PaCO}_2 95\text{mmHg}$ ，此时首先应立即给予的处理是
- A.应用呼吸兴奋剂 B.应用糖皮质激素 C.加大氧流量
D.检查有无气道阻塞 E.降低氧流量
- 104.患者，男，45岁，在刺激下对性交无兴趣，且无主动性要求。考虑其表现为
- A.勃起功能障碍 B.射精功能障碍 C.早泄
D.性欲改变 E.阳痿
- 105.原发性醛固酮增多症出现的代谢紊乱为
- A.高血钾 B.尿钾排出增加 C.高血浆肾素
D.低尿钾 E.血醛固酮水平降低
- 106.患者，男，60岁，患皮质醇症而入院，此病者在活动时应注意防止因骨质疏松而引起的
- A.肌萎缩 B.病理性骨折 C.股部皮肤紫纹
D.四肢无力 E.性腺功能紊乱
- 107.骨折牵引时，下列措施中能预防过度牵引的是
- A.患肢抵床尾 B.患肢功能锻炼 C.定时测定肢体长度
D.防止牵引针左右移动 E.定时放松牵引装置
- 108.自身力量不足，需要外力协助，尤其在起动时需要帮助的骨折患者，应采用的功能锻炼方法为
- A.主动运动 B.被动运动 C.助力运动
D.手法治疗 E.肌肉等动收缩
- 109.患者高某，女性，76岁。独住，因子女不孝而厌世服毒，邻居发现后将昏迷的老人送入医院救治。在不知老人服何毒物时，护士应采取的护理措施是
- A.禁忌洗胃，待查明毒物名称后再处理 B.抽出胃内容物，再用温开水洗胃
C.用生理盐水灌肠，减少毒物吸收 D.鼻饲牛奶或蛋清水，以保护胃黏膜
E.氧气吸入，待清醒后用催吐法排出毒物
- 110.患者，女，30岁，宫内妊娠39周，孕三产二，无难产史，3h前开始规律宫缩。急诊入院检查：宫缩持续45s，间隔3min，胎心140次/分，头位宫口开大4cm，羊膜囊明显膨出，骨盆内诊正常。此时正确的处理是
- A.急诊室留观 B.破膜后住院 C.立即住院待产
D.送产房消毒接生 E.灌肠以促进产程，减少污染

- 111.骨折临床愈合后，骨痂的改造塑型主要取决于
- A.外固定的牢固性 B.肢体活动和负重所形成的应力
C.局部血液供应情况 D.骨痂的多少
E.是否很好地配合理疗，按摩及药物治疗
- 112.急性血源性骨髓炎的早期诊断中，最主要的依据是
- A.全身中毒症状严重 B.局部持续性疼痛，患肢不愿活动
C.髌端处明显深压痛 D.白细胞计数增多
E.骨髓穿刺抽得脓性液体，查有化脓菌
- 113.患者，女，12岁，X线片见第9胸椎体破坏，椎体压缩成楔形，椎弓根阴影仍清晰可见，最可能的诊断为
- A.压缩性骨折 B.脊柱结核 C.脊柱肿瘤
D.化脓性脊椎炎 E.先天性脊柱畸形
- 114.腰椎间盘突出症出现鞍区麻木，二便功能障碍，是突出椎间盘压迫
- A.脊髓 B.脊髓圆锥 C.马尾神经
D.骶1神经根 E.骶2神经根
- 115.颈椎病行前路手术及植骨椎体融合术后的护理最应重视
- A.颈前屈位，两侧颈肩放置沙袋 B.观察生命体征
C.注意伤口出血，密切观察呼吸状态 D.加强心理护理
E.预防并发症
- 116.孕妇，29岁，既往体健，近1年，来发现HBsAg阳性，但无任何症状，肝功能正常。经过十月怀胎，足月顺利分娩一4500g男婴，为阻断母婴传播，对此新生儿最适宜的预防方法是注射
- A.乙肝疫苗 B.丙种球蛋白 C.乙肝疫苗+丙种球蛋白
D.高效价乙肝免疫球蛋白 E.乙肝疫苗+高效价乙肝免疫球蛋白
- 117.患儿，女，5个月，体温38.9℃，咳嗽，呛奶，有少量痰，双肺可闻及散在的干，湿啰音，护士首先应采取的措施是
- A.温 B.咳 C.化痰
D.吸氧 E.控制感染
- 118.患儿，女，9个月，母乳喂养，腹泻2d，稀水便，每日5~6次，护士正确的饮食指导是
- A.禁食4~6h B.继续母乳喂养 C.继续添加辅食
D.给予高营养富有热量的饮食 E.口服补液期间患儿不能饮水
- 119.患者，男，30岁。因车祸致右侧胸部损伤，1h后送至急诊室，诊断开放性气胸，做胸腔闭式引流治疗。护士对其进行的正确健康教育的内容是
- A.有闭式引流瓶时要避免咳嗽 B.有闭式引流瓶时应避免下地活动
C.引流的目的是排除胸腔积气 D.引流的目的是预防肺不张
E.水封下的引流管中无气体溢出就可拔管
- 120.Codman三角X线表现主要见于
- A.骨肉瘤 B.软骨肉瘤 C.纤维肉瘤
D.恶性骨巨细胞瘤 E.骨髓瘤

二、多项选择题（每一考题下面有A、B、C、D、E五个备选答案，请从中选择两个或两个以上的最佳答案，多选、漏选、错选均不得分，每题2分，共60分）。

- 1.席尔提出的“一般适应综合征”包括以下哪些发展阶段
 - A.评价期
 - B.警告期
 - C.抵抗期
 - D.耗竭期
 - E.疲溃期
- 2.共同参与型护患关系模式包括下列哪些特点
 - A.双向性关系
 - B.心理方位为等位
 - C.护士在护患关系中占主导地位
 - D.特征为护士帮助服务对象自我恢复
 - E.以生物—心理—社会医学模式及健康为主导思想
- 3.亚当斯认为评判性思维是
 - A.收集资料，创造性地提出护理诊断和干预措施
 - B.使护理计划个体化的逻辑思维过程
 - C.使护理计划精确化的逻辑思维过程
 - D.使护理计划个体化的认知过程
 - E.使护理计划精确化的认知过程
- 4.长期卧床患者常可诱发的并发症有
 - A.肾结石
 - B.压疮
 - C.肺瘀血
 - D.坠积性肺炎
 - E.静脉血栓
- 5.关于采用局部吹氧法治疗压疮，以下叙述正确的是
 - A.氧流量为 5~6L/min
 - B.每日 1 次
 - C.每次 15min
 - D.对分泌物较多的疮面，可在湿化瓶中加 75%乙醇
 - E.治疗完毕，疮面必须用无菌纱布覆盖
- 6.下列关于睡眠时相的描述，正确的是
 - A.慢波睡眠又称正相睡眠
 - B.成人进入睡眠后，首先是慢波睡眠
 - C.越接近睡眠的后期，快波睡眠持续时间越长
 - D.两种睡眠时相状态均可直接转为觉醒状态
 - E.在觉醒状态下，不能进入慢波睡眠
- 7.医院感染中常见的易感宿主有
 - A.大面积烧伤患者
 - B.肝脏移植患者
 - C.心脏介入手术患者
 - D.长期放化疗患者
 - E.早产儿
- 8.输液过程中溶液不滴的原因有
 - A.针头阻塞
 - B.静脉痉挛
 - C.针头滑出血管外
 - D.针头斜面紧贴血管壁
 - E.压力过低
- 9.用药前必须做过敏试验的药物是
 - A.细胞色素 C、普鲁卡因
 - B.四环素、红霉素
 - C.泛影葡胺、破伤风抗毒素
 - D.洋地黄、山梨醇

E.链霉素、碘化物

10.下列关于 ARDS 的描述正确的是

- A.是由各种致病因素导致的急性、进行性呼吸困难
- B.呼吸窘迫和顽固性低氧血症为其主要临床特征
- C.通气不足是导致低氧血症的主要机制
- D.肺泡渗出液中含有大量的蛋白质
- E.抗炎介质释放过多可能与 ARDS 的发生和发展有关

11.机械通气患者可能出现的呼吸机故障有

- A.气管插管脱出
- B.气管插管滑入右主支气管
- C.黏痰堵塞人工气道
- D.单向活瓣方向装反
- E.呼吸机管道扭曲

12.关于容积控制通气，正确的说法是

- A.呼吸机完全替代患者自主呼吸
- B.气道压力完全由呼吸机控制
- C.呼吸频率完全由呼吸机控制
- D.潮气量完全由呼吸机控制
- E.不能用于有自主呼吸的患者

13.下列呼吸机通气模式中，可以由患者自主呼吸触发的通气模式为

- A.压力支持通气
- B.压力控制通气
- C.辅助控制通气
- D.容积控制通气
- E.间歇强制通气

14.无创通气的缺点有

- A.易造成单侧肺通气
- B.密闭不好，容易漏气
- C.易发生人机对抗
- D.容易移位，脱出
- E.不能完全代替自主呼吸

15.经鼻气管插管的优点有

- A.易于插入，适合于急救
- B.患者易于接受
- C.气道阻力小
- D.留置时间长
- E.便于口腔护理

16.烧伤休克期补液的调节，观察的指标是

- A.尿量
- B.心率
- C.血压
- D.末梢循环
- E.中心静脉压

17.血浆蛋白的主要功能有

- A.对酸碱有缓冲作用
- B.维持血浆胶体渗透压
- C.免疫作用
- D.与多种物质的运输
- E.血与抗凝血作用

18.循环系统疾病引起胸痛的原因包括

- A.心绞痛
- B.心肌梗死
- C.急性主动脉夹层
- D.急性心包炎
- E.心血管神经症

19.夜间阵发性呼吸困难的发作与下列哪些发病机制有关

- A.静脉回心血量增加
- B.平卧时膈肌上升，肺活量减少
- C.夜间迷走神经兴奋性增高
- D.熟睡时对缺氧更敏感
- E.夜间机体耗氧量增加

20.常用的保钾利尿剂有

- A.氢氯噻嗪
- B.呋塞米
- C.螺内酯
- D.氨苯蝶啶
- E.阿米洛利

21.使心肌收缩力增强的药物有

- A.洋地黄 B.合心爽 C.氨力农
D.米力农 E.普萘洛尔

22.全胃肠外营养支持患者可能发生的代谢性并发症有

- A.低血糖 B.空气栓塞 C.导管败血症
D.肝胆系统损害 E.高渗性非酮性昏迷

23.中心静脉插管所致的并发症为

- A.气胸 B.血胸 C.出血
D.败血症 E.臂丛神经损伤

24.菌血症的主要治疗措施包括

- A.正确处理创面 B.全身支持治疗 C.联合应用抗生素
D.大量应用激素 E.局部切开引流

25.气性坏疽局部表现为

- A.患肢胀裂样疼痛 B.明显肿胀 C.伤口恶臭
D.皮下气肿 E.伤口有浆液血性液体流出

26.影响伤口愈合的原因包括

- A.低蛋白血症 B.使用糖皮质激素 C.糖尿病
D.伤口有异物 E.局部感染

27.烧伤的严重程度取决于

- A.热力的强度 B.烧伤面积的大小 C.热力与组织接触的时间
D.烧伤的深度 E.患者的感受

28.排斥反应的表现有

- A.皮肤苍白、体温下降 B.发热、血压增高、情绪异常 C.局部肿胀、疼痛
D.尿少 E.神经功能障碍

29.属于器官移植的是

- A.输血 B.肾移植 C.肝移植
D.脂肪移植 E.血管移植

30.肿瘤的内源性因素包括

- A.物理性 B.遗传 C.内分泌
D.免疫 E.种族

三、问答题（每题 20 分，共 60 分）

（一）患者周某，女，45 岁。因“风心病、房颤”入院，主诉心悸、头晕、胸闷、四肢乏力，护士为其诊脉时发现脉搏细速、不规则，同一单位时间内心率大于脉率，听诊心率快慢不一，心律完全不规则，心音强弱不等。

1.此脉搏称为

- A.缓脉 B.间歇脉 C.绌脉
D.洪脉 E.丝脉

2.此脉搏属于

- A.频率异常 B.次数异常 C.节律异常
D.强弱异常 E.动脉壁异常

3.正确测量脉搏的方法是

- A.先测脉率，再测心率
- B.护士测脉率，医生测心率
- C.一人同时测脉率和心率
- D.一人听心率，一人测脉率，同时测 1min
- E.一人测脉率，一人计时

(二)患者，男，41岁。因胃溃疡行胃部分切除术后半年，自觉饭后有上腹饱胀不适、腹胀等消化不良现象，伴呕血一次，量少。体检：上腹轻压痛，诊断为“急性胃炎”。

1.引起此病的主要病因是

- A.手术应激
- B.饮食不当
- C.幽门螺杆菌
- D.胆汁反流
- E.自身免疫反应

2.主要护理措施不包括

- A.寻找病因
- B.感轻度不适时应禁食，以免加重胃的负担
- C.卧床休息
- D.加强心理疏导，消除恐惧
- E.进温热半流质饮食

3.急性胃炎引起上消化道出血，下列哪一项不符合诊断

- A.呕吐咖啡色液体
- B.柏油样便
- C.出血呈间歇性
- D.出血量大
- E.鲜血便

(三)患者，男，25岁。1h前头部受伤，无昏迷，无恶心、呕吐。体检：鼻腔有血性液体流出，眼眶周围及球结膜下广泛瘀血斑。

1.该患者最可能的诊断是

- A.脑震荡
- B.颅底骨折
- C.脑挫裂伤
- D.头皮裂伤
- E.脑血管破裂

2.上述患者的诊断主要依靠

- A.头部受伤史
- B.颅底 X 线摄片
- C.头部 CT
- D.头部 MRI
- E.临床表现

3.上述患者的护理措施错误的是

- A.取半坐卧位
- B.严密观察意识、生命体征
- C.从鼻腔滴入止血药
- D.预防性应用抗生素
- E.避免用力排便