

全真模拟试卷（二）

一、单项选择题（每一考题下面有 A、B、C、D、E 五个备选答案，请从中选择一个最佳答案，每题 2 分，共 240 分）。

1. 为昏迷患者插管至 15Cm 时要将其头部托起，其目的是
A. 加大咽喉部通道的弧度 B. 以免损伤食管黏膜 C. 减轻患者痛苦
D. 避免出现恶心 E. 使喉部肌肉放松便于插入
2. 下列哪种颜色是剧毒药瓶上的标签颜色
A. 蓝色 B. 红色 C. 黑色
D. 绿色 E. 黄色
3. 现代医学已开始以下列哪项作为死亡的判断标准
A. 心跳停止 B. 呼吸停止 C. 脑死亡
D. 心电图平直 E. 瞳孔散大
4. 应用硝酸甘油缓解心绞痛，正确的护理是
A. 药物用温开水送服 B. 药物置口中，立即咽下
C. 舌下含化，药物被唾液溶解使吸收减少 D. 含药时宜平卧以防低血压
E. 观察头昏、血压偏高表现
5. 冠心病猝死的原因多为
A. 窒息 B. 脑梗死 C. 肺梗死
D. 心脏破裂 E. 严重的心律失常
6. 根据原发性高血压危险的分层，属于高危险组的是
A. 高血压 1 级，不伴有危险因素者 B. 高血压 1 级伴 1~2 个危险因素者
C. 高血压 2 级不伴或伴有不超过 2 个危险因素者 D. 高血压 3 级伴有至少 3 个危险因素者
E. 高血压 1~2 级伴靶器官损害及相关的临床患者
7. 下列降压药物在治疗过程中常易引起干咳症状的是
A. 美托洛尔 B. 维拉帕米 C. 尼群地平
D. 伊贝沙坦 E. 卡托普利
8. 胃溃疡患者典型的疼痛节律是
A. 疼痛—进食—缓解 B. 进食—疼痛—缓解 C. 疼痛—禁食—疼痛
D. 疼痛—便意—便后缓解 E. 便意—疼痛—便后缓解
9. 晚期肝硬化最常见的死亡原因是
A. 上消化道出血 B. 感染 C. 肝性脑病
D. 原发性肝癌 E. 肝肾综合征
10. 出现黑便提示上消化道出血量在
A. >5ml B. 5~20ml C. 20~30ml
D. 30~50ml E. 50~100ml
11. 质子泵抑制剂用于上消化道出血的主要机制是
A. 使局部血管收缩 B. 促进凝血因子的作用 C. 促进血小板的生成
D. 促进胃酸分泌，降低胃液 pH E. 抑制胃酸分泌，提高胃液 pH

12.肝性脑病第三期的主要表现是

- A.性格改变和行为异常 B.意识错乱和睡眠障碍 C.昏睡和精神错乱
D.意识完全丧失 E.扑翼样震颤无法引出

13.治疗溃疡性结肠炎的首选药物是

- A.西咪替丁 B.肾上腺皮质激素 C.奥曲肽
D.柳氮磺胺吡啶 E.克拉霉素

14.终末血尿提示病变位于

- A.尿道 B.膀胱颈以上 C.后尿道或膀胱基底部
D.肾脏 E.输尿管

15.膀胱刺激征是指

- A.尿失禁、尿多 B.排尿困难、尿滴沥 C.尿痛、尿急
D.夜尿增多、尿频 E.尿频、尿急、尿痛

16.肾病综合征的主要并发症是

- A.肾功能不全 B.动脉粥样硬化 C.肾静脉血栓
D.下肢静脉血栓 E.感染

17.严重高尿酸血症患者开始透析时易发生

- A.低血压 B.失衡综合征 C.出血
D.过敏反应 E.心绞痛

18.治疗特发性血小板减少性紫癜的首选药物是

- A.维生素 C B.酚磺乙胺
C.糖皮质激素 D.长春新碱 E.环孢素

19.下列哪一种并发症是胃大部切除术后患者的远期并发症

- A.术后出血 B.十二指肠残端破裂 C.胃肠吻合口破裂
D.术后梗阻 E.胆汁反流性胃炎

20.内痔的好发部位是截石位的

- A.2点、7点、11点 B.2点、6点、10点 C.3点、9点、12点
D.3点、7点、11点 E.4点、8点、12点

21.胆管 T 管引流的患者胆管远端通畅的表现是

- A.腹痛和黄疸减轻，引流量增多 B.体温正常，引流量增多
C.上腹胀痛，引流量骤减 D.食欲好转，黄疸消退，引流量减少
E.黄疸消退，引流量增多，食欲无变化

22.一位大隐静脉曲张患者，在做浅静脉瓣功能试验时，塌陷的大隐静脉在 10s 内由上而下迅速充盈。说明

- A.交通瓣膜闭锁不全 B.大隐静脉瓣膜闭锁不全
C.股静脉有阻塞 D.股静脉瓣闭锁不全 E.深静脉阻塞

23.通过改善毛细血管通透性降低颅内压的治疗方法是

- A.脱水治疗 B.过度换气 C.激素治疗
D.冬眠低温治疗 E.脑室穿刺外引流术

24.颅内动静脉畸形最常见的首发症状是

- A.癫痫 B.意识障碍、头痛、呕吐

- C.运动障碍 D.语言障碍 E.感觉障碍
- 25.患者，男，38岁，颅脑创伤，住院后患者的卧位是抬高床头15~30cm，其目的是
- A.利于呼吸通畅 B.防止呕吐窒息 C.舒适
D.利于血液循环 E.减轻脑水肿
- 26.患者，男，65岁，低热，咳嗽并痰中带血丝3个月。胸片显示左肺上叶不张，少量胸膜腔积液。为明确病理诊断，应首选
- A.纵隔镜检查 B.开胸探查 C.胸腔镜检查
D.支气管镜检查 E.经胸壁穿刺活组织检查
- 27.肺癌患者出现一侧眼睑下垂，瞳孔缩小，眼球内陷，额部与胸部少汗的原因是
- A.动眼神经受压 B.交感神经受压 C.喉返神经受压
D.上腔静脉受阻 E.肋间神经受压
- 28.食管癌食管明显梗阻的患者术前减轻食管黏膜水肿的措施是
- A.术前禁食 B.营养支持 C.纠正水电解质、酸碱失衡
D.加强口腔卫生 E.术前3d温盐水洗胃
- 29.风湿性心脏病行二尖瓣瓣膜置换术后1个月，凝血功能检查示PTT为20s，可告知患者
- A.继续服用原剂量抗凝药 B.需要增加抗凝药药量 C.需要减少抗凝药药量
D.需要立即重新检查凝血功能 E.使用量适当，不需要继续监测
- 30.人际间最传神的非语言沟通的表现形式是
- A.面部表情 B.着装 C.眼神
D.身体姿势 E.环境安排
- 31.“功能制护理”的大力推行是受以下哪种护理哲学思潮的影响
- A.禁欲主义 B.浪漫主义 C.实用主义
D.人本主义 E.存在主义
- 32.二人搬运患者的正确方法是
- A.甲托背部，乙托臀部 B.甲托头部，乙托臀部 C.甲托头、背部，乙托臀、膝部
D.甲托头、颈、肩，腰部，乙托臀、膝部 E.甲托头，肩部，乙托臀、膝部
- 33.椎管内麻醉后须去枕平卧6h，其目的为
- A.改善脑部血液循环 B.预防脑压降低 C.预防脑部感染
D.预防脑缺血 E.预防血压降低
- 34.心包积液患者常见的脉搏是
- A.水冲脉 D.绌脉 C.奇脉
D.交替脉 E.细脉
- 35.患者，男，60岁。因颈椎病入院手术治疗。术前锻炼的项目不包括
- A.颈部前屈 B.颈部后伸 C.颈部侧屈
D.颈部侧转 E.头上加压
- 36.乙醇拭浴后，体温降至何值应取下头部冰袋
- A.37.5℃ B.38.0℃ C.38.5℃
D.39.0℃ E.39.5℃
- 37.患者，男，68岁。刺激性咳嗽3周，经抗生素治疗未缓解。胸部X线显示右肺有原因不明的阴影，此时应进一

步检查下列哪一项

- A.肺功能测定 B.胸腔穿刺术 C.动脉血气分析
D.放射性核素检查 E.纤维支气管镜检查

38.患者，男，70岁。诊断为慢性阻塞性肺气肿，其最可能出现的酸碱失衡是

- A.代谢性酸中毒 B.代谢性碱中毒 C.呼吸性酸中毒
D.呼吸性碱中毒 E.代谢性酸中毒合并呼吸性碱中毒

39.患者，男，68岁。间断性心前区疼痛1个月，多在夜间发作，与活动无关，每次发作15min，发作时心电图II、I，aVF导联ST段抬高。最可能的诊断为

- A.稳定型心绞痛 B.恶化型心绞痛 C.急性心肌梗死
D.变异型心绞痛 E.卧位型心绞痛

40.患者，男，46岁。诊断为“上消化道出血”、为明确出血原因，首选的检查方法是

- A.大便隐血试验 B.X线钡剂造影 C.内镜检查
D.血常规检查 E.B超检查

41.患者，女，45岁。患类风湿关节炎12年。3d前再次出现双手腕肿痛。下列检查中，提示患者病情活动的指标是

- A.血沉偏低 B.C反应蛋白增高 C.关节腔滑液增多
D.血常规示轻度贫血 E.关节X线检查示关节端骨质疏松

42.患者，男，15岁。平素体健，每于剧烈运动后出现胸闷、咳嗽和呼吸困难。其最可能的诊断是

- A.运动性哮喘 B.支气管扩张 C.急性支气管炎
D.慢性支气管炎 E.咳嗽变异性哮喘

43.对三度房室传导阻滞反复发作，并伴有阿-斯综合征者，首选的治疗是

- A.糖皮质激素 B.阿托品 C.异丙肾上腺素
D.安置人工心脏起搏器 E.麻黄碱

44.接受降压药物治疗的高血压患者，起床时晕倒，片刻后清醒，首先考虑是

- A.心源性休克 B.高血压危象 C.高血压脑病
D.急性左心衰竭 E.体位性低血压

45.患者，男，37岁。有溃疡病史。中午饱餐后出现上腹剧烈疼痛，伴恶心、呕吐。腹肌紧张，出冷汗，休克。首先应考虑的是

- A.癌变 B.感染 C.大出血
D.急性穿孔 E.幽门梗阻

46.脑部基底节出血的典型表现是

- A.交叉性瘫痪 B.眼球震颤 C.中枢性高热
D.失语 E.三偏综合征

47.患者，男，20岁。患流行性乙型脑炎，并出现中枢性呼吸衰竭，应立即静脉滴注的是

- A.碳酸氢钠 B.生理盐水 C.20%甘露醇
D.去甲肾上腺素 E.低分子右旋糖酐

48.阿托品治疗有机磷农药中毒可消除的症状是

- A.呼吸困难 B.肌肉抽搐 C.血压升高
D.心率加快 E.呼吸肌麻痹

49.三腔管使用过程中发生窒息的最主要原因是

- A.牵引过紧 B.喉头水肿 C.气道炎症
D.胃气囊破裂阻塞咽喉 E.血液反流入气管
- 50.患儿，2岁。因肺炎伴急性心力衰竭需立即进行抢救，首选的药物是
A.地高辛口服 B.洋地黄肌内注射 C.毛花苷丙缓慢静脉注射
D.硝普钠静脉点滴 E.酚妥拉明静脉点滴
- 51.患者，男，43岁。因反复咯血收住入院。患者平时无咳嗽、咳痰、乏力、盗汗、低热等。考虑支气管扩张可能。为明确诊断，应进行的检查是
A.痰细菌学培养 B.胸部X线检查 C.胸部CT
D.纤维支气管镜 E.支气管造影
- 52.目前根治慢性粒细胞白血病的唯一方法是
A.中药治疗 B.免疫治疗 C.放射治疗
D.化学治疗 E.骨髓移植
- 53.患者，男，40岁，发现右肾多发结石，左肾盂结石直径1.2Cm，当发生肾绞痛时，护士可准备哪些药物
A.盐酸哌替啶+654-2 B.吗啡 C.安痛定
D.苯巴比妥钠 E.APC
- 54.目前最常用的治疗前列腺增生的手术方式是
A.耻骨上经膀胱前列腺摘除术 B.耻骨后前列腺摘除术
C.经会阴前列腺切除术 D.经尿道前列腺电切术 E.前列腺激光切除术
- 55.主要措施是通过强力杀灭精子达到节育目的的节育方法是
A.输精管结扎术 B.节育环 C.输精管注射绝育法
D.避孕套 E.外用避孕药膜
- 56.脊髓半切征患者损伤对侧肢体的
A.痛觉和温觉丧失 B.深感觉和温觉丧失 C.运动和痛觉丧失
D.运动和温觉丧失 E.运动和深感觉丧失
- 57.杜加试验（Dugas征）阳性可见于
A.肩关节脱位 B.肘关节脱位 C.Colles骨折
D.肱骨课骨折 E.锁骨骨折
- 58.患者，男，36岁，因脊髓型颈椎病接受手术治疗，对其出院指导中正确的是
A.避免猛力转头动作
B.告诉患者1~2周后症状即可完全消失
C.乘坐高速行驶的汽车时，应面对正前方或正后方而坐
D.日常生活中减少颈部活动，尽量保持颈部固定
E.枕头高度以头颈部未压上时有一拳高为宜
- 59.恶性骨肿瘤的X线表现主要为
A.边缘不清楚，骨质破坏，骨膜反应明显 B.边缘清楚，骨质破坏，骨膜反应明显
C.边缘不清楚，骨质破坏，无骨膜反应 D.边缘不清楚，骨质增生，无骨膜反应
E.边缘清楚，骨质增生，无骨膜反应
- 60.X线片表现为“葱皮状”反应性骨形成主要见于
A.软骨肉瘤 B.尤文肉瘤 C.恶性骨巨细胞瘤

- D.骨髓瘤 E.骨转移性肿瘤
- 61.本周氏蛋白对诊断下列哪一种骨肿瘤具有重要意义
- A.骨肉瘤 B.尤文肉瘤 C.多发性骨髓瘤
D.软骨肉瘤 E.脊索瘤
- 62.自 1964 年以来，中国护理界群众性团体称为
- A.中国护士会 B.中华护士学会 C.中华护理学会
D.中国护理学会 E.中华护士会
- 63.压力是指个体对作用于自身的
- A.内环境刺激的特异性反应 B.内环境刺激的非特异性反应
C.外环境刺激的特异性反应 D.外环境刺激的非特异性反应
E.内外环境刺激的非特异性反应
- 64.实现 2000 年人人享有健康保健的基本途径是
- A.卫生宣传 B.健康教育 C.健康促进
D.保健服务 E.信念干预
- 65.执行给药医嘱属于
- A.非护理措施 B.独立性护理措施 C.合作性护理措施
D.依赖性护理措施 E.辅助性护理措施
- 66.口腔护理时，对长期使用抗生素者，应注意观察口腔
- A.有无黏膜溃疡 B.有无真菌感染 C.口唇是否干裂
D.有无口腔异味 E.牙龈是否肿胀出血
- 67.下列关于影响睡眠因素的描述，正确的是
- A.睡眠时间与年龄成正比
B.环境的改变会造成入睡时间延长及快波睡眠减少
C.过度疲劳有助于入睡
D.短期使用安眠药可产生戒断反应
E.补充激素不能改善绝经期妇女的睡眠质量
- 68.需要反复使用冷.热疗时，中间必须间隔
- A.20min B.30min C.40min
D.1h E.2h
- 69.正常尿液的 pH 是
- A.中性 B.酸性 C.碱性
D.弱碱性 E.弱酸性
- 70.患者，男，45 岁。患急性胰腺炎入院。经非手术治疗病情好转准备出院。下列患者的陈述中，提示患者对自身保健原则理解有误的是
- A. “我每天饭量要减少，分四五次吃”
B. “我要少吃油腻的食物”
C. “每天一杯红酒有助于我康复”
D. “我的饮食节律必须规律，食物以蔬菜为主”
E. “我应当检查一下，有胆管的疾病要尽早治疗”

71. 静脉注射过程中，发现患者局部肿胀、疼痛，试抽有回血，可能的原因是
A. 静脉痉挛 B. 针头刺入过深，穿破对侧血管壁
C. 针头斜面一半在血管外 D. 针头斜面紧贴血管内壁
E. 针头刺入皮下
72. 不可献血的人群有
A. 肝功能正常 B. 乙肝表面抗原阳性 C. 乙肝表面抗体阳性
D. 曾患疟疾，已治愈 3 年 E. AB 型血
73. 心肺复苏后患者的气管插管不得超过
A. 24h B. 48h C. 72h
D. 84h E. 90h
74. 尿液呈浓茶色或酱油色，常见于
A. 肾盂肾炎 B. 泌尿系结石 C. 急性溶血
D. 肝细胞性黄疸 E. 肾结核
75. 下列治疗急性肺水肿的措施中，不恰当的是
A. 静脉注射氨茶碱 B. 口服地高辛 C. 高流量吸氧
D. 取坐位两腿下垂 E. 皮下注射吗啡
76. 癫痫大发作时最重要的护理是
A. 避免外伤 B. 不可强力按压肢体 C. 仅持呼吸道通畅
D. 严密观察意识和瞳孔的变化 E. 禁用口表测试体温
77. 猪带绦虫比牛带绦虫的危害性严重的主要原因是
A. 吸收大量的营养 B. 虫体代谢产物的毒害作用
C. 囊尾蚴寄生所造成的损害 D. 六钩蚴穿过组织时的破坏作用
E. 头节小钩对肠壁的损伤作用
78. 关于 TIA 的描述，不正确的是
A. 起病突然，历时短暂 B. 可反复发作 C. 恢复完全，不留后遗症
D. 积极脱水、降颅压治疗 E. 积极抗凝、抗血小板聚集治疗
79. 电动吸液器贮液瓶内吸出液不宜超过 2/3，以免液体吸入何处而损坏机器
A. 电动机内 B. 气泵内 C. 压力表内
D. 气体过滤器内 E. 开关内
80. 水痘—带状疱疹病毒主要潜伏于
A. 真皮层皮肤附属器 B. 基底膜带 C. 脊髓后根神经节
D. 感觉神经轴索 E. 运动神经轴索
81. 令肱骨外上炎患者最痛的运动是
A. 被动屈腕 B. 被动伸腕 C. 抗阻屈腕
D. 抗阻伸腕 E. 被动屈肘
82. 颈椎病可能引起的并发症不包括
A. 胸出口综合征 B. 颈椎狭窄 C. 脊髓病
D. 椎基底动脉供血不足 E. 复合性区域性疼痛综合征 (RSD)
83. 下列属阿片受体拮抗药的是

- A.芬太尼 B.喷他佐辛（镇痛新） C.奇曼丁
D.西乐保 E.纳洛酮
- 84.I、II类区域工作人员手培养监测标准细菌总数为
A.≤15cfu/cm² B.≤10cfu/cm² C.≤8cfu/cm²
D.≤5cfu/cm² E.以上都不对
- 85.肥皂刷手法需刷至
A.前臂近端 B.肘部 C.肘上 5cm
D.肘上 10cm E.肘上 15cm
- 86.患者，男，43岁，因胃溃疡行胃大部切除术，术后切口血肿，但尚未化脓，则该患者的切口为
A. I类切口/丙级愈合 B. II类切口/乙级愈合 C. II类切口/丙级愈合
D. III类切口/乙级愈合 E. III类切口/丙级愈合
- 87.患者，男，62岁。Miles手术后腹部正中切口出现红肿，压痛明显，未见脓肿，目前应进行以下哪种处理
A.涂 3%过氧化氢 B.红外线照射 C.涂 2%碘酊
D.拆线引流 E.涂 10%硝酸银
- 88.关于气囊止血带的使用，不恰当的方法为
A.每次放松 5~10min B.连续使用时间最多不超过 2h
C.连续使用时间为 60min D.绑扎下肢充气压力为 80kPa（600mmHg）
E.绑扎上肢充气压力为 40kPa（300mmHg）
- 89.需要延长拆线时间的是
A.特异性感染伤口 B.老年人.营养不良的患者 C.颈部伤口
D.有缝线反应 E.感染伤口
- 90.患者，女，23岁，左小腿挫裂伤一周，创面约 15Cmx3Cm，有较多坏死组织与脓液，创面湿敷应选用的溶液是
A.攸锁溶液 B.5%氯化钠 C.0.1%雷佛奴尔
D.0.02%呋喃西林 E.3%过氧化氢
- 91.1919年率先颁布《护理法》的是
A.英国 B.荷兰 C.美国
D.波兰 E.日本
- 92.休克患者应采取
A.去枕仰卧位 B.侧卧位 C.俯卧位
D.半坐卧位 E.中凹卧位
- 93.下列关于梦游症的描述，正确的是
A.主要见于成年男性 B.随年龄的增长，症状逐渐明显
C.梦游过程中不能回答他人的提问 D.为中枢神经延缓成熟所致
E.醒后对所发生的活动可以回忆
- 94.适用于内镜消毒的消毒剂是
A.过氧乙酸 B.戊二醛 C.环氧乙烷
D.乙醇 E.碘伏
- 95.潮式呼吸的特点是
A.呼吸暂停，呼吸减弱，呼吸增强反复出现

- B.呼吸减弱，呼吸增强，呼吸暂停反复出现
 C.呼吸浅慢，逐渐加快加深再变浅慢，呼吸暂停后，周而复始
 D.呼吸深快，呼吸暂停，呼吸浅慢，三者交替出现
 E.呼吸深快，逐步浅慢，以至暂停，反复出现
- 96.当患者患有阿米巴痢疾或肠套叠时，其粪便为
 A.暗红色 B.鲜红色 C.柏油样便
 D.陶土色 E.果酱样便
- 97.青霉素过敏试验皮内注射的剂量是
 A.10U B.50U C.80U
 D.100U E.150U
- 98.超声波雾化器在使用过程中，水槽内的水温超过多少时应及时调换冷蒸馏水
 A.30℃ B.40℃ C.50℃
 D.60℃ E.70℃
- 99.发生溶血反应时，护士首先应
 A.测量血压、脉搏、呼吸 B.通知医生和家属 C.安慰患者，控制患者情绪
 D.热敷腰部，控制腰痛 E.停止输血，给患者吸氧并保留余血
- 100.危重患者护理中首先观察
 A.意识状态的改变 B.有无脱水，酸中毒 C.体温、脉搏、呼吸、血压、瞳孔
 D.肢体活动情况 E.大小便情况
- 101.吞服强酸、强碱类腐蚀性药物的患者，切忌进行的护理操作是
 A.口腔护理 B.洗胃 C.导泻
 D.灌肠 E.输液
- 102.临终患者最早出现的心理反应期是
 A.忧郁期 B.愤怒期 C.否认期
 D.接受期 E.协议期
- 103.阻塞性黄疸的临床表现不含
 A.皮肤暗黄色 B.皮肤瘙痒 C.出血倾向明显
 D.尿呈浓茶样 E.粪便呈陶土色
- 104.一男性住院糖尿病患者，62岁，身高175cm，体重85kg。计算其每日所需总热量为
 A.7350kJ B.7700kJ C.8400kJ
 D.8820kJ E.10220kJ
- 105.一位服用优降糖的糖尿病患者爬山后感到饥饿、心慌，且手抖，伴大汗，可能是由于
 A.合并胃溃疡 B.糖尿病加重 C.合并高血压
 D.出现低血糖 E.合并甲亢
- 106.有协助排便作用的肌束是
 A.膈肌 B.腹肌 C.肛提肌
 D.肛门内括约肌 E.肛门外括约肌
- 107.有助于发现伤寒带菌者的检查是
 A.H抗体 B.O抗体 C.Vi抗体

- D.O 抗体+Vi 抗体 E.H 抗体+Vi 抗体
- 108.下列何种药物可抑制大脑中假神经递质的形成
- A.苯乙酸 B.谷氨酸钾 C.支链氨基酸
D.苯甲酸钠 E.鸟氨酸门冬氨酸
- 109.为评估患者健康状况，收集资料时常采用的沟通技巧是
- A.沉默 B.倾听 C.抚摸
D.开放自我 E.用词
- 110.导尿消毒外阴时常选用的消毒剂是
- A.70%乙醇 B.2%碘酊 C.0.1%的苯扎溴铵
D.0.1%的呋喃西林 E.0.2%碘伏
- 111.关于体液平衡失调的叙述，下列错误的是
- A.成年男性体液总量占体重的 60%
B.细胞内液大部分在骨骼肌内，占体重的 40%
C.组织间液和血浆称细胞外液，占体重的 20%
D.位于体腔内的液体称为第三间隙，属于功能性细胞外液
E.体液的主要成分是水 and 电解质
- 112.患者，女，因反复呕吐致低钾血症，患者精神倦怠周身无力，腱反射减弱，适宜的护理诊断是
- A.低于机体需要量 B.活动无耐力 C.低效性呼吸状态
D.营养失调 E.有受伤的危险
- 113.下列哪种变化最易使醛固酮分泌增加
- A.细胞内液容量减少 B.细胞外液容量增加 C.血容量减少
D.细胞内液容量增加 E.细胞外液容量减少
- 114.静脉补充钾盐时输入钾量的速度应控制在
- A.<10mmol/h B.<15mmol/h C.<20mmol/h
D.<25mmol/h E.<30mmol/h
- 115.低钙血症的早期临床表现为
- A.腱反射亢进 B.腱反射消失 C.手足抽搐
D.肌肉疼痛 E.口周、指尖麻木感
- 116.血管升压素和醛固酮分泌均增加时
- A.尿量减少，钠排出减少 B.尿量增加，钠排出减少
C.尿量正常，钠排出正常 D.尿量减少，钠排出增加
E.尿量增加，钠排出增加
- 117.内脏器官的损害一般在休克发生多长时间出现
- A.>16h B.>8h C.>10h
D.>12h E.>24h
- 118.患者误输异型血后无尿 3d，无休克，下列最有效的治疗是
- A.输注地塞米松 B.输注速尿 C.输注碳酸氢钠
D.输注甘露醇 E.血液透析
- 119.患者，女，38 岁，因骨盆骨折，肝破裂，失血性休克入院，治疗中出现呼吸加快，呼吸窘迫，口唇发绀，双肺

闻及湿啰音， $\text{PaO}_2 < 8.0\text{kPa}$ 。有效处理为

- A.高浓度口罩吸氧 B.呼气终末负压通气 C.人工呼吸
D.使用呼吸兴奋剂 E.呼气终末正压通气

120.患者，男，急性胰腺炎并发肾衰竭，欲行血液透析，下列属于血液透析禁忌证的是

- A.血清尿素氮(BUN) $> 30\text{mmol/L}$ B.血清钾 $> 6.5\text{mmol/L}$
C.血清肌酐 $> 908\text{pmol/L}$ D.严重酸中毒或碱中毒
E.休克

二、多项选择题（每一考题下面有 A、B、C、D、E 五个备选答案，请从中选择两个或两个以上的最佳答案，多选、漏选、错选均不得分，每题 2 分，共 60 分）。

1.以下关于压疮的叙述正确的是

- A.引起压疮的最主要原因是压力因素
B.半卧位时剪切力是导致压疮的主要原因
C.老年患者患压疮的危险性较大
D.压疮危险因素评分大于 16 分时易发生压疮
E.患者营养状况出现负氮平衡时，患压疮的危险性增大

2.产生基本呼吸节律性的部位是

- A.脊髓 B.延髓 C.脑桥
D.间脑 E.大脑皮质

3.与肺癌有关的因素包括

- A.吸烟 B.石棉职业暴露 C.空气污染
D.食物中的维生素 A E.电离辐射

4.PTE 患者有下列哪些情况不能进行抗凝治疗

- A.消化道溃疡大便潜血阳性 B.妊娠 4 个月 C.凝血因子 III 缺乏
D.肝硬化 E.血压 184/112mmHg

5.一位 COPD 患者于一阵剧咳后突感左侧胸痛，气急加剧。体格检查发现左侧胸部叩诊呈鼓音，听诊呼吸音消失，此时患者还可能出现哪些体征

- A.左侧胸廓饱满 B.左侧语颤增强 C.左侧肋间隙增宽
D.气管及心脏向左侧移位 E.左侧呼吸运动增强

6.ARDS 患者正确的液体管理措施是

- A.使液体出入量处于平衡状态 B.输液以胶体液为主 C.适当使用利尿剂
D.输血宜用新鲜血 E.血压下降时应大量快速输液

7.下列有关胸外心脏按压的叙述正确的是

- A.平卧，背部垫硬板 B.每按压 15 次做 2 次口对口呼气
C.按压次数为每分钟 50~60 次 D.按压时双肘伸直
E.按压时使胸骨下陷 4~5Cm

8.采用格拉斯哥昏迷计分法判断患者的意识状态时应了解的内容包括

- A.睁眼反应 B.语言反应 C.运动反应
D.肌肉张力 E.瞳孔对光反应

9.ICU 感染的危险因素包括

- A.患者的病情重 B.侵入性操作多 C.抗菌药应用不足
D.环境拥挤 E.患者周转快
- 10.标记胃管时，插入长度可用下列哪种方法测得
A.前额发际至胸骨柄 B.前额发际至胸骨剑突处
C.鼻尖至胸骨柄 D.耳垂经鼻尖至胸骨剑突处
E.耳垂至胸骨柄
- 11.席尔提出一般适应综合征包括以下哪个发展阶段
A.评价期 B.警告期 C.抵抗期
D.耗竭期 E.疲溃期
- 12.下面属于给药“五个准确”的是
A.准确的药物 B.准确的剂量 C.准确的途径
D.准确的时间 E.准确的医嘱
- 13.有下列哪些情况存在时，宜尽早建立人工气道，进行人工通气
A.严重呼吸衰竭和 ARDS 患者经积极治疗，情况无改善甚至恶化
B.哮喘急性发作患者呼吸频率>30 次/min
C.重症肺炎患者经高流量给氧后 PaO₂，为 45mmHg
D.军团菌肺炎患者神志不清，意识逐渐模糊
E.心源性肺水肿患者自主呼吸微弱
- 14.以下关于心源性水肿特点的叙述正确的有
A.多出现在身体下垂部位 B.在下午加重 C.多出现在颜面部
D.晨起加重 E.重者伴胸水，腹水
- 15.常用的保钾利尿剂有
A.氢氯噻嗪 B.呋塞米 C.螺内酯
D.氨苯蝶啶 E.阿米洛利
- 16.气性坏疽局部表现为
A.患肢胀裂样疼痛 B.明显肿胀 C.伤口恶臭
D.皮下气肿 E.伤口有浆液血性液体流出
- 17.烧伤的严重程度取决于
A.热力的强度 B.烧伤面积的大小 C.热力与组织接触的时间
D.烧伤的深度 E.患者的感受
- 18.排斥反应的表现有
A.皮肤苍白，温度下降 B.发热、血压增高.情绪异常
C.局部肿胀，疼痛 D.尿少 E.神经功能障碍
- 19.美国哲学学会（APA）认为属于评判性思维核心认知技能的是
A.解释 B.分析 C.评估
D.推论 E.自我调控
- 20.打开后若未被污染有效期为 24h 的有
A.无菌容器 B.无菌包 C.无菌溶液
D.无菌手套 E.无菌持物钳

21.需缓慢静注的药物有

- A.西地兰 B.地塞米松 C.呋塞米
D.维拉帕米 E.肾上腺素

22.预激综合征并发房室折返性心动过速时，首选药物为

- A.腺苷 B.心律平 C.维拉帕米
D.胺碘酮 E.奎尼丁

23.以下哪些心电图表现符合心房颤动

- A.P 波消失 B.出现间隔均匀，形状相似的 F 波
C.R-R 间隔绝对不等 D.QRS 波增宽、畸形
E.房室呈 2：1 或 3：2 传导

24.判断心脏骤停的指标除心音消失外，还有

- A.瞳孔缩小 B.发绀 C.血压测不到
D.大动脉搏动消失 E.突然意识丧失或抽搐

25.甲状腺功能亢进手术治疗后较严重的并发症是

- A.出血 B.呼吸困难 C.手足抽搐
D.呛咳或误吸 E.失音

26.腹股沟斜疝与直疝的鉴别项目有

- A.疝环压迫试验 B.能否进入阴囊 C.疝块外形
D.疝囊颈与腹壁下动脉的关系 E.透光试验

27.评判性思维的专业标准包括

- A.专业标准 B.评价标准 C.专业职责标准
D.伦理标准 E.权利法案

28.下列测量脉搏的方法中正确的是

- A.用食指、中指两指诊脉 B.患者剧烈活动后应休息 20min 再测
C.异常脉搏需测 1min D.绌脉者先测心率，后测脉率
E.按压力量适中

29.新鲜血与库血的区别是

- A.血小板的数量 B.红细胞数量 C.酸碱度不同
D.血浆蛋白量的多少 E.血钾离子浓度

30.自身免疫性胃炎伴恶性贫血的原因为

- A.存在内因子抗体 B.壁细胞数量增多 C.维生素 B₁₂ 吸收障碍
D.胃酸增多 E.存在壁细胞抗体