

全真模拟试卷（四）

一、单项选择题（每一考题下面有 A、B、C、D、E 五个备选答案，请从中选择一个最佳答案，每题 1.5 分，共 180 分）。

1.护理人员应用自己的专业知识及技能决定护理措施及护理服务，属于

- A.独立性护理功能 B.合作性护理功能 C.技术性护理功能
D.依赖性护理功能 E.艺术性护理功能

2.疾病对社会的影响不包括

- A.降低社会生产力 B.降低和消耗社会的医疗资源 C.造成传染
D.社会经济的负担加重 E.浪费社会的医疗资源

3.关于科尔伯格道德发展理论的陈述，错误的是

- A.道德判断是一个是非对错的问题
B.不同文化环境中道德发展的内容不同
C.并非所有人的道德发展都能达到最高水平
D.每个人道德观念形成的时间并不完全相同
E.前习俗道德期以赏或罚作为道德判断的标准

4.下列哪一项不是社会认知的特征

- A.社会认知的准确性 B.知觉信息的选择性 C.社会认知的互动性
D.认知行为的一致性 E.社会认知的评估性

5.沟通的最高层次是

- A.情感性沟通 B.共鸣性沟通 C.一般性沟通
D.事务性沟通 E.分享性沟通

6.护士经常用到的评判性思维的评价标准可分为

- A.一类 B.三类 C.二类
D.四类 E.五类

7.不属于患者资料收集范围的是

- A.患者的一般情况 B.患者的生活方式 C.患者的用药过敏史
D.家庭成员的婚恋史 E.患者对疾病的认识

8.文化的超地域性，其含义是

- A.有些文化仅存在于某一地域，不是全人类性文化
B.文化一旦在某一地域发展，就无法为其他地域所接受
C.自然科学先是地域文化，后为超地域文化
D.文化随着人类的出现和发展而产生与发展
E.文化发展初期，均有明显的超地域特征

9.奥瑞姆认为人的自护能力包括多少个方面

- A.11 个 B.10 个 C.9 个
D.8 个 E.7 个

10.下列哪项是护理道德修养的特点

- A.重要性 B.自觉性 C.被动性

- D.复杂性 E.理论性
- 11.我国第一个全国性的关于医疗事故处理问题的行政法规颁布于
A.1987年 B.1980年 C.1989年
D.1992年 E.1994年
- 12.健康教育学围绕什么中心而发展
A.以人类社会发展为中心 B.以健康教育发展为中心
C.以提高人类健康水平为中心 D.以提高健康保健水平为中心
E.以人类健康发展为中心
- 13.护士的基本任务不包括
A.预防疾病 B.促进健康 C.诊断疾病
D.恢复健康 E.减轻痛苦
- 14.护理人员应嘱坐在轮椅上的患者
A.扶好扶手，尽量向后坐 B.扶好扶手，尽量向前坐
C.扶好扶手，身体向前倾 D.两手放膝上，向前坐
E.两手放膝上，尽量向后坐
- 15.为患者进行灌肠时，应协助患者采取的卧位是
A.侧卧位 B.俯卧位 C.去枕仰卧位
D.头高足低位 E.头低足高位
- 16.当患者有炎症感染时，皮肤出现的改变是
A.发红 B.湿冷 C.发绀
D.皮温降低 E.苍白
- 17.睡眠中枢位于
A.大脑皮层 B.脑干尾端 C.上行抑制系统
D.蝶鞍区 E.第三脑室
- 18.下列关于睡眠时相的描述，正确的是
A.成人进入睡眠后，首先是快波睡眠
B.越接近睡眠的后期，慢波睡眠的持续时间越长
C.两种睡眠时相均可直接转为觉醒状态
D.在觉醒状态下可以进入快波睡眠
E.慢波睡眠又称异相睡眠
- 19.煮沸消毒时，海拔每增加 300m，需要延长消毒时间
A.2min B.3min C.4min
D.5min E.6min
- 20.下列消毒剂中属于气体杀菌剂的是
A.甲醛 B.环氧乙烷 C.过氧乙酸
D.乙醇 E.戊二醛
- 21.脉搏短绌常见于
A.发热患者 B.房室传导阻滞患者 C.洋地黄中毒患者
D.心房纤维颤动患者 E.甲状腺功能亢进患者

22. 休克患者的脉搏特征是

- A. 强而有力 B. 细弱无力 C. 动脉管壁变硬，失去弹性
D. 单位时间内脉率少于心率 E. 每隔一个正常搏动后出现一次早搏

23. 男性 86 岁，脑溢血后卧床半年多，病人有时神志恍惚，烦躁不安，经检查下腹部隆起，半球形囊性肿物，有少量尿液自尿道口溢出浸湿衣、裤等，应认为是

- A. 真性尿失禁 B. 充盈性尿失禁 C. 压力性尿失禁
D. 尿瘘 E. 假性尿失禁

24. 观察降温效果，乙醇拭浴后何时测体温

- A. 10min B. 20min C. 30min
D. 40min E. 60min

25. 患者，男，46 岁，突发心肌梗死急诊入院，抢救无效死亡。患者妹妹指责接诊护士没有及时联系医生，从而延误抢救导致患者死亡；护士坚持自己已尽职尽责。为此，双方发生争执，其主要原因为

- A. 理解差异 B. 角色期望冲突 C. 经济压力过重
D. 角色责任模糊 E. 角色权利争议

26. 患者，女，23 岁。溜冰时不慎跌倒，主诉当时右手掌撑地，右腕部剧痛。体检见右腕肿胀，活动障碍，局部呈“餐叉”畸形。该患者可能发生了

- A. 桡骨远端伸直型骨折 B. 桡骨远端屈曲型骨折 C. 腕关节扭伤
D. 掌骨骨折 E. 腕骨骨折

27. 成人，男性，患者小腿骨折行石膏管型固定后，诉小腿外侧疼痛，足背麻木，可能压迫了 A. 腓总神经 B. 胫神经

- C. 坐骨神经
D. 动脉 E. 静脉

28. 要素饮食经造瘘口注入时的温度宜为

- A. 37℃ B. 38~39℃ C. 39~40℃
D. 40~41℃ E. 41~42℃

29. 为尿潴留患者导尿的目的是

- A. 测量膀胱容量 D. 鉴别有无尿闭 C. 排空膀胱，避免术中误伤
D. 减轻患者痛苦 E. 记录尿量、观察肾功能

30. 当患者胆管完全阻塞时，因胆汁不能进入肠道，粪便呈

- A. 鲜红色 B. 暗红色 C. 柏油样便
D. 陶土色 E. 果酱样便

31. 下列哪种颜色是剧毒药瓶上的标签颜色

- A. 蓝色 B. 红色 C. 黑色
D. 绿色 E. 黄色

32. 易氧化和遇光变质，须装在有色密盖瓶中保存的药物是

- A. 糖衣片 B. 巴比妥 C. 地西洋（安定）
D. 氨茶碱 E. 甲氧氯普胺（胃复安）

33. 对纠正体内电解质失调有显著效果的溶液是

- A. 浓缩白蛋白 B. 右旋糖酐 C. 血浆
D. 晶体溶液 E. 全血

34.最严重的输液反应是

- A.过敏反应 B.心脏负荷过重的反应
C.发热反应
D.空气栓塞 E.静脉炎

35.患者处于持续睡眠状态，但能被言语或轻度刺激唤醒，刺激去除后又很快入睡，此时患者处于

- A.嗜睡 B.意识模糊 C.昏睡
D.浅昏迷 E.深昏迷

36.患者，女，50多岁，心慌气短10余年；2d前突然咯血呈鲜红色混有泡沫，既往有关节肿痛病史。体检：面部轻度发绀，心率86次/min，二尖瓣区闻及舒张期隆隆样杂音。心电图提示“P”波呈双峰状。应首先考虑的疾病是

- A.支气管扩张 B.肺气肿 C.肺结核
D.肺心病 E.风心病

37.风湿性心瓣膜病，病变最常受累的瓣膜是

- A.二尖瓣和主动脉瓣 B.三尖瓣和肺动脉瓣 C.主动脉瓣
D.三尖瓣 E.二尖瓣

38.二尖瓣关闭不全最主要的体征是

- A.心尖搏动增强，向左下移位
B.心浊音界向左下扩大
C.胸骨左缘第3、4肋间舒张期杂音
D.心尖区闻及响亮而粗糙的收缩期吹风样杂音
E.肺动脉瓣区第二心音增强

39.男性，40岁，阑尾穿孔腹膜炎手术后第七天，体温39℃，伤口无红肿，大便次数增多，混有黏液，伴有里急后重，应考虑并发

- A.盆腔脓肿 B.膈下脓肿 C.细菌性痢疾
D.肠炎 E.肠粘连

40.女性患者25岁，每逢月经来潮前数天自觉两侧乳房胀痛，又能触及边界不清的多数小结节状物。月经期过后减轻，考虑

- A.乳癌 B.乳房纤维腺瘤 C.乳管内乳头状瘤
D.乳房囊性增生病 E.乳房慢性炎症

41.治疗心室颤动应首选

- A.利多卡因 B.溴苄胺 C.奎尼丁
D.直流电除颤 E.普鲁卡因胺

42.患者，女，67岁，因脑血管意外导致右侧肢体瘫痪。患者说话口齿不清，体质瘦弱，大小便失禁。近日发现其骶尾部皮肤呈紫红色，皮下可触硬结，为减轻骨骼隆突处的压力可用物品置身体空隙处，不可选用的是

- A.气垫 B.水褥 C.羊皮垫
D.海绵垫 E.塑料垫

43.电复律治疗术后护理中不恰当的是

- A.持续24h心电监护 B.按医嘱服用抗心律失常药
C.常规低流量吸氧 D.禁食至清醒后2h E.术后应立即下床活动

44.患者，女，33岁，近三个月来感乏力，全身不适，双手近侧指关节疼痛伴肿胀，有明显晨僵，活动后疼痛减轻。其最可能的诊断是

- A.类风湿性关节炎 B.风湿性关节炎 C.增生性关节炎
D.系统性红斑狼疮 E.痛风
- 45.25岁，男性，1型糖尿病患者，2天前中断胰岛素后出现昏迷，血糖23mmol/L，经抢救并静脉滴注碳酸氢钠后血糖下降，神志好转，酸中毒减轻，但不久又进入昏迷，其最可能的原因是
A.并发脑水肿 B.并发低血糖 C.并发脑血管意外
D.并发乳酸酸中毒 E.并发肾功能衰竭
- 46.治疗高血压危象，首选的药物是
A.美托洛尔 B.利舍平 C.硝普钠
D.硝酸甘油 E.哌唑嗪
- 47.原发性高血压最严重的并发症是
A.脑出血 B.充血性心力衰竭 C.肾衰竭
D.冠心病 E.糖尿病
- 48.患者，女，50岁，患风湿性心瓣膜病，2d前出现一侧下肢剧痛，不能活动，局部皮肤苍白、发凉，动脉搏动消失。应首先考虑
A.风湿活动致关节肌肉疼痛 B.下肢动脉栓塞
C.下肢静脉血栓形成 D.化脓性关节炎 E.骨髓炎
- 49.消化性溃疡最主要的症状是
A.恶心、呕吐 B.缓脉、多汗 C.腹胀、腹痛
D.嗝气，反酸 E.节律性上腹部疼痛
- 50.胃溃疡患者典型的疼痛节律是
A.疼痛—进食—缓解 B.进食—疼痛—缓解 C.疼痛—禁食—疼痛
D.疼痛—便意—便后缓解 E.便意—疼痛—便后缓解
- 51.下列选项中抑制胃酸分泌最强的药物是
A.碳酸氢铝 B.西咪替丁 C.奥美拉唑
D.硫糖铝 E.枸橼酸铋钾
- 52.以下药物中兼有抑制幽门螺杆菌作用的是
A.氢氧化铝 B.法莫替丁 C.奥美拉唑
D.硫糖铝 E.米索前列醇
- 53.患者，女，62岁，肝性脑病前期，意识思维错乱，行为失常，为患者灌肠忌用
A.生理盐水 B.高渗盐水 C.开塞露
D.0.1%肥皂溶液 E.1.2.3灌肠液
- 54.肝硬化患者由于肝功能减退出现的症状不包括
A.全身症状 B.消化道症状 C.出血倾向和贫血
D.意识障碍 E.内分泌失调
- 55.王某，胃次全切除术后三年，近日感头痛，乏力。Hb: 60g/L, RBC: $1.5 \times 10^{12}/L$, MCV: 20fl;网织红细胞1.5%。此病人最可能的诊断是
A.巨幼红细胞性贫血 B.缺铁性贫血 C.再生障碍性贫血
D.感染性贫血 E.溶血性贫血
- 56.下列不属于门脉高压侧支循环的是

- A.食管和胃底静脉曲张 B.腹壁静脉曲张 C.脐周静脉曲张
D.痔静脉曲张 E.下肢静脉曲张
- 57.急性胰腺炎患者禁食的目的是
A.控制饮食 B.减少胃液分泌 C.减少胰液分泌
D.防止呕吐 E.避免胃扩张
- 58.出血坏死型胰腺炎患者出现 Cullen 征是指
A.黄疸加重 B.背部皮肤青紫 C.腰部两侧出现灰紫色瘀斑
D.脐周皮肤红斑 E.脐周出现皮肤青紫
- 59.患者，女，23岁。使用青霉素 10d 后出现发热、关节肿痛、荨麻疹、全身淋巴结肿大、腹痛等症状，该患者可能出现
A.过敏性休克 B.血清病型反应 C.皮肤过敏反应
D.呼吸道过敏反应 E.消化系统过敏反应
- 60.质子泵抑制剂用于上消化道出血的主要机制是
A.使局部血管收缩 B.促进凝血因子的作用 C.促进血小板的生成
D.促进胃酸分泌，降低胃液 pH E.抑制胃酸分泌，提高胃液 pH
- 61.目前临床上应用最广泛的治疗腹水的方法是
A.限制水、钠的摄入 B.利尿剂的应用 C.放腹水
D.输注清蛋白 E.腹水浓缩回输
- 62.目前治疗原发性肝癌的最好方法是
A.手术治疗 B.放射治疗 C.全身化疗
D.生物治疗 E.肝动脉栓塞化疗
- 63.肝癌非手术治疗的首选方法是
A.中医治疗 B.放射治疗 C.全身化疗
D.生物治疗 E.肝动脉栓塞化疗
- 64.以下对溃疡性结肠炎临床表现的描述中错误的是
A.轻者可无腹痛症状 B.腹痛有便意—疼痛—便后缓解的规律
C.腹泻为最主要症状 D.常伴有里急后重
E.可出现与自身免疫相关的肠外表现
- 65.男性，32岁，近三天解柏油样便，每日 2~3 次，以往常有返酸，上腹痛，晚间重，进食可缓解，查体贫血貌，肝脾不大，右上腹压痛，最可能的诊断
A.肝硬化并胃底静脉曲张出血 B.胃癌并出血
C.胃炎并出血 D.溃疡病并出血 E.胃溃疡
- 66.肝性脑病患者用精氨酸治疗的目的是
A.为大脑提供能量 B.降低肠道 pH 值，减少氨吸收
C.增加尿酸合成，降低血氨 D.抑制大脑假神经递质合成
E.抑制肠道产尿素酶的细菌
- 67.对于必须服用 NSAID 的消化性溃疡患者，下列哪种药物可以应用
A.扑热息痛 B.阿司匹林 C.罗非昔布

- D. 吡哌美辛 E. 保泰松
68. 胃黏膜保护剂硫糖铝最佳的服药时间应为
 A. 餐前 2h B. 餐前 1h C. 用餐时
 D. 餐后 2h E. 夜间顿服
69. 十二指肠球部溃疡患者，上腹痛加重，反复呕吐，为胃内容物及咖啡样物，共 3 次约 500ml，无宿食，吐后疼痛缓解，最可能合并
 A. 幽门梗阻 B. 上消化道出血 C. 穿孔
 D. 癌变 E. 弥漫性腹膜炎
70. 风心病二尖瓣狭窄及主动脉关闭不全患者，合并房颤，心率 130 次/分，在应用洋地黄治疗过程中，下列哪些情况应立即停止用药
 A. 心电图出现鱼钩样 ST-T 改变 B. 心悸减轻
 C. QT 间期缩短 D. 血压轻度降低 E. 心率 58 次/分
71. 急性肾小球肾炎最常见的临床表现为
 A. 少尿，水肿 B. 少尿、高血压 C. 血尿，水肿、高血压
 D. 血尿，水肿、高血压，肾衰竭 E. 水肿、高血压
72. 慢性肾小球肾炎患者的饮食护理中，正确的是
 A. 低盐、低蛋白质、高维生素 B. 低盐、高蛋白质、高维生素
 C. 高盐、低蛋白质、高维生素 D. 低盐、低蛋白质、低维生素
 E. 低盐，适量蛋白质、高维生素
73. 符合肾病综合征的有关检查的是
 A. 尿蛋白>3.5g/d，血清蛋白<3g/dl B. 尿蛋白>3.5g/d，血清蛋白<6g/dl
 C. 尿蛋白>3.5g/d，血脂升高 D. 肌酐清除率下降，甘油三酯升高
 E. 血尿素氮升高，血脂升高
74. 患者女，50 岁，高血压性心脏病，排便后，突感胸闷、咳嗽、大汗淋漓，脉搏 120 次/分，呼吸 30 次/分，不能平卧，烦躁不安，两肺布满湿啰音，给患者吸氧宜用
 A. 低流量持续吸氧 B. 高流量持续吸氧 C. 低流量间歇吸氧
 D. 乙醇湿化吸氧 E. 高流量间歇吸氧
75. 鼓励肾盂肾炎患者多饮水的主要目的是
 A. 加速退热 B. 维持体液平衡 C. 减少药物毒副作用
 D. 保持口腔清洁 E. 促进细菌、毒素排出
76. 慢性肾衰竭的早期症状是
 A. 神情淡漠，嗜睡 B. 厌食，恶心呕吐 C. 口腔氨臭味，腹泻
 D. 呼吸深大，咳嗽 E. 皮肤瘙痒，紫癜
77. 慢性肾衰竭尿毒症期最主要的表现是
 A. 水肿 B. 贫血 C. 消化道症状
 D. 水电解质及酸碱平衡失调 E. 血肌酐增高
78. 腹膜透析期间，提示并发腹膜炎的表现是
 A. 插管部位皮肤发红 B. 透出液呈红色 C. 透出液混浊
 D. 透出液量减少 E. 出现恶心、呕吐

79.下列属于血液透析相对禁忌证的是

- A.急性肾衰竭伴高钾血症 B.慢性肾衰竭 C.急性药物中毒
D.急性毒物中毒 E.严重高血压

80.严重高尿酸血症患者开始透析时易发生

- A.低血压 B.失衡综合征 C.出血
D.过敏反应 E.心绞痛

81.血液系统疾病患者最常见的症状是

- A.出血 B.贫血 C.继发感染
D.骨关节疼痛 E.肝脾大

82.缺铁性贫血补充铁剂的首选方法是

- A.口服给药 B.静脉给药 C.肌肉注射
D.皮下注射 E.皮内注射

83.再生障碍性贫血死亡的主要原因是

- A.严重感染 B.颅内出血 C.败血症
D.进行性贫血 E.尿毒症

84.治疗特发性血小板减少性紫癜的首选药物是

- A.维生素 C B.酚磺乙胺 C.糖皮质激素
D.长春新碱 E.环孢素

85.患者，男，56岁，患尿毒症，精神萎靡，下腹无胀满，24h尿量为80ml。患者的排尿状况属于

- A.正常 B.无尿 C.少尿
D.尿失禁 E.尿潴留

86.患者，女，35岁，职员。主因双肘、腕、手指近端指间关节肿痛2年，加重2周，以类风湿关节炎收入院。对诊断最有价值的检查是

- A.手指和腕关节的X片 B.免疫学检查 C.血象检查
D.血液系统检查 E.关节穿刺

87.高位小肠梗阻除腹痛外最主要的症状是

- A.腹胀明显 B.呕吐 C.叩诊呈鼓音
D.停止排便.排气 E.腹部包块

88.肠梗阻非手术治疗期间梗阻解除的标志是

- A.胃肠减压后腹痛减轻 B.呕吐后腹胀减轻 C.轻度压痛无肌紧张
D.肛门排便、排气 E.肠鸣音亢进转为消失

89.肛管周围脓肿是指

- A.内痔合并感染所形成的脓肿 B.外痔合并感染所形成的脓肿
C.直肠膀胱陷窝内的脓肿 D.肛门旁粉瘤感染所形成的脓肿
E.肛管直肠周围间隙感染所形成的脓肿

90.患者，女，65岁，患高血压15年，近日病情加重入院，体检：血压190/110mmHg，全身水肿，患者的饮食应采用

- A.要素饮食 B.少渣饮食 C.低蛋白饮食
D.无盐低钠饮食 E.低胆固醇饮食

91.三腔两囊管的护理要点不包括

- A.使用前检查管路是否漏气
- B.先向胃气囊充气
- C.胃气囊充气量为 150~200ml'
- D.每隔 24h 气囊放气 15~30min
- E.若无出血可立即拔管

92.门静脉高压上消化道出血合并肝昏迷，下列各项中最适用于消除肠内积血、减少氨形成的是

- A.弱酸性液灌肠
- B.生理盐水灌肠
- C.弱碱性液灌肠
- D.肥皂水灌肠
- E.50%硫酸镁口服

93.细菌进入肝脏引起脓肿的主要途径是

- A.细菌沿胆管上行入肝
- B.经肝动脉入肝
- C.经门静脉系统
- D.直接经开放性肝损伤之伤口
- E.膈下感染时细菌侵入肝包膜所致

94.以下有关肝动脉插管化疗的患者护理的叙述不正确的是

- A.严格无菌操作
- B.注药后用肝素液冲洗导管
- C.若出现发热，应使用抗菌药物
- D.定期局部换药
- E.剧烈腹痛时应警惕其他部位动脉栓塞及胆囊坏死等并发症

95.胆管 T 管引流的患者胆道远端通畅的表现是

- A.腹痛和黄疸减轻，引流量增多
- B.体温正常，引流量增多
- C.上腹胀痛，引流量骤减
- D.食欲好转，黄疸消退，引流量减少
- E.黄疸消退，引流量增多，食欲无变化

96.禁忌采用腹腔镜胆囊切除术的是

- A.胆囊结石
- B.慢性胆囊炎
- C.胆囊息肉
- D.有出血倾向
- E.胆囊结石继发胆管结石

97.出血坏死性胰腺炎最常见的并发症是

- A.化脓性感染
- B.MODS
- C.胰腺假囊肿
- D.胰腺组织纤维化
- E.休克

98.胰腺的解剖位置是

- A.位于小网膜囊内，相当于第 1~2 腰椎水平
- B.位于小网膜囊内，相当于第 3~4 腰椎水平
- C.位于腹膜后，相当于第 1~2 腰椎水平
- D.位于腹膜后，相当于第 3~4 腰椎水平
- E.位于胃后方，相当于第 3~4 腰椎水平

99.急性持续性腹痛，阵发性加剧并伴有休克，最可能为

- A.输尿管结石，肾绞痛
- B.单纯性机械性肠梗阻
- C.阑尾穿孔，腹膜炎
- D.绞窄性肠梗阻
- E.胆道蛔虫症

100.出血性急腹症的腹痛特点是

- A.起病慢，腹痛由轻转重，呈持续性
- B.腹痛突然发生或突然加重，呈持续性剧痛
- C.腹痛中间有间歇性隐痛，常呈渐进性、阵发性加重
- D.腹痛较轻，呈持续性，腹膜刺激征轻
- E.起病急，腹痛剧烈，常伴轻度休克

- 101.一位大隐静脉曲张患者，在做浅静脉瓣功能试验时，塌陷的大隐静脉在 30s 内由上而下迅速充盈。说明
- A.交通瓣膜闭锁不全 B.大隐静脉瓣膜闭锁不全
C.股静脉有阻塞 D.股静脉瓣闭锁不全 E.深静脉阻塞
- 102.下肢急性动脉闭塞时，肢体皮温改变的平面与实际栓塞的平面的关系是
- A.两者在同一平面
B.皮温改变平面比实际栓塞平面低 2cm
C.皮温改变平面比实际栓塞平面低两横掌
D.皮温改变平面比实际栓塞平面低一横掌
E.皮温改变平面比实际栓塞平面低两横指
- 103.通过改善毛细血管通透性来降低颅内压的治疗方法是
- A.脱水治疗 B.过度换气 C.激素治疗
D.冬眠低温治疗 E.脑室穿刺外引流术
- 104.枕骨大孔疝不同于小脑幕切迹疝的临床表现是
- A.头痛剧烈 B.呕吐频繁 C.意识障碍
D.呼吸骤停出现早 E.血压升高，脉缓有力
- 105.区分开放性颅骨骨折和闭合性颅骨骨折是根据
- A.硬脑膜破裂 B.颅骨、硬脑膜同时破裂
C.骨折部位是否与外界相通 D.头皮，硬脑膜同时破裂
E.头皮颅骨同时破裂
- 106.促进脑脊液外漏通道早日闭合的正确措施是
- A.神志清醒者应取头低足高位 B.昏迷者应取俯卧位
C.昏迷者平卧位，头偏向一侧 D.脑脊液一旦停止外漏即给予平卧位
E.昏迷者床头抬高 30°，患侧卧位
- 107.颅内动静脉畸形最常见的首发症状是
- A.癫痫 B.意识障碍、头痛、呕吐 C.运动障碍
D.语言障碍 E.感觉障碍
- 108.患者，男，38 岁，颅脑创伤，住院后患者的卧位是抬高床头 15~30cm，其目的是
- A.利于呼吸通畅 B.防止呕吐窒息 C.舒适
D.利于血液循环 E.减轻脑水肿
- 109.留置胸膜腔闭式引流管的患者出现引流管脱出，首先要
- A.给患者吸氧
B.立即报告医生
C.急送手术室处理
D.把脱出的引流管重新插入
E.用无菌凡士林纱布、厚层纱布封闭引流口
- 110.患者，男，65 岁，低热，咳嗽并痰中带血丝 3 个月。胸片显示左肺上叶不张，少量胸膜腔积液。为明确病理诊断，进一步应首选
- A.纵隔镜检查 B.开胸探查 C.胸腔镜检查
D.支气管镜检查 E.经胸壁穿刺活组织检查

111.脓胸是指脓性渗出液积聚于何处的化脓性感染

- A.胸骨后间隙 B.纵隔间隙 C.胸内脏器
D.肺内 E.胸膜腔内

112.患者，男，38岁，肺叶切除术后8d，出现发热、刺激性咳嗽、咳血痰、呼吸困难，胸腔引流管排出大量气体，疑为支气管胸膜瘘，为了确诊，应做的检查是

- A.X线胸片 B.支气管造影 C.支气管镜检
D.胸部CT E.向胸膜腔内注入亚甲蓝液1~2ml

113.急性脓胸患者未经胸腔穿刺而在胸部X线见到液气平面，应高度怀疑合并有

- A.胸部外伤 B.肺大疱破裂 C.支气管、食管瘘
D.膈疝 E.厌氧细菌感染

114.肺癌患者出现一侧眼睑下垂，瞳孔缩小，眼球内陷，额部与胸部少汗的原因是

- A.动眼神经受压 B.交感神经受压 C.喉返神经受压
D.上腔静脉受阻 E.肋间神经受压

115.周围型肺癌是指癌肿位于

- A.主支气管以下 B.细支气管位置在肺的周围 C.叶支气管以下
D.肺门以外的肿瘤，位置在肺的周围 E.肺段支气管开口以下，位置在肺的周围

116.食管癌食管明显梗阻的患者术前减轻食管黏膜水肿的措施是

- A.术前禁食 B.营养支持 C.纠正水、电解质、酸碱失衡
D.加强口腔卫生 E.术前3天温盐水洗胃

117.患者，男，65岁，以往进食时偶发哽噎感，胸骨后刺痛，餐后症状消失，近来自觉吞咽困难，明显消瘦，乏力，首先考虑

- A.食管炎 B.食管癌 C.食管息肉
D.胃癌 E.胃、十二指肠溃疡

118.患者，男，50岁，咽部异物感1个月，肝炎病史20年，进一步检查，首先应考虑

- A.食管镜 B.胸部CT C.食管超声波
D.食管X线钡餐检查 E.带网气囊食管脱落细胞检查

119.风湿性心脏病行二尖瓣瓣膜置换术后1个月，凝血功能检查示PTT为20s，可告知患者

- A.继续服用原剂量抗凝药 B.需要增加抗凝药药量
C.需要减少抗凝药药量 D.需要立即重新检查凝血功能
E.使用量适当，不需要继续监测

120.急性心肌梗死的正确护理措施是

- A.绝对卧床休息 B.高蛋白，高脂肪饮食
C.不必减少或停止探视 D.出现心前区疼痛可以不处理
E.预防褥疮，每2h翻身1次

二、多项选择题（每一考题下面有A、B、C、D、E五个备选答案，请从中选择两个或两个以上的最佳答案，多选、漏选、错选均不得分，每题2分，共60分）。

1.护理概念的发展及演变过程包括以下几个阶段

- A.疾病为中心 B.患者为中心 C.护患关系为中心
D.护理伦理为中心 E.健康为中心

- 2.下列有关人类基本需要各层次之间关系的陈述, 正确的是
- A.各层次的基本需要重叠出现
 - B.人们满足各层次基本需要的活动基本相同
 - C.生理需要是最低层次的需要, 可延缓给予
 - D.较高层次需要的满足方式有很大个体差
 - E.人的各层次基本需要之间相互关联、相互影响
- 3.关于心理防御机制的描述正确的是
- A.是心理不正常的人的心理活动
 - B.可见于正常人的心理活动
 - C.如果过度使用, 会出现病态人格
 - D.升华, 幽默的防御机制常能奏效
 - E.多数防御机制的作用是暂时的
- 4.护患关系中造成积极影响还是消极影响主要取决于护理人员, 主要的影响源有
- A.语言
 - B.行为举止
 - C.理论知识
 - D.情绪
 - E.工作态度
- 5.对重症颅脑外伤患者的急救措施应该包括
- A.测血压、脉搏、呼吸
 - B.检查神经系统体征
 - C.保持呼吸道通畅
 - D.脱水治疗
 - E.输血、输液、防止休克
- 6.下列关于协助患者休息的措施中, 正确的是
- A.精神放松是保证休息质量的关键
 - B.长期卧床患者应适当活动
 - C.为患者提供合理的空间
 - D.为患者提供适宜的光线
 - E.尊重病室内所有患者的生活习惯
- 7.产生基本呼吸节律性的部位是
- A.脊髓
 - B.延髓
 - C.脑桥
 - D.间脑
 - E.大脑皮质
- 8.有关热湿敷操作的描述, 下列哪些正确
- A.局部涂凡士林
 - B.受敷部位下垫橡胶单和治疗单
 - C.用手背测试热敷温度
 - D.每 3~5min 更换 1 次, 持续 15~20min
 - E.有伤口者按无菌技术处理
- 9.下列有关胃肠外营养护理的叙述中错误的有
- A.加强营养液配置过程中的无菌操作
 - B.导管进入静脉处的敷料应每两日更换 1 次
 - C.输注营养液过程中应防止液体中断或导管拔出
 - D.可在静脉营养导管处采集血标本, 减少对患者的穿刺
 - E.使用前及使用过程中应严密监测患者的实验室检查结果
- 10.与肺癌有关的因素包括
- A.吸烟
 - B.石棉职业暴露
 - C.空气污染
 - D.食物中的维生素 A
 - E.电离辐射
- 11.提示水封瓶闭式引流通畅的指标是
- A.长玻璃管的液柱升高
 - B.不断有气泡从长玻璃管中溢出
 - C.玻璃管水柱随呼吸上下波动
 - D.患者咳嗽时有气泡溢出

- E.玻璃管水柱始终为静止状态
- 12.肺栓塞患者的临床表现有
- A.咳嗽、咯血 B.“不能解释”的呼吸困难 C.烦躁不安.惊恐
D.晕厥 E.胸痛
- 13.在为一位急性肺栓塞患者进行身体评估时，可能获得的体检发现有
- A.体温为 37.8℃ B.心率为 124 次/分 C.发绀
D.咯血 E.肺部闻及哮鸣音
- 14.PTE 患者有下列哪些情况不能进行抗凝治疗
- A.消化道溃疡大便潜血阳性 B.妊娠 4 个月 C.凝血因子III缺乏
D.肝硬化 E.血压为 184/112mmHg
- 15.下列哪些措施属于溶栓治疗
- A.手术摘取肺动脉内血栓 B.肺动脉导管碎解和抽吸血栓
C.静脉给予重组组织型纤溶酶原激活剂 D.静脉给予肝素
E.静脉给予尿激酶
- 16.患有下列哪种疾病的患者当合并胸腔积液时，其胸腔积液的蛋白含量可能会超过 30g/L
- A.充血性心力衰竭 B.肾病综合征 C.胸膜恶性肿瘤
D.系统性红斑狼疮 E.结核性胸膜炎
- 17.一位胸膜恶性肿瘤的患者并发胸腔积液，胸水检查时最有可能发现下列哪项变化
- A.胸水比重为 1.020 B.总蛋白量为 35g/L C.黏蛋白定性试验阴性
D.细胞计数 $80 \times 10^6/L$ E.胸水中以淋巴细胞为主
- 18.下列关于自发性气胸的说法正确的是
- A.原发性自发性气胸多见于健康青壮年男性
B.老年发病者多继发于肺气肿、肺结核、肺脓肿
C.胸部 X 线检查是诊断气胸最可靠的方法
D.交通性气胸的胸膜腔内压力可高达 10cmH₂O
E.气胸患者如肺压缩<20%时可不用排气治疗
- 19.一位 COPD 患者于一阵剧咳后突感左侧胸痛，气急加剧。体格检查发现左侧胸部叩诊呈鼓音，听诊呼吸音消失，此时患者还可以出现哪些体征
- A.左侧胸廓饱满 B.左侧语颤增强 C.左侧肋间隙增宽
D.气管及心脏向左侧移位E.左侧呼吸运动增强
- 20.ARDS 患者正确的液体管理措施是
- A.保持液体出入量处于平衡状态 B.输液以胶体液为主 C.适当使用利尿剂
D.输血宜用新鲜血 E.血压下降时应大量快速输液
- 21.下列哪些疾病可以引起呼吸衰竭
- A.COPD B.慢性纤维空洞性肺结核 C.肺栓塞
D.自发性气胸 E.吉兰-巴雷综合征
- 22.有效循环血量的影响因素包括
- A.血容量 B.心排出量 C.心率
D.周围血管张力 E.血压

23.心肺复苏后,下列哪些处理是正确的

- A.吸氧 B.少动,不要翻身 C.维持血压高水平
D.纠正酸中毒 E.防治肾衰竭

24.癌症的治疗措施包括

- A.手术治疗 B.放射治疗 C.化学治疗
D.生物治疗 E.中药治疗

25.采用格拉斯哥昏迷计分法判断患者的意识状态时应了解的内容包括

- A.睁眼反应 B.语言反应 C.运动反应
D.肌肉张力 E.瞳孔对光反应

26.下列血流动力学监测参数正常值不正确的有

- A.平均动脉压: 13~15kPa B.中心静脉压: 1~2kPa
C.肺动脉楔压: 0.8~1.6kPa D.血压: 10~13.4kPa
E.平均肺动脉压: 2.47~3.0kPa

27.ICU 感染的危险因素包括

- A.患者的病情重 B.侵入性操作多 C.抗菌药应用不足
D.环境拥挤 E.患者周转快

28.引起术后切口裂开的因素包括

- A.患者营养状态欠佳 B.手术后腹压增加 C.手术后早期活动
D.缝合切口的技术欠缺 E.术后留置引流管

29.腹部手术后拔除胃肠减压管的指征包括

- A.无明显腹胀 B.肠蠕动恢复 C.腹痛减轻
D.肛门排气 E.患者食欲恢复

30.口述描绘评分法将疼痛分为

- A.无痛 B.轻微疼痛 C.轻度疼痛
D.中度疼痛 E.剧烈疼痛

三、问答题(每题 20 分,共 60 分)

(一)患者,男,35 岁,昏迷 5d。需鼻饲饮食以维持其营养需要。

1.鼻饲插胃管前,应将患者体位摆放为

- A.坐位 B.半坐位 C.左侧卧位
D.右侧卧位 E.去枕平卧位

2.标记胃管时,插入长度可用下列哪种方法测得

- A.前额发际至胸骨柄 B.前额发际至胸骨剑突处 C.鼻尖至胸骨柄
D.耳垂经鼻尖至胸骨剑突处 E.耳垂至胸骨柄

3.插管至 15~20Cm 时,应注意

- A.嘱患者做吞咽动作 B.使患者头向后仰 C.使患者头偏一侧
D.使患者下颌靠近胸骨柄 E.嘱患者张嘴哈气

4.灌注食物时,应注意鼻饲液的温度为

- A.36~38℃ B.37~39℃ C.38~40℃
D.39~41℃ E.40~42℃

5.下列鼻饲时的注意事项中哪项不妥

- A.间隔时间应大于 4h
- B.每次鼻饲量不超过 200ml
- C.药片应研碎溶解后再注入
- D.新鲜果汁与奶液应分别注入
- E.每次鼻饲前应用少量温水冲管后再进行喂

(二)患者,男,16岁,跑步后感到右胸胀痛:胸闷憋气。体检:呼吸急促,呼吸 28 次/分,右上肺叩诊鼓音,呼吸音消失;心率 105 次/分,律齐。

1.最可能的诊断是

- A.胸膜炎
- B.肋间神经炎
- C.心绞痛
- D.自发性气胸
- E.支气管哮喘

2.为明确诊断,最佳辅助检查应选

- A.胸片
- B.胸部 B 超
- C.胸部 CT
- D.肺功能检查
- E.心电图

3.最佳紧急处理方法是

- A.吸氧
- B.抽气减压
- C.抗生素治疗
- D.强心剂治疗
- E.镇静剂治疗

4.目前状态下对该患者的健康指导不正确的是

- A.加强锻炼,促进肺复张
- B.避免用力屏气,咳嗽
- C.避免提拉重物
- D.保持大便通畅,防止用力排便
- E.保持环境舒适安静

(三)患者,男,73岁,体重 65kg。因食管癌进食困难已有两月余,诉乏力,极度口渴,尿少而色深。眼窝明显凹陷,唇干舌燥,皮肤弹性差。

1.该患者可能的代谢紊乱是

- A.高渗性缺水
- B.代谢性碱中毒
- C.等渗性缺水
- D.代谢性酸中毒
- E.低渗性缺水

2.目前最具有价值的辅助检查是

- A.X 线检查
- B.血清钠测定
- C.血清钾测定
- D.血液 pH 值测定
- E.胃镜

3.该患者第一个 24h 应补充的累计丢失量是

- A.1000ml
- B.1500ml
- C.2000ml
- D.3000ml
- E.4000ml